

وضعیت مصرف خون در اعمال جراحی قلب

معصومه شهبازی^۱، آرزیتا چگینی^۲، مینو احمدی نژاد^۳

چکیده

سابقه و هدف

تزریق خون و فرآورده‌های خونی یک بخش مهم در عمل جراحی قلب محسوب می‌شود. با وجود این که تعداد کمی از بیماران (۲۰٪-۱۵٪) نیازمند عمل جراحی قلب هستند اما بیش از ۸۰٪ فرآورده‌های خونی در این نوع اعمال مصرف می‌شود. هدف از مطالعه، بررسی مصرف خون در جراحی قلب در یکی از بیمارستان‌های تهران بود.

مواد و روش‌ها

در یک مطالعه آینده‌نگر، ۹۲ بیمار جراحی قلب به روش سرشماری از مهر ۹۴ تا اسفند ۹۴ در بیمارستان شهید مدرس تهران بررسی شدند. میزان مصرف خون در هر یک از اعمال جراحی، ارتباط متغیرهای سن، جنس، میزان هموگلوبین، هماتوکریت و سطح بدن بیمار در دو گروه زنان و مردان و تاثیر آن‌ها بر میزان مصرف (PRBC) گلوبول قرمز متراکم در هر دو گروه ارزیابی شد. اطلاعات این بیماران به کمک جداول فراوانی، آزمون کای دو، من‌ویتنی و نرم افزار SPSS ۲۲ تحلیل شدند.

یافته‌ها

بیمارانی با هموگلوبین زیر ۱۱ g/dL و هماتوکریت کمتر از ۳۳٪، تعداد PRBC بیشتری دریافت کرده‌اند ($p < ۰/۰۱۰$). با کاهش مقادیر هموگلوبین و هماتوکریت، تعداد PRBC دریافتی حین عمل افزایش پیدا کرد (به ترتیب $p < ۰/۰۰۱$) و ($p < ۰/۰۱$). نوع عمل جراحی بر میزان مصرف خون مؤثر بوده و شایع‌ترین عمل جراحی در بین بیماران پیوند شریان کرونر (CABG) (۷۱/۶٪) مشاهده گردید که از یک تا هفت واحد PRBC و با میانگین ۳/۳ واحد استفاده شده است.

نتیجه‌گیری

با افزایش مقدار هموگلوبین و هماتوکریت، میزان نیاز به تزریق خون در حین عمل جراحی کاهش می‌یابد و هر چه میزان مساحت سطح بدن از میانگین افزایش پیدا کند، میزان نیاز به تزریق خون کمتر می‌شود.

کلمات کلیدی: جراحی قلب، تزریق گلوبول‌های قرمز، تزریق خون

تاریخ دریافت: ۹۵/۶/۱۴

تاریخ پذیرش: ۹۶/۵/۲۱

۱- کارشناس ارشد هماتولوژی - مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون - تهران - ایران
۲- مؤلف مسئول: متخصص بیهوشی - استادیار مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون - تهران - ایران - صندوق پستی: ۱۴۶۶۵-۱۱۵۷
۳- متخصص آسیب‌شناسی بالینی و تشریحی - استادیار مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون - تهران - ایران

مقدمه

تزریق خون و فرآورده‌های خونی یک بخش مهم در عمل جراحی قلب محسوب می‌شود (۱). با وجود این که تعداد کمی از بیماران (۲۰٪-۱۵٪) نیازمند عمل جراحی قلب هستند اما بیش از ۸۰٪ از مقدار فرآورده‌های خونی در این نوع عمل مصرف می‌شود (۲). خاصیت ذاتی اعمال جراحی قلب، رخدادهای خونریزی مکرر در طول و بعد از عمل جراحی و استفاده از سیستم گردش خون خارج پیکری (Extra corporeal circuit : ECC)، همگی دلایل آشکاری برای تزریق فرآورده‌های خونی در طی و پس از این عمل می‌باشد (۳).

اگر چه دلایل زیادی برای تزریق خون در این نوع عمل جراحی وجود دارد، ولی سه دلیل اساسی شامل افزایش ظرفیت اکسیژن‌رسانی، بهبود وضعیت هموستاز و پشتیبانی حجمی و افزایش برون‌ده قلبی هستند (۸-۴). گرچه تزریق خون در این بیماران همراه با خطرهای اساسی از جمله: سکتة قلبی، سکتة مغزی، نقص کلیوی، ونتیلاسیون طولانی، فیبریلاسیون بطنی، افزایش مدت زمان بستری در بیمارستان و افزایش خطر انتقال بیماری‌های ویروسی (به دنبال تزریق فرآورده‌های خونی) است. هم‌چنین می‌تواند بیمار را در معرض خطر واکنش‌های ناشی از انتقال خون، سرکوب ایمنی، پاسخ‌های التهابی سیستمیک و حتی مرگ قرار می‌دهد (۹-۱۱). به طوری که خطر مرگ مرتبط با تزریق خون ۰/۵٪ به ازای هر واحد تخمین زده شده است. شواهد اساسی وجود دارد که نشان می‌دهد مقدار فرآورده‌های خونی تزریق شده، اثر قابل توجهی بر هزینه‌های اضافی غیر مستقیم برای بیمارستان دارد. به این دلایل تزریق فرآورده‌های خونی یک چالش اساسی برای جراحان قلب می‌باشد (۱۲-۱۰، ۳).

مطالعه‌های قبلی اعلام کرده‌اند که تزریق خون در بیماران جراحی قلب تحت تاثیر سن، جنسیت، وزن، مساحت سطح بدن (BSA)، هماتوکریت قبل از عمل، CABG (عمل جراحی پیوند شریان کرونر: Coronary Artery Bypass Grafting) قلبی، نقص‌های انعقادی، بیماری دیابت وابسته به انسولین و رخدادهای بالینی شدید می‌باشد (۱۴، ۱۳). با توجه به مصرف زیاد خون و

فرآورده‌های خونی در اعمال جراحی قلب، بر آن شدیم تا وضعیت مصرف خون را در یکی از مراکز جراحی قلب بررسی نموده و تاثیر فاکتورهای پیشگویی کننده بر میزان نیاز به تزریق گلبول قرمز را ارزیابی نماییم.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه آینده‌نگر، ۹۲ بیمار بزرگسال جراحی قلب به مدت ۶ ماه، از مهر ۹۴ تا اسفند ۹۴ در بیمارستان شهید مدرس تهران بررسی شدند. این بیماران تحت اعمال جراحی قلب از نوع: عمل جراحی پیوند شریان کرونر (CABG: Coronary Artery Bypass Grafting)، تعویض دریچه میترال (MVR: Mitral Valve Replacement)، تعویض دریچه آئورت (AVR: Aortic Valve Replacement) و تعویض و یا ترمیم دریچه تریکوسپید و پولمونر (TVR: Tricuspid Valve Replacement or Repair) (Pulmonary Valve Replacement and Repair) یا ترکیبی از آن‌ها مانند (MVR-AVR، CABG-AVR، CABG-MVR،...) قرار گرفتند و تمامی بیماران، حین عمل جراحی تحت گردش خون خارج پیکری on-pump، هیپوترمی (۲۸-۳۲ درجه) و کاهش فشار خون (۷۰-۵۰ میلی‌متر جیوه) بودند. سپس بیماران انتوبه وارد بخش مراقبت‌های ویژه شده و تحت دستورالعمل‌های آن مرکز با مانیتورینگ، درمان آرامبخش، ضد درد، اینوتروپ و داروهای وازواکتیو قرار گرفتند. میزان مصرف خون را در هر یک از اعمال جراحی و هم‌چنین میانگین و انحراف معیار را برای متغیرهای سن، جنس، میزان هموگلوبین، هماتوکریت و سطح بدن بیمار (BSA: Body Surface Area) در دو گروه زنان و مردان مورد مشاهده قرار داده و میزان مصرف گلبول قرمز تراکم PRBC را در هر دو گروه ارزیابی نمودیم. هم‌چنین میزان تزریق کیسه‌های PRBC و ارتباط آن با سن (بالای ۶۰ سال و زیر ۶۰ سال) و میزان هموگلوبین (کمتر و بیشتر از ۱۱) را در ۹۲ بیمار بررسی نمودیم. در این مطالعه میزان مصرف پلاسما و پلاکت مورد توجه قرار نگرفت. اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۲ و آزمون کای دو برای اطلاعات کیفی و آزمایش من‌ویتنی برای اطلاعات

گلبول‌های قرمز با متغیر هموگلوبین در زنان ارتباط معناداری مشاهده نمی‌شود در حالی که در گروه مردان این ارتباط معنادار بود ($p = 0/02$).

جدول ۱: میانگین و انحراف معیار هموگلوبین، هماتوکریت، سن و BSA در ۹۲ بیمار عمل جراحی قلب

P value	انحراف معیار \pm میانگین		پارامتر
	مرد	زن	
0/006	13/18 \pm 1/9	11/78 \pm 2	هموگلوبین (gr/dL)
0/009	40/43 \pm 4/8	36/96 \pm 5/5	هماتوکریت (%)
0/531	58/55 \pm 10/93	57/30 \pm 10/02	سن (سال)
0/034	1/78 \pm 0/24	1/70 \pm 0/18	BSA (m ²)

هم چنین این ارتباط برای متغیر هماتوکریت در گروه مردان معنادار بود ($p = 0/006$). در حالی که در گروه زنان معنادار نبود. در این مطالعه بین مصرف PRBC و جنسیت ارتباط معناداری مشاهده نگردید که این اختلاف می‌تواند ناشی از تعداد کمتر زنان مورد مطالعه باشد. بین میزان مصرف PRBC در دو رنج سنی بالای ۶۰ سال و پایین ۶۰ سال در بین ۹۲ بیمار اختلاف معناداری مشاهده نشد. هم چنین بین سن و میزان مصرف PRBC ارتباط معناداری مشاهده نشد.

کمی و جداول فراوانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. متغیرهای پیوسته با میانگین \pm انحراف معیار و متغیرهای گسسته به صورت توزیع فراوانی و درصد بیان شدند.

یافته‌ها

۹۲ بیمار جراحی قلب در عرض ۶ ماه مورد مطالعه قرار گرفتند که ۲۵٪ (۲۳ نفر) آن‌ها زن و بقیه ۷۵٪ (۶۹ نفر) مرد بودند. میانگین سنی این بیماران در گروه زنان ۵۸/۵۵ \pm ۱۰/۹۳ سال و در گروه مردان ۵۷/۳۰ \pm ۱۰/۰۲ سال، میانگین هموگلوبین ۱۱/۷۸ \pm ۲ gr/dL برای زنان و ۱۳/۱۸ \pm ۱/۹ gr/dL برای مردان، میانگین هماتوکریت ۵/۵ \pm ۳۶/۹۶ برای زنان و ۴۰/۴۳ \pm ۴/۸ برای مردان و میانگین BSA برای زنان ۱/۷۰ \pm ۰/۱۸ و برای مردان ۱/۷۸ \pm ۰/۲۴ مشاهده شد (جدول ۱).

بین تعداد کیسه‌های PRBC دریافتی در حین عمل با متغیرهای هموگلوبین [OR = -0/404] و [OR = -0/4-2/3] و [CI 95% = -0/6-5/8] و هماتوکریت [OR = -0/384] و [CI 95% = -0/6-5/8]، در ۹۲ بیمار همبستگی منفی مشاهده شد ($p < 0/001$). به طوری که با افزایش مقدار هموگلوبین و هماتوکریت، میزان نیاز به تزریق خون در حین عمل جراحی کاهش می‌یابد. اما با بررسی این متغیرها در دو گروه زنان و مردان مشاهده شد که بین مصرف PRBC

جدول ۲: بررسی توزیع انواع اعمال جراحی قلب بر حسب واحد گلبول قرمز مصرفی در ۹۲ بیمار بیمارستان شهید مدرس

انواع اعمال جراحی	میزان توزیع اعمال جراحی بر حسب درصد	حداقل و حداکثر خون مصرفی بر اساس واحد	میانگین واحد خون مصرفی به ازای هر بیمار (انحراف معیار \pm میانگین)
CABG	۷۱/۶	۳/۳ \pm ۱/۲	۱-۷
AVR	۶/۲	۳/۴ \pm ۰/۸۹	۳-۵
MVR	۸/۶	۳/۴ \pm ۱/۳۹	۱-۵
CABG+AVR	۲/۵	۶/۵ \pm ۰/۷	۶-۷
CABG+MVR	۲/۵	۳ \pm ۰/۰	۳-۳
AVR+MVR	۶/۱	۲/۸ \pm ۰/۸۳	۲-۴
CABG+AVR+MVR	۲/۵	۳/۵ \pm ۰/۷	۳-۴
جمع	۱۰۰	۳/۲ \pm ۱/۲	۱-۷

دیگری، این میزان از ۰ تا ۶/۳ به ازای هر بیمار بوده که تمام زنان خون دریافت کرده ولی ۶۴/۹٪ مردها نیاز به تزریق فرآورده گلبول قرمز داشتند و ۲۰/۶٪ بیمارانی که تحت پمپ قلب ریوی on-pump قرار گرفته بودند، نیازی به خون پیدا نکردند(۱). در این تنوع گسترده، میزان مصرف خون به عواملی هم چون تفاوت در میان جمعیت بیماران در مراکز مورد مطالعه، داروهای دریافتی قبل از عمل مانند داروهای ضد پلاکتی و ضد انعقادی و بسیاری از روش‌ها و فاکتورهای مرتبط با جراحی مرتبط می‌باشد(۱۸، ۱۷، ۹). هم چنین گفته می‌شود که ۱۰٪ تا ۲۰٪ از بیمارانی که تحت عمل جراحی قلب قرار می‌گیرند، حدود ۸۰٪ از فرآورده‌های خونی را مصرف می‌کنند و بدین دلیل این نوع اعمال جراحی به عنوان گروه با خطر بالا شناسایی می‌شوند. بنابراین با شناسایی متغیرهایی که می‌توانند قبل از عمل جراحی میزان مصرف خون حین عمل جراحی را تا حدودی پیشگویی کنند، می‌توان برنامه‌ریزی‌های لازم جهت حفظ سلامت بیمار و به کار بردن روش‌های محافظت از ذخایر خونی را انجام داد و از عوارض ناشی از تزریق آن تا حدود زیادی پیشگیری کرد(۱). در این مطالعه ارتباط متغیرهای جنسیت، هموگلوبین، هماتوکریت، سن، BSA و نوع عمل جراحی را با میزان مصرف PRBC در حین عمل جراحی قلب مورد ارزیابی قرار دادیم. یکی از عوامل تاثیر گذار بر مصرف PRBC در حین عمل، وجود آنمی قبل از جراحی می‌باشد. مطالعه‌های مختلفی نشان داده‌اند که آنمی قبل از عمل بیانگر نیاز به تزریق خون بیشتر در حین عمل جراحی قلب می‌باشد(۲۰-۱۸). در این مطالعه نیز ارتباط میزان هموگلوبین و هماتوکریت و مصرف PRBC بررسی گردید که مشاهده شد در هموگلوبین کمتر از ۱۱ و هماتوکریت کمتر از ۳۳٪، میزان مصرف کیسه‌های خون بیشتر است. هم چنین بین پارامترهای هموگلوبین و هماتوکریت با تعداد PRBC‌های دریافتی حین عمل همبستگی منفی مشاهده شد و نشانه آن است که با افزایش مقدار این پارامترها (هموگلوبین و هماتوکریت)، نیاز به کیسه‌های PRBC در پیرامون عمل کاهش پیدا می‌کند. اما زمانی که پارامتر هموگلوبین را به طور اختصاصی‌تر برای

در مقایسه بین تعداد PRBC مصرف شده حین عمل جراحی در گروه زنان با هموگلوبین بیشتر و کمتر از ۱۱ و در گروه مردان با هموگلوبین بیشتر و کمتر از ۱۴ اختلاف معناداری مشاهده نگردید. رابطه متغیر BSA با تعداد کیسه‌های PRBC مصرف شده حین جراحی قلب در دو گروه زنان و مردان مورد ارزیابی قرار گرفت که ارتباط معناداری بین تعداد کیسه‌های PRBC مصرف شده با متغیر BSA در دو گروه زنان و مردان مشاهده نشد. ولی در مقادیر بیشتر و کمتر از میانگین BSA با مصرف PRBC در هر دو گروه، ارتباط معناداری مشاهده شد ($p=0/033$). در کل ۳۰۳ واحد کیسه گلبول قرمز (PRBC) در ۹۲ بیماری که تحت عمل جراحی قلب قرار گرفتند، استفاده شد. میزان مصرف از یک تا هفت واحد متغیر بوده و میانگین مصرف PRBC ۳/۲ کیسه به ازای هر بیمار بود. هم چنین مشاهده شد که بین میانگین مصرف PRBC در عمل CABG-AVR در مقایسه با عمل CABG و AVR-MVR، تفاوت معناداری وجود دارد (به ترتیب $p=0/041$ و $p=0/038$). شایع‌ترین عمل جراحی در بین بیماران، CABG (۷۱/۶٪) مشاهده گردید که از یک تا هفت واحد PRBC و با میانگین ۳/۳ واحد استفاده شده است. بیشترین میزان واحد PRBC مصرفی در عمل جراحی CABG+AVR دیده شد (جدول ۲).

بحث

مطالعه حاضر نشان داد که میانگین مصرف کیسه PRBC به ازای هر بیماری که تحت عمل جراحی قلب قرار می‌گیرد، $1/2 \pm 3/2$ می‌باشد. هم چنین مشاهده شد که بین متغیرهای هموگلوبین، هماتوکریت و نوع عمل جراحی قلب (از نوع CABG-AVR) با میزان مصرف PRBC در ۹۲ بیمار ارتباط معناداری وجود دارد. در حالی که بین متغیرهای سن، جنس و BSA با مصرف گلبول قرمز متراکم PRBC ارتباط معناداری وجود ندارد. مطالعه‌های مختلف میزان تزریق RBC آلورژنیک در بیمارانی که تحت عمل جراحی CABG قرار می‌گیرند را ۸-۱۰۰ درصد گزارش کرده‌اند(۱۷-۱۵). در این مطالعه میزان مصرف از حداقل یک تا هفت واحد مشاهده گردید ولی در تحقیق

عوارض و حوادث بیشتری در بیماران مشاهده گردید (۲۸). در مطالعه دیگری که توسط المیستکاو و همکارانش انجام شد، از ۱۰۵ بیمار ۷۱ نفر آن‌ها به بیشتر از دو واحد و ۱۴ بیمار (۱۳/۳٪) به بیش از ۴ واحد PRBC نیاز داشتند که جنس زن، سن بالای ۶۵ سال و $BSA < 1/75$ پیشگویی‌کننده‌های مؤثری در نیاز به تزریق خون و گلبول قرمز بودند (۲۹). تحقیق فوق تنها بیماران جراحی قلب CABG را مورد بررسی قرار داده بودند ولی مطالعه حاضر در برگرفته اعمال جراحی مختلف قلبی است و نشان داد زمانی که عمل جراحی قلب پیچیده‌تر (همانند CABG-AVR) باشد، میزان نیاز به مصرف PRBC بیشتر از عمل CABG به تنهایی می‌باشد.

در مطالعه‌ای که توسط فیلومنا و همکارانش در سال ۲۰۱۳ انجام شد، نشان دادند که از ۵۰۲ بیماری که تحت عمل جراحی قلب قرار گرفتند، تنها ۶۲ نفر (۱۲٪) بیشتر از ۳ واحد PRBC دریافت کرده بودند. آن‌ها این گروه را به عنوان گروه با دریافت خون بالا نام‌گذاری کردند. در این مرکز برای ۱۹۹ بیمار (۴۰٪) هیچ خونی تزریق نشده و ۲۴۱ بیمار (۴۸٪) یک تا سه واحد (۱۲٪) گلبول قرمز فشرده دریافت نمودند (۳۰). میزان مصرف خون در مطالعه حاضر از حداقل یک تا حداکثر هفت واحد و بیش از سایر کشورها مشاهده گردید که می‌تواند به دلیل عدم استفاده از روش‌های مدیریت خون بیمار و اتولوگ قبل و حین جراحی باشد.

نتیجه‌گیری

این مطالعه نشان داد که با افزایش مقدار هموگلوبین و هماتوکریت، احتمال نیاز به تزریق خون در حین عمل جراحی کاهش می‌یابد و هر چه میزان مساحت سطح بدن از میانگین افزایش پیدا کند، میزان نیاز به تزریق خون کمتر می‌شود. شایع‌ترین عمل جراحی در بین بیماران (۷۱/۶٪) CABG مشاهده گردید که از یک تا هفت واحد PRBC و با میانگین ۳/۳ واحد استفاده شده است.

گروه زنان (هموگلوبین کمتر و بیشتر از ۱۲) و مردان (هموگلوبین بیشتر و کمتر از ۱۴) تعریف کردیم، تفاوت معناداری در میزان مصرف کیسه‌های خون بین دو گروه زن و مرد دیده نشد. بر خلاف مطالعه‌های متعدد انجام شده که جنسیت را به عنوان یک فاکتور پیشگویی‌کننده برای مصرف کیسه‌های خونی بیشتر در نظر گرفته‌اند، نتایج حاصله از مطالعه حاضر این یافته را تایید نکرد البته این اختلاف‌ها می‌تواند ناشی از تعداد کمتر زنان در این مطالعه باشد (۲۲، ۲۱، ۱۸).

مطالعه‌های مختلف نشان داده‌اند که با افزایش سن میزان نیاز به تزریق خون نیز افزایش پیدا می‌کند (۲۵-۲۳). نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بین افزایش سن و میزان مصرف PRBC ارتباط معناداری وجود ندارد و افزایش سن نمی‌تواند نیاز به مصرف کیسه‌های خون را طی عمل جراحی افزایش دهد. با توجه به آن که میانگین سنی در گروه زنان $10/02 \pm 57/30$ سال و در مردان $10/93 \pm 58/55$ سال دیده شد، شاید این نتایج به دلیل عدم وجود سنین بالاتر از ۷۰ سال باشد و البته جهت ارزیابی‌های دقیق‌تر نیاز به مطالعه‌های بیشتری است.

سایر تحقیقات نشان دادند که افزایش سطح بدن می‌تواند منجر به کاهش دریافت کیسه‌های خونی در عمل جراحی قلب شود (۲۷، ۲۶). نتایج حاصل از این مطالعه نیز نشان داد که بین میزان نیاز به تزریق PRBC و BSA در دو گروه زنان و مردان ارتباط معناداری وجود ندارد. در حالی که در مقادیر بیشتر و کمتر از میانگین، این ارتباط در هر دو جنس معنادار می‌باشد ($p = 0/033$). یعنی هر چه میزان مساحت سطح بدن از میانگین افزایش پیدا کند، میزان نیاز به تزریق خون کمتر می‌شود و بر عکس. در مطالعه بهار آیدینلی و همکارانش ۱۵۰۰ نفر از بیماران جراحی قلب مورد مطالعه قرار گرفتند که متوسط سن آن‌ها ۶۰ سال بوده و ۷۱٪ آن‌ها مرد (۱۰۶۲ بیمار) و بقیه ۲۹٪ (۴۳۸ بیمار) زن بودند. اکثریت تحت عمل جراحی CABG قرار گرفته بودند و هر چه میزان هموگلوبین آن‌ها پایین‌تر بود،

References:

- 1- Calcaterra D. Importance of Blood Conservation in Cardiac Surgery and Impact on Patients Refusing

Blood Product Transfusions. J Blood Disorders Transf 2012; 4: e107.

- 2- Weiskopf RB, Viele MK, Feiner J, Kelley S, Lieberman J, Noorani M, *et al.* Human cardiovascular and metabolic response to acute, severe isovolemic anemia. *JAMA* 1998; 279: 217-21.
- 3- Augoustides JG. Letter by Augoustides regarding article, "Increased mortality, postoperative morbidity, and cost after red blood cell transfusion in patients having cardiac surgery". *Circulation* 2008; 117(25): e506.
- 4- Livio M, Gotti E, Marchesi D, Mecca G, Remuzzi G, de Gaetano G. Uraemic bleeding: role of anaemia and beneficial effect of red cell transfusions. *Lancet* 1982; 2(8306): 1013-5.
- 5- Boneu B, Fernandez F. The role of the hematocrit in bleeding. *Transfus Med Rev* 1987; 1(3): 182-5.
- 6- Adams RC, Lundy JS. Anesthesia in cases of poor surgical risk: some suggestions for decreasing the risk. *Surg Gynecol Obstet* 1942; 74: 1-10.
- 7- Chapler CK, Cain SM. The physiologic reserve in oxygen carrying capacity: studies in experimental hemodilution. *Can J Physiol Pharmacol* 1986; 64: 7-12.
- 8- Shander A, Rijhwani TS. Clinical outcomes in cardiac surgery: conventional surgery versus bloodless surgery. *Anesthesiol Clin North America* 2005; 23(2): 327-45.
- 9- Ferraris VA, Ferraris SP, Saha SP, Hessel EA 2nd, Haan CK, Royston BD, *et al.* Perioperative blood transfusion and blood conservation in cardiac surgery: the Society of Thoracic Surgeons and The Society of Cardiovascular Anesthesiologists clinical practice guideline. *Ann Thorac Surg* 2007; 83(5 Suppl): S27-86.
- 10- Rawn JD. Blood transfusion in cardiac surgery: a silent epidemic revisited. *Circulation* 2007; 116(22): 2523-4.
- 11- Horvath KA, Acker MA, Chang H, Bagiella E, Smith PK, Iribarne A, *et al.* Blood transfusion and infection after cardiac surgery. *Ann Thorac Surg* 2013; 95(6): 2194-201.
- 12- Taylor RW, Manganaro L, O'Brien J, Trottier SJ, Parkar N, Veremakis C. Impact of allogenic packed red blood cell transfusion on nosocomial infection rates in the critically ill patient. *Crit Care Med* 2002; 30: 2249-54.
- 13- Surgenor DM1, Churchill WH, Wallace EL, Rizzo RJ, Chapman RH, McGurk S, *et al.* Determinants of red cell, platelet plasma, and cryoprecipitate transfusions during coronary artery bypass graft surgery the Collaborative Hospital Transfusion Study. *Transfusion* 1996; 36: 521-32.
- 14- Utley JR, Wallace DJ, Thomason ME, Mutch DW, Staton L, Brown V, *et al.* Correlates of preoperative hematocrit value in patients undergoing coronary artery bypass. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1989; 98: 451-3.
- 15- Legare JF, Buth KJ, King S, Wood J, Sullivan JA, Hancock Friesen C, *et al.* Coronary bypass surgery performed off pump does not result in lower in-hospital morbidity than coronary artery bypass grafting performed on pump. *Circulation* 2004; 109(7): 887-92.
- 16- Rogers MA, Blumberg N, Saint S, Langa KM, Nallamothu BK. Hospital variation in transfusion and infection after cardiac surgery: a cohort study. *BMC Med* 2009; 7: 37.
- 17- Snyder-Ramos SA, Mohnle P, Weng YS, Bottiger BW, Kulier A, Levin J, *et al.* The ongoing variability in blood transfusion practices in cardiac surgery. *Transfusion* 2008; 48(7): 1284-99.
- 18- Karkouti K, Cohen MM, McCluskey SA, Sher GD. A multivariable model for predicting the need for blood transfusion in patients undergoing first-time elective coronary bypass graft surgery. *Transfusion* 2001; 41(10): 1193-203.
- 19- Magovern JA, Sakert T, Benckart DH, Burkholder JA, Liebler GA, Magovern GJ Sr, *et al.* A model for predicting transfusion after coronary artery bypass grafting. *Ann Thorac Surg* 1996; 61(1): 27-32.
- 20- Utley JR. Pathophysiology of cardiopulmonary bypass: current issues. *J Card Surg* 1990; 5(3): 177-89.
- 21- Shevde K, Pagala M, Kashikar A, Tyagaraj C, Shahbaz N, Iqbal M, *et al.* Gender is an essential determinant of blood transfusion in patients undergoing coronary artery bypass graft procedure. *J Clin Anesth* 2000; 12(2): 109-16.
- 22- van Straten AH, Kats S, Bekker MW, Verstappen F, ter Woort JF, van Zundert AJ, *et al.* Risk factors for red blood cell transfusion after coronary artery bypass graft surgery. *J Cardiothorac Vasc Anesth* 2010; 24(3): 413-7.
- 23- Greinacher A, Fendrich K, Hoffmann W. Demographic changes: the impact for safe blood supply. *Transfus Med Hemother* 2010; 37(3): 141-8.
- 24- Vamvakas EC, Taswell HF. Epidemiology of blood transfusion. *Transfusion* 1994; 34(6): 464-70.
- 25- Wallis JP, Wells AW, Matthews JN, Chapman CE. Long-term survival after blood transfusion: a population based study in the North of England. *Transfusion* 2004; 44(7): 1025-32.
- 26- Ferraris VA, Gildengorin V. Predictors of excessive blood use after coronary artery bypass grafting. A multivariate analysis. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1989; 98(4): 492-7.
- 27- Parr KG, Patel MA, Dekker R, Levin R, Glynn R, Avorn J, *et al.* Multivariate predictors of blood product use in cardiac surgery. *J Cardiothorac Vasc Anesth* 2003; 17(2): 176-81.
- 28- Aydın B, Demir A, Güçlü ÇY, Bölükbaşı D, Ünal EU, Koçulu R, *et al.* Hematological predictors and clinical outcomes in cardiac surgery. *J Anesth* 2016; 30(5): 770-8.
- 29- Elmistekawy ME, Errett L, Fawzy HF. Predictors of packed red cell transfusion after isolated primary coronary artery bypass grafting--the experience of a single cardiac center: a prospective observational study. *J Cardiothorac Surg* 2009; 4: 20.
- 30- Galas FR, Almeida JP, Fukushima JT, Osawa EA, Nakamura RE, Silva CM, *et al.* Blood transfusion in cardiac surgery is a risk factor for increased hospital length of stay in adult patients. *J Cardiothorac Surg* 2013; 8: 54.

Original Article

Evaluation of blood use in cardiac surgery

Shahbazi M.¹, Chegini A.¹, Ahmadinejad M.¹

¹Blood Transfusion Research Center, High Institute for Research and Education in Transfusion Medicine, Tehran, Iran

Abstract

Background and Objectives

Blood transfusion plays an important role in cardiac surgery. Cardiac surgery, though being practiced for only a minority of hospitalized patients, accounts for the use of more than 80% of blood components.

Materials and Methods

A prospective study was carried out during October 2015 to March 2016 in Shahid Modares Hospital. Blood utilization trends in different types of cardiac surgery were observed and the variables such as age, gender, Hemoglobin (Hb), Hematocrit (Hct), Body Surface Area (BSA) and their effects on transfusion were studied. Data were analyzed by SPSS (version 22) software. K2 test and Mann-Whitney U test were used.

Results

The patients with Hb and Hct levels lower than 11 gr/dL and 33% were the ones who received transfusion more than the others (p value < 0.001). Type of surgery affected the use of blood. The most common surgery in our study was CABG (71.6%) that accounted for the use of 1 to 7 units (the mean rate of 3.3 units).

Conclusions

A lower number of blood units was shown to be administered during surgery to the patients with higher Hb and Hct levels and larger BSA.

Key words: Cardiac Surgery, Red Blood Cell Transfusion, Blood Transfusion

Received: 4 Sep 2016

Accepted: 12 Aug 2017

Correspondence: Chegini A., MD. Specialist in Anesthesiology. Assistant Professor of Blood Transfusion Research Center, High Institute for Research and Education in Transfusion Medicine. P.O.Box: 14665-1157, Tehran, Iran. Tel: (+9821) 82052256; Fax: (+9821) 88601599
E-mail: a.chegini@ibto.ir