

ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین

معصومه شهبازی^۱، مینو احمدی نژاد^۲

چکیده

سابقه و هدف

هپارین یکی از شایعترین داروهای ضد انعقاد مورد استفاده برای پیشگیری و درمان حوادث ترومبوآمبولیک است که توسط پزشکان تجویز می‌گردد. ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین یا HIT، عارضه‌ای نادر ولی تهدید کننده حیات، ناشی از مصرف هپارین می‌باشد. تشخیص HIT بر اساس دو پایه اصلی، ارزیابی بالینی و بررسی‌های آزمایشگاهی بنا شده است. هدف از این مقاله مروری، بررسی فاکتورهای خطر، علائم بالینی، پاتوفیزیولوژی، روش‌های تشخیصی و درمان HIT بود.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه به جستجوی مقالات مرتبط در پایگاه‌های اطلاعاتی مانند Pub Med با استفاده از کلید واژه‌های هپارین، ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین، پاتوفیزیولوژی، تشخیص و درمان در بازه زمانی ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۸ پرداخته شد.

یافته‌ها

این بیماری هم‌چنان یک رخداد تهدیدکننده حیات بوده که در اثر ایجاد آنتی‌بادی علیه کمپلکس هپارین-PF4 ایجاد می‌شود و در صورت فعال‌سازی پلاکت‌ها می‌تواند منجر به رخدادهای ترومبوتیک خطرناکی در بیماران گردد. هم‌چنین روش‌های تشخیصی آزمایشگاهی اهمیت فراوانی در رد یا تایید تشخیص این بیماری کشنده داشته و لذا انجام آن‌ها در بیمارانی که به لحاظ بالینی مشکوک به این عارضه هستند، ضروری است.

نتیجه‌گیری

امروزه با شناخت بهتر پاتوفیزیولوژی بیماری و هم‌چنین با پیشرفت‌های حاصله در سرعت و دقت روش‌های تشخیصی آزمایشگاهی، تحولی مهم در تشخیص سریع‌تر این بیماری به وجود آمده است.

کلمات کلیدی: هپارین، ترومبوسیتوپنی، تشخیص

تاریخ دریافت: ۹۷/۱۰/۱۱

تاریخ پذیرش: ۹۸/۲/۲۲

۱- کارشناس ارشد هماتولوژی و بانک خون - مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون - تهران - ایران
۲- مؤلف مسئول: متخصص آسیب‌شناسی - استادیار مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون - تهران - ایران - صندوق پستی: ۱۴۶۶۵-۱۱۵۷

مقدمه

هپارین با وزن مولکولی بالا (UFH: Unfractionated heparin) و سایر مشتقات آن مانند هپارین با وزن مولکولی پایین (LMWH: Low molecular weight heparin) در میان بیشترین داروهای تجویز شده در سراسر جهان قرار دارند. علی‌رغم این که در سال‌های اخیر، داروهای ضد انعقادی جدیدی معرفی شده‌اند اما هم‌چنان هپارین به عنوان داروی مورد علاقه پزشکان به دلیل ویژگی‌های مطلوبی مانند شروع عملکرد سریع، توانایی مهار پروتئین‌های انعقادی، متنوع، آسان بودن مانیتورینگ و برگشت، به عنوان پیشرو در پروفیلاکسی و درمان بسیاری از شرایط بالینی از جمله: جراحی قلب و عروق و روش‌های تهاجمی (cardiovascular surgery and invasive procedures)، سندروم‌های حاد کرونری (acute coronary syndromes)، ترومبومبولیسم وریدی (venous thromboembolism)، فیبریلاسیون دهلیزی (atrial fibrillation)، بیماری انسداد محیطی (peripheral occlusive disease)، در موارد گردش خون در خارج از بدن (extracorporeal circulation) و دیالیز (dialysis) استفاده شده و پیش‌بینی می‌شود استفاده از این دارو در آینده نیز ادامه پیدا کند (۱، ۲).

ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین (Heparin Induced Thrombocytopenia)، یکی از عوارض خطرناک درمان با داروی هپارین بوده و از آن جا که می‌تواند منجر به فعال‌سازی پلاکت‌ها شود، خطر ایجاد ترومبوز و مرگ و میر متعاقب آن وجود دارد. از آن جا که HIT یک سندروم بالینی - آزمایشگاهی می‌باشد، تشخیص آن باید بر اساس یافته‌های بالینی و نتایج تست‌های آزمایشگاهی صورت گیرد و استفاده تنها از هر کدام از آن‌ها می‌تواند منجر به عدم تشخیص (miss diagnosis) و یا تشخیص بیش از حد واقعی (over-diagnosis) این پدیده گردد (۳، ۴). در این مقاله مروری، خوانندگان با پیشرفت‌های اخیر در مورد پاتوفیزیولوژی، علائم بالینی، روش‌های ارزیابی بالینی، تست‌های آزمایشگاهی و دارودرمانی HIT آشنا خواهند شد.

چرا HIT مهم است؟

سالانه حدود ۱۲ میلیون بیمار در آمریکا تحت درمان

با هپارین قرار می‌گیرند و از آن جا که HIT می‌تواند به صورت رخدادهای ترومبوتیک بسیار مخرب بروز نماید، این رخدادهای باعث شده HIT در میان واکنش‌های نامطلوب دارو درمانی، جایگاه ویژه‌ای داشته باشد. تخمین زده می‌شود سالانه حدود ۶۰۰ هزار مورد جدید HIT در ایالت متحده آمریکا رخ داده که تقریباً در حدود نیمی از آن‌ها رخدادهای ترومبوتیک بروز می‌یابد و حدود ۹۰ هزار بیمار دچار مرگ می‌شوند که این آمار قابل مقایسه با آمار سالانه ۲۶۰ هزار مورد جدید سرطان تهاجمی پستان در ایالت متحده می‌باشد. از طرفی HIT عارضه‌ای پر هزینه می‌باشد به طوری که در آمریکا میزان ضرر مالی بالقوه آن ۳۳ تا ۱۰۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود (۵، ۶). علی‌رغم اهمیت این بیماری، تاکنون کمتر از ۱۰ مقاله در خصوص این بیماری یا گزارش موردی آن از ایران به چاپ رسیده است که در متن به نتایج برخی از آن‌ها اشاره خواهد شد.

تعریف ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین:

دو نوع ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین تعریف شده است:

نوع ۱ یا ترومبوسیتوپنی همراه با هپارین (Heparin-associated thrombocytopenia):

در ۳۰٪-۱۰٪ از بیمارانی که هپارین دریافت می‌کنند، به شکل ترومبوسیتوپنی خفیف، طی دو یا سه روز بعد از دریافت هپارین، تظاهر پیدا می‌کند. مکانیسم آن هنوز کاملاً شناخته نشده است اما احتمالاً ناشی از اثر آگلوتینه‌کنندگی هپارین بر روی پلاکت‌ها بوده و با مکانیسم‌های غیر ایمنون ایجاد می‌شود. در این نوع، شمارش پلاکت‌ها حتی با ادامه درمان هپارین به طور خود به خود طبیعی شده و مهمتر این که با خطر ترومبوز همراه نمی‌باشد (۷).

نوع ۲ یا ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین (HIT):

معمولاً در ۵٪-۱٪ از بیماران تحت درمان با هپارین رخ داده و یک بیماری تهدیدکننده حیات با مکانیسم ایمنون می‌باشد و امروزه واژه ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین (HIT) برای این نوع به کار می‌رود. با توجه به خطر بالای ترومبوز و مرگ و میر متعاقب آن، در صورت شک و یا

آنتی‌بادی علیه کمپلکس هپارین - فاکتور ۴ پلاکتی است. فاکتور ۴ پلاکتی به دلیل دارا بودن بار مثبت تمایل زیادی برای اتصال به مولکول‌هایی با بار منفی مانند هپارین و دیگر گلیکوز آمینوگلیکان‌ها دارد از این رو این مولکول با هپارین در گردش، تشکیل کمپلکس هپارین-فاکتور ۴ پلاکتی داده که منجر به تولید آنتی‌بادی علیه این کمپلکس می‌شود. با وجود این که هر سه آنتی‌بادی IgM، IgG و IgA علیه این کمپلکس تولید می‌گردند اما تاکنون تنها مشخص گردیده است که اتصال آنتی‌بادی IgG به FcγRIIa سطح پلاکتی، باعث تغییر غشای آن و تولید میکروپارتیکل‌های پیش انعقادی، تومبوسیتوپنی و تسریع تولید ترومبین می‌گردد. با وجود این که آنتی‌بادی‌های IgM و IgA در پاتوفیزیولوژی HIT نقش دارند اما نقش آن‌ها کاملاً مشخص نشده است و احتمال دارد در ارتباط با ایجاد علائم بالینی نباشند. هم چنین فاکتورهای ۴ پلاکتی آزاد شده از پلاکت‌ها می‌توانند به گلیکوز آمینوگلیکان‌های شبه هپارینی بر سطح سلول‌های اندوتلیال متصل شوند و منجر به تولید آنتی‌بادی علیه این کمپلکس‌ها و در نتیجه آسیب سلول‌های اندوتلیال و تولید فاکتور بافتی (Tissue factor) گردند. هم چنین این آنتی‌بادی‌ها می‌توانند به رسپتورهای سطح منوسیت‌ها نیز متصل شده و باعث آزادسازی فاکتور بافتی شوند. تمامی این رویدها منجر به ایجاد شرایط پیش انعقادی گردیده که حتی با قطع مصرف هپارین می‌تواند برای روزها ادامه پیدا کند (شکل ۱) (۱۳-۱۱).

شیوع، اپیدمیولوژی و فاکتورهای خطر ابتلا به HIT:

مطالعه‌های مختلف میزان شیوع HIT را از ۰/۱٪ تا ۵٪ گزارش نموده‌اند (۱۷-۱۴). این میزان شیوع با توجه به نوع هپارین (UFH یا LMWH) دریافتی و مدت زمان دریافت هپارین متفاوت بوده به طوری که بروز آن در دریافت‌کنندگان LMWH در مقایسه با UFH پایینتر می‌باشد که علت آن را به توانایی کمتر LMWH (۱۰ برابر کمتر از UFH) در تحریک سیستم ایمنی بیماران دریافت‌کننده این دارو نسبت می‌دهند (۱۸). هم چنین میزان بروز این بیماری در دریافت‌کنندگان هپارین UFH با منشاء خوکی نسبت به

تشخیص این نوع ترومبوسیتوپنی، تزریق هپارین باید سریعاً متوقف گردیده و از ضد انعقادها جایگزین برای جلوگیری از بروز رخ دادهای ترومبوتیک استفاده شود. موارد معدود ولی بسیار خطرناکی از HIT وجود دارد که به نام HIT خودبه‌خودی یا اتوایمون (spontaneous HIT syndrome) نامیده می‌شود. این نوع HIT در غیاب مواجهه با هپارین رخ می‌دهد و بیشتر بعد از اعمال جراحی بزرگ (به ویژه بعد از تعویض زانو) و در عفونت‌های اخیر مشاهده شده و برخلاف HIT معمول که شمارش پلاکت معمولاً در حدود ۲ تا ۵ روز بعد از شروع درمان با ضد انعقاد جایگزین افزایش پیدا می‌کند، این نوع از HIT می‌تواند برای هفته‌ها علی‌رغم قطع هپارین ادامه یابد (۱۰-۷).

الگوهای شروع HIT:

سه نوع الگو برای شروع HIT وجود دارد:


۱- الگوی معمول ترومبوسیتوپنی در HIT (Typical-onset HIT)؛ که تقریباً ۶۰٪ موارد را به خود اختصاص می‌دهد و در روزهای ۵ تا ۱۰ بعد از شروع هپارین درمانی رخ می‌دهد.

۲- الگوی سریع (Rapid-onset HIT)؛ در بیمارانی که در طی ۹۰ روز گذشته (به ویژه ۳۰ روز گذشته) هپارین دریافت نموده‌اند، به دلیل حضور آنتی‌بادی‌های در گردش بلافاصله در مواجهه مجدد با هپارین رخ داده و معمولاً ۳۰٪ موارد را به خود اختصاص می‌دهد. در این الگو، HIT می‌تواند با رخداد آنافیلاکتوئیدی که متعاقب تزریق داخل وریدی هپارین رخ می‌دهد، پیچیده شود.

۳- الگوی تاخیری HIT (Delayed onset HIT)؛ در بعضی از بیماران، HIT حتی با قطع مصرف هپارین توسعه پیدا کرده و یا بدتر شده و به طور میانگین ۹ روز بعد از شروع هپارین درمانی رخ می‌دهد. این بیماران ممکن است ترومبوز را در طی ۳ هفته بعد از شروع مواجهه با هپارین بروز دهند (۸، ۹، ۱).

پاتوفیزیولوژی HIT:

HIT یک واکنش ایمنی می‌باشد که مشخصه آن تولید



شکل ۱: پاتوفیزیولوژی HIT: نقش پلاکت‌ها، کمپلکس هپارین-فاکتور ۴ پلاکتی و کمپلکس آنتی‌بادی-فاکتور ۴ پلاکتی-هپارین (۱۹)

علائم بالینی:

۱- ترومبوسیتوپنی:

ترومبوسیتوپنی حاد تقریباً یک هفته بعد از شروع هپارین درمانی، به عنوان مهم‌ترین علامت بالینی HIT در نظر گرفته می‌شود و تقریباً در ۹۵٪ از بیماران HIT، در طول دوره بیماریشان اتفاق می‌افتد. افت ۵۰٪ شمارش پلاکت بیمار از مقدار پایه به عنوان مهم‌ترین یافته بیماری بوده که در ۹۰٪ بیماران سطح پلاکت به زیر 150×10^9 (یعنی به سطح مورد نظر در تعریف متداول ترومبوسیتوپنی) و در اغلب بیماران بالای 55×10^9 می‌رسد. در تعداد اندکی از بیماران، افت ۵۰٪ شمارش پلاکت با توجه به تعداد پلاکت در ابتدای شروع درمان با هپارین (سطح پایه) در سطحی خواهد بود که در تعریف معمول ترومبوسیتوپنی قرار نمی‌گیرد. به همین دلیل اطلاع از سطح پلاکت پایه در تشخیص بیماری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است (۲۱، ۸).

در کمتر از ۵٪ از بیماران با HIT، شمارش پلاکت کمتر از 20×10^9 می‌باشد. ترومبوسیتوپنی شدید در HIT با خطر بالایی از همراهی با رخداد های ترومبوتیک

هپارین با منشاء گاوی کمتر است. HIT در میان بیماران جراحی شایع‌تر از بیماران داخلی (Medical patients) می‌باشد و بالاترین بروز را در بیماران ارتوپدی (۳-۵٪) و سپس در بیماران جراحی قلب (۱-۳٪) و کمترین بروز را در گروه جراحی‌های زنان و زایمان دارد (کمتر از ۱٪). هم چنین خطر بروز این عارضه در زنان تقریباً دو برابر مردان می‌باشد (۱۷-۱۴).

در حالی که میزان بروز سندرم HIT در بیماران دریافت‌کننده هپارین در بالا ذکر شده، لیکن باید مطلع باشیم که شیوع آنتی‌بادی‌های ضد کمپلکس هپارین-فاکتور ۴ پلاکتی بسیار بالاتر از درصدهای گزارش شده می‌باشد به طوری که در ۷۰-۷٪ از کل بیماران تحت درمان با هپارین، می‌توان آنتی‌بادی علیه کمپلکس هپارین-فاکتور ۴ پلاکتی را یافت اما نهایتاً سندرم HIT فقط در تعداد کمی از این بیماران بروز پیدا می‌کند (۱۱).

هم چنین در مطالعه‌ای که توسط شهبازی و همکارانش بر روی بیماران جراحی قلب در ایران انجام شد، میزان فراوانی این پدیده را در این گروه ۵/۴٪ گزارش نمودند (۲۰).

است (۲۲).

در ۵٪ بیماران، نكروز ایسکمیک اندام، دیده شده که این موضوع غالباً مرتبط با استفاده از وارفارین و نتیجتاً کاهش پروتئین C بوده و منجر به ایجاد میکروترومبوز می‌گردد (۲۳-۲۱، ۱۵).

بررسی بالینی HIT (قبل از انجام تست‌های آزمایشگاهی)، ابزار ارزیابی بالینی:

به دلیل مصرف گسترده هپارین در بیماران بستری شده در بیمارستان و هم‌چنین فراوانی ترومبوسیتوپنی (۵۰٪-۳۰٪) در این گروه از بیماران به دلایل متعدد که موجب هم‌زمانی مصرف هپارین و ترومبوسیتوپنی می‌گردد، ضروری است روش‌های تشخیصی مطمئنی برای تشخیص و یا رد HIT در بیماران در نظر گرفته شود. از آن‌جایی که روش‌های آزمایشگاهی خود دارای محدودیت‌های مهمی در تشخیص HIT بوده و استفاده از آن‌ها در قدم اول تشخیص این بیماری منجر به تشخیص بیش از حد واقعی و در برخی موارد منجر به عدم تشخیص می‌گردد ضروری است بیماران در مرحله اول، به عنوان اولین و مهمترین گام تشخیصی، بر اساس یافته‌های بالینی ارزیابی گردند (۲۶-۲۳، ۱۷). به همین دلیل روش‌های متعددی برای ارزیابی بیمار مظنون به HIT پیشنهاد گردیده است که شامل:

1- 4Ts score:

رایج‌ترین و مهم‌ترین سیستم امتیازدهی بالینی مورد استفاده می‌باشد که اولین بار در سال ۲۰۰۳ توسط وارکتین و همکارانش در دانشگاه مک‌مستر کانادا پیشنهاد گردید. اعتبار این سیستم بعدها در مطالعه‌های زیادی مورد ارزیابی قرار گرفت و مشاهده گردید این سیستم جهت تشخیص اولیه HIT از اعتبار بالایی برخوردار می‌باشد. این سیستم به بررسی ۴ ویژگی مشخص HIT می‌پردازد. (۱) ترومبوسیتوپنی (۲) زمان شروع افت پلاکت (۳) حضور ترومبوز (یا سایر عوارض بالینی) (۴) عدم حضور سایر علل ترومبوسیتوپنی.

هر کدام از این پارامترها، امتیازی بین ۰-۲ را کسب کرده و جمع نهایی امتیازها از صفر تا ۸ متفاوت است.

با توجه به شیوع بالای ترومبوسیتوپنی در بیماران بستری، زمانی که تنها علامت بالینی بیمار کاهش پلاکت می‌باشد، بایستی سایر تشخیص‌های افتراقی در نظر گرفته شود که شامل؛ بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه ICU (در ۴۶٪-۳۸٪ این بیماران، ترومبوسیتوپنی دیده می‌شود)، آمبولیسم حاد ریوی، مرحله آخر بیماری کلیوی، سپسیس، بیماران با عمل جراحی بای‌پس قلبی - ریوی اخیر و عوارض دارویی می‌باشد (۱۶).

۲- ترومبوز:

خطرناکترین یافته HIT، ترومبوز است که در ۵۷٪-۲۹٪ از بیماران با HIT می‌تواند رخ دهد. تا قبل از دسترسی به درمان‌های رایج، حدود ۹٪ از رخدادهای ترومبوتیک ناشی از HIT منجر به قطع عضو و ۱۶٪ منجر به مرگ می‌گردید (۲۲).

ترومبوز وریدهای عمقی با یا بدون آمبولیسم ریوی شایع‌ترین ترومبوزهای ناشی از HIT می‌باشند (۵۰٪ از بیماران). ترومبوزهای ورید اندام فوقانی معمولاً کمتر رخ داده و در ارتباط با استفاده هم‌زمان یا مکرر از کاتترهای درون عروقی می‌باشد (۲۲). ترومبوزهای وریدی نسبت به ترومبوزهای سرخرگی در بیماران داخلی (medical patients) و یا بعد از عمل جراحی ارتوپدی غالب بوده در حالی که به دنبال اعمال جراحی قلب و عروق در HIT این نسبت مشابه است (۱۶).

ترومبوزهای کمتر معمول، شامل ترومبوز وریدهای مغزی (سینوس دورال) و احشایی (مزانتریک و آدرنال) می‌باشند. ترومبوز ورید آدرنال تقریباً در ۲٪ از بیماران رخ داده و به شکل انفارکتوس خونریزی‌دهنده آدرنال خود را نشان می‌دهد. وقتی که نكروز آدرنال دو طرفه باشد، می‌تواند منجر به نارسایی حاد آدرنال گردد.

در ۲۰٪-۱۰٪ بیماران، نكروز پوستی در محل تزریق هپارین رخ داده که به عنوان یکی از حوادث ترومبوتیک در نظر گرفته می‌شود.

ترومبوزهای سرخرگی در HIT شامل: مغزی، کرونری، مزانتریک، سرخرگ‌های براکیال و اندام تحتانی هستند.

HIT expert probability score (HIT) score (2)

در تلاش برای بهبود اختصاصیت و ارزش پیش‌آگهی دهنده مثبت 4Ts score، روش HIT expert probability (HEP) با استفاده از نظر کارشناسان توسعه یافت. در این مدل از ۲۶ کارشناس خواسته شد تا به ۸ ویژگی بالینی HIT (۱- شدت افت پلاکت، ۲- زمان افت پلاکت، ۳- مرز شمارش پلاکتی، ۴- ترومبوز، ۵- نکرور پوستی، ۶- واکنش حاد سیستمیک، ۷- خونریزی و ۸- سایر علل ترومبوسیتوپنی) امتیازی بین ۳- (شدیداً به نفع رد تشخیص HIT) تا ۳+ (شدیداً به نفع تشخیص HIT) اختصاص دهند (۲۰). در یک مطالعه گذشته‌نگر امتیاز آستانه ۵ (cut off : ۵) در ارتباط با ارزش پیش‌آگهی دهنده مثبت ۵۵٪ (۸۲٪-۲۵٪) و ارزش پیش‌آگهی دهنده منفی ۹۷٪ (۱۰۰٪-۸۵٪) گزارش گردید که مشابه ارزش پیش‌آگهی دهنده 4Ts score است (۳۱). با این وجود بر خلاف 4Ts score که برای انجام، تقریباً راحت می‌باشد این روش پیچیده‌تر بوده و استفاده از آن پر زحمت‌تر است اما برای بیماران ICU و پزشکان با تجربه کمتر مناسب بوده و تایید صحت این روش نیازمند مطالعه‌های آینده‌نگر زیادی می‌باشد (۳۲، ۲۰).

سیستم امتیازدهی بالینی در جراحی قلب (Lillo-Le Louet):

چالش برانگیزترین زمینه برای تشخیص HIT از سایر علل ترومبوسیتوپنی در جراحی قلب می‌باشد چرا که عوامل خطر متعددی برای کاهش پلاکت وجود دارد که باعث پیچیده شدن تشخیص HIT می‌شود. از جمله این عوامل می‌توان به اثر ترقیقی، عفونت/انعقاد داخل عروقی منتشر (DIC)، شوک کاردیوژنیک، وسیله‌های مکانیکی و داروهای مختلف اشاره کرد. هم‌چنین افزایش خطر ترومبوز تا ۲۰٪ و شیوع بالای آنتی‌بادی علیه کمپلکس هپارین-فاکتور ۴ پلاکتی (۷۰٪-۲۵٪) در این گروه از بیماران مشاهده می‌شود (۲۰). با وجود بالا بودن این عوامل، خطر بروز HIT بعد از عمل جراحی قلب پایین می‌باشد (۲٪-۰/۶٪). به دلیل مشکل بودن تشخیص HIT بعد از عمل جراحی قلب، لیلولی لوئت و همکارانش سه

امتیازها در سه گروه امتیاز پایین (۱-۳)، امتیاز متوسط (۴-۵) و امتیاز بالا (۶-۸) طبقه‌بندی می‌شود. مطالعه‌های مختلفی ارزش پیش‌آگهی دهنده منفی (Negative Predictive Value: NPV) 4Ts score را بالا (۹۹/۸٪) گزارش کرده‌اند به طوری که در اغلب مطالعه‌ها این گونه نتیجه‌گیری شده که امتیاز کمتر از ۳ با قاطعیت بالایی تشخیص HIT را رد می‌کند و این در حالی است که ارزش پیش‌آگهی دهنده مثبت (Positive Predictive Value PPV) برای امتیاز متوسط ۲۰٪-۱۰٪ و برای امتیاز بالا، ۸۰٪-۴۰٪ می‌باشد، بنابراین زمانی که بیمار دارای امتیاز بالینی متوسط و بالا می‌باشد، تایید تشخیص باید به روش‌های آزمایشگاهی صورت گیرد تا تشخیص HIT از صحت بالایی برخوردار شود (۲۹-۲۷).

تاکنون در ایران مطالعه‌های معدودی در زمینه HIT صورت گرفته که در غالب آن‌ها روش تشخیصی HIT به دلیل محدودیت‌های دسترسی به تست‌های آزمایشگاهی، صرفاً بر اساس ارزیابی بالینی بوده و در اکثریت آن‌ها صرفاً از روش ارزیابی بالینی 4Ts score استفاده شده است. این مطالعه‌ها طراحی‌های متفاوتی داشته و در جامعه‌های آماری متفاوتی بررسی شده‌اند. نتایج آن‌ها مؤید ۸۵٪ تا ۱۵/۶٪ تواتر HIT بوده است (۳۱، ۳۰). در مطالعه‌ای که شهبازی و همکاران در سال ۹۵ بر روی ۹۲ بیمار تحت عمل جراحی قلب در بیمارستان شهید مدرس تهران انجام دادند، برای ارزیابی HIT از روش 4Ts score و بررسی آزمایشگاهی ELISA استفاده نمودند. در این مطالعه یکی از یافته‌های قابل تعمق، عدم ثبت نتایج 4Ts score (البته در صورت محاسبه پزشک) در پرونده‌های بیماران بود.

محققین در این مطالعه بر اساس اطلاعات پرونده بیماران به محاسبه 4Ts score پرداخته و بر اساس همین بررسی، احتمال تشخیص HIT در ۱۴ بیمار (۱۵/۲٪) مطرح گردید. پس از افزودن بررسی آزمایشگاهی Anti PF4/Heparin Ab به روش ایمنونواسی برای ارزیابی احتمال HIT در این ۱۴ بیمار، در ۸ بیمار (۸/۶٪) آزمایش مثبت بود و این موضوع اهمیت تشخیص بر اساس دو بازوی ارزیابی بالینی و ارزیابی آزمایشگاهی را نشان می‌دهد (۲۵).

تشخیص HIT به ویژه در بیماران با امتیاز بالینی متوسط و بالا ضروری می‌باشد. به دلیل فراوانی بالای آنتی‌بادی علیه کمپلکس Heparin-PF4 در بعضی از جمعیت‌های بیماران (مانند بعد از عمل جراحی قلب)، از این تست‌ها نباید جهت غربالگری بیماران استفاده کرد. تست‌های آزمایشگاهی جهت تشخیص HIT به طور کلی شامل دو دسته تست‌های ایمنولوژیک و عملکردی می‌باشند (۱۶) (جدول ۱).

۱- آزمایش‌های ایمنولوژیک:

این دسته از آزمایش‌ها کلیه آنتی‌بادی‌هایی را که علیه کمپلکس Heparin-PF4 ساخته شده شناسایی می‌کنند، اما قادر به افتراق آنتی‌بادی‌هایی که توانایی فعال‌سازی پلاکت‌ها را دارند، از سایر موارد پاتولوژیک ندارند.

حساسیت بالا، سهولت و سرعت انجام، سبب گردیده است بیشتر آزمایشگاه‌های بالینی از این دسته از آزمایش‌ها جهت تشخیص HIT استفاده کنند (۳۴). انواع مختلفی از آزمایش‌های ایمنولوژیک وجود دارد که خود به دو دسته Enzyme linked immunosorbant assay (ELISA) و Particle-based immunoassays (PaGIA) تقسیم می‌شوند (۳۶).

آزمایش الیزا دارای حساسیت (۹۹٪) و NPV بالایی می‌باشد بنابراین در بیشتر مواقع نتیجه منفی این آزمایش بیانگر رد بودن تشخیص HIT است. دلیل این که ارزش پیش‌آگهی دهنده منفی ELISA نمی‌تواند ۱۰۰٪ باشد (۹۹٪-) پاتولوژیک (مانند IgA و IgM) در بعضی از کیت‌ها بوده و از طرفی آنتی‌بادی‌های HIT همواره علیه کمپلکس Heparin-PF4 نبوده و گاهی اوقات این آنتی‌بادی‌ها علیه عوامل فعال‌کننده پلاکتی مانند اینترلوکین ۸ (IL-8) و پپتید فعال‌کننده ۲ نوترفیل (NAP-2) ایجاد می‌شوند که کیت‌های ELISA در حال حاضر قادر به شناسایی این دسته از آنتی‌بادی‌ها نمی‌باشند (۱۶).

با این وجود اختصاصیت این آزمایش‌ها تقریباً پایین بوده (۷۰٪-۳۰٪) و بیانگر این است که بیماران با علائم بالینی HIT که نتیجه آزمایش ELISA آن‌ها مثبت شده

متغیر غیر وابسته بالینی را در زمینه تشخیص HIT شناسایی کردند که شامل: (۱) الگوی افت پلاکت، (۲) مدت زمان عمل جراحی بای‌پس قلبی - ریوی تا زمان ظن به HIT و (۳) طول مدت عمل بای‌پس قلبی - ریوی بود. آن‌ها مشاهده کردند بیمارانی که HIT را بعد از عمل جراحی قلب بروز می‌دهند، دارای الگوی دو فازه مشخص در بازگشت شمارش پلاکت می‌باشند به طوری که در الگوی نوع یک، شمارش پلاکت در ۲ تا ۴ روز بعد از عمل جراحی کاهش یافته سپس به حد طبیعی و یا بالاتر از حد طبیعی بر می‌گردد که این پدیده به طور معمول بعد از عمل جراحی قلب اتفاق می‌افتد ولی در صورتی که دوباره افت پیدا کند، این موضوع به دلیل توسعه آنتی‌بادی‌های HIT می‌باشد و در صورتی که این ترومبوسیتوپنی بیش از ۵ روز ادامه پیدا کند، الگوی نوع ۲ خوانده می‌شود. بر اساس این مشاهدات امتیازی به هر یک از الگوهای افت پلاکتی تعلق می‌گیرد (الگوی افت پلاکت نوع یک: ۲ امتیاز و الگوی افت پلاکتی نوع دو: ۱ امتیاز).

متغیرهای دیگر نیز امتیازاتی کسب کرده که شامل طول زمان، از هنگام عمل جراحی قلب تا ظن به HIT (≤ 5 روز: ۲ امتیاز و > 5 روز: ۰ امتیاز) و طول عمل جراحی (≥ 118 دقیقه: ۱ امتیاز و < 118 دقیقه: ۰ امتیاز) می‌باشند. مجموع امتیازاتی که بیمار از این سیستم می‌گیرد، از ۰ تا ۵ است. آن‌ها مشاهده کردند امتیاز ≤ 2 در ارتباط با احتمال بالایی از HIT بوده (ارزش پیش‌آگهی دهنده مثبت بالا (PPV: ۶۲٪) در حالی که امتیاز ≤ 5 در ارتباط با احتمال بسیار بالاتری می‌باشد (PPV: ۹۵٪). در یک مطالعه به مقایسه این سیستم با 4Ts score پرداخته شد و مشاهده گردید هر دو سیستم PPV پایینی داشته اما این سیستم ارزش پیش‌آگهی دهنده منفی (NPV= ۷۸٪) پایین‌تری از 4Ts score (۹۱٪) دارد. محققان نتیجه گرفتند با وجود این که عملکرد تشخیصی هر دو سیستم امتیازدهی، پایین است اما الگوی پلاکتی نوع ۱ بعد از عمل جراحی قلب به عنوان قویترین پیش‌گویی کننده HIT در این شرایط می‌باشد (۳۲، ۳۴).

تست‌های آزمایشگاهی:

انجام تست‌های آزمایشگاهی جهت تایید و یا رد

توسط ارزیابی آزادسازی سروتونین نشاندار شده (میزان C-Serotonin ۱۴) بررسی می‌شود. این آزمایش دارای حساسیت (۱۰۰٪-۸۸٪) و اختصاصیت (۱۰۰٪-۸۹٪) بالایی بوده و معمولاً در آزمایشگاه‌های مرجع قادر به انجام آن می‌باشند (۳۸).

در این روش پلاکت‌های شسته شده با C-serotonin ۱۴ انکوبه شده سپس پلاکت‌ها مواد رادیو اکتیو را جذب کرده و در گرانول‌های متراکم خود ذخیره می‌کنند. در مرحله بعد پلاکت‌های شسته شده همراه با سرم بیمار و هپارین در چاهک‌های میکروتیتر با انتهای مسطح به صورت دوپل بر روی شیکر پلیت انکوبه می‌شود. بعد از ۶۰ دقیقه انکوباسیون و سانتیفریژ، مایع رویی (supernatants) ترکیب واکنشی را جمع‌آوری کرده و رادیواکتیویته آن اندازه‌گیری می‌شود. نتایج آزمایش به صورت درصد آزادسازی سروتونین در مقایسه با حداکثر لیز پلاکتی القا شده توسط دترجنت (۱۰۰٪) (detergent-induced platelet lysis) بیان می‌گردد. آزمایشی مثبت در نظر گرفته می‌شود که بیش از ۲۰٪ آزادسازی سروتونین در غلظت‌های درمانی هپارین و کمتر از ۲۰٪ در غلظت فوق درمانی هپارین را نشان دهد (۳۸-۳۶).

HIPA (Heparin induced platelet aggregation):

در این روش، از پلاکت‌های چهار اهداکننده سالم استفاده می‌شود. پلاکت‌های شسته شده در مجاورت سرم بیمار در حضور بافر (به عنوان کنترل منفی)، هپارین با وزن مولکولی پایین در محدوده دوز درمانی (anti-*reviparin*، ۰/۲ FXa/mL) و یا هپارین در محدوده دوز فوق درمانی (UFH، ۱۰۰ IU/mL) در چاهک‌های میکروتیتر با انتهای مدور شفاف انکوبه می‌شود. از دستگاه مگنتیک استایر به عنوان منبع shear force استفاده می‌شود و تشکیل تجمع‌های پلاکتی را هر ۵ دقیقه به صورت چشمی بررسی می‌کنند. آزمایشی مثبت در نظر گرفته می‌شود که تجمع پلاکتی در غلظت‌های هپارین درمانی حداقل ۲ اهداکننده از ۴ نفر مشاهده شود اما این تجمع در طول ۳۰ دقیقه در غلظت‌های فوق درمانی هپارین مشاهده نشود.

است، الزاماً دارای آنتی‌بادی‌های پاتولوژیک مرتبط با HIT نبوده (موارد مثبت کاذب بالا) و نیاز به انجام آزمایش‌های تکمیلی جهت تشخیص قطعی HIT می‌باشد. روش‌های مختلفی برای افزایش اختصاصیت آزمایش‌های ایمونولوژیک وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به محدود کردن این آزمایش‌ها به شناسایی آنتی‌بادی‌های IgG و استفاده از مرحله تاییدی هپارین با غلظت بالا اشاره کرد (۳۷). در آزمایش ELISA، آنتی‌ژن هدف (کمپلکس‌های پلی‌آنیون PF4-) به یک فاز جامد مانند پلیت‌های میکروتیتر متصل می‌شود، با اضافه کردن سرم و یا پلاسما بیمار، صورت وجود آنتی‌بادی علیه این کمپلکس در نمونه بیمار، با افزودن آنتی‌بادی ثانویه نشاندار شده، می‌توان این اتصال را شناسایی کرد. نتیجه آزمایش ELISA به صورت شدت نوری (OD) گزارش می‌شود که متناسب با مقدار آنتی‌بادی‌های موجود در نمونه بیمار بوده و مقدار بالای OD (شدت جذب نوری بالاتر از ۱) معمولاً در ارتباط با احتمال خطر بالاتری برای HIT و بروز ترومبوز در این بیماران می‌باشد (۳۸، ۳۹).

۲- آزمایش‌های عملکردی:

گروه دوم از آزمایش‌های تشخیصی HIT جهت شناسایی گروهی از آنتی‌بادی‌های علیه کمپلکس Heparin-PF4 بوده که توانایی فعال‌سازی پلاکت‌ها را داشته و لذا به عنوان آنتی‌بادی‌های پاتولوژیک شناخته می‌شوند. در این گروه از آزمایش‌ها، سرم بیمار با پلاکت‌های اهداکنندگان سالم در حضور هپارین (LMWH و UFH) مجاور و انکوبه می‌شود. نتیجه نهایی فعال شدن پلاکتی در این آزمایش‌ها بسته به نوع آزمایش توسط پارامترهای مختلفی مانند بررسی آزادسازی مواد رادیواکتیو، تجمع پلاکتی و یا فلوسیتومتری ارزیابی شده و به تفصیل در ادامه بحث به نحوه انجام هر کدام از این روش‌ها پرداخته می‌شود.

۲-۱- SRA (Serotonin releasing assay):

این روش در گروه آزمایش‌های عملکردی به عنوان آزمایش استاندارد طلایی بوده و در آن فعال شدن پلاکت‌ها

استفاده نمود (۴۲).

آزمایش‌های ایمنی سریع (Rapid immunoassays):

امروزه دسته‌ای از آزمایش‌های ایمونولوژیک طراحی شده‌اند که امکان غربالگری اولیه بیماران HIT را به شکل سریع (کمتر از ۳۰ دقیقه) به پزشکان می‌دهد. این آزمایش‌ها آنتی‌بادی علیه کمپلکس Heparin-PF4 را شناسایی می‌کنند اما از نظر اساس تست و نوع کلاس آنتی‌بادی که شناسایی می‌کنند با یکدیگر تفاوت دارند (۱۷). نتیجه منفی این آزمایش‌ها به دلیل npv FHGH t در بیماران با امتیاز بالینی پایین و متوسط با ارزش بوده در حالی که در بیماران با احتمال بالینی قوی، باید با احتیاط بیشتری عمل نمود. از مشکلات دیگر این آزمایش‌ها می‌توان به عدم اشاره دقیق به جایگاه این آزمایش‌ها در الگوریتم تشخیصی فعلی برای تفسیر نتایج آزمایش‌ها اشاره نمود (۴۳). از جمله این آزمایش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- Particle-based immunoassays (PaGIA):

روش‌های «بررسی ایمنی بر پایه ذرات» به شناسایی آنتی‌بادی‌هایی می‌پردازند که علیه کمپلکس Heparin-PF4 ساخته شده و منجر به آگلوتیناسیون ذرات حاوی PF4 و یا Heparin-PF4 می‌گردند. یکی از این روش‌ها Particle gel immunoassay (PaGIA) می‌باشد. این روش از کمپلکس‌های PF4/heparin متصل شده به دانه‌های پلی‌استرن قرمز با تراکم بالا استفاده می‌کند که بعد از اضافه کردن سرم یا پلاسما بیمار، آنتی‌بادی علیه کمپلکس Heparin-PF4 به دانه‌های پلی‌استرن متصل شده که با سانتریفیوژ کردن، دانه‌های آگلوتینه شده (بیانگر حضور آنتی‌بادی علیه کمپلکس Heparin-PF4) در طول ژل سفارکریل مهاجرت نکرده در حالی که دانه‌های آگلوتینه نشده (بیانگر فقدان حضور آنتی‌بادی‌ها) در طول ژل مهاجرت می‌نمایند. نتایج آزمایش سپس به صورت چشمی بررسی می‌گردد. برخلاف ELISA، «روش‌های بررسی بر پایه ذرات» تقریباً غیر کمی بوده و بین زیر گروه‌های مختلف آنتی‌بادی‌ها تمایز قائل نمی‌شوند بنابراین اختصاصیت و PPV پائینی دارند. مهم‌ترین مزیت

اختصاصیت تمامی روش‌های عملکردی را می‌توان با استفاده از مهار فعال‌سازی پلاکت‌ها با هپارین در غلظت بالا و با انسداد FCYRIIA با استفاده از آنتی‌بادی‌های مونوکلونال افزایش داد.

اگر چه هر دو این روش‌های عملکردی به عنوان روش‌های تأییدی برای تشخیص HIT در نظر گرفته می‌شوند اما دارای معایب و محدودیت‌هایی نیز می‌باشند از جمله: این آزمایش‌ها وقت‌گیر بوده و در زمانی که نیاز به تصمیم‌گیری سریع برای بیمار می‌باشد، نتایج این آزمایش‌ها در دسترس نبوده و هم‌چنین این روش‌ها نیازمند تکنسین بسیار ماهر آزمایشگاهی و پلاکت‌های اهداکنندگان سالم می‌باشد. هم‌چنین روش SRA نیازمند استفاده از مواد رادیواکتیو بوده که بسیاری از آزمایشگاه‌ها برای رعایت مسائل ایمنی از این روش اجتناب می‌کنند (۴۰).

۲-۳- فلوسیتومتری:

در ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین، آنتی‌بادی‌های HIT می‌توانند منجر به تولید میکروپارتیکل‌های پلاکتی (PMP) شده که می‌توان آن‌ها را با روش فلوسیتومتری جهت تشخیص کمی‌سازی نمود. برای این منظور از مواد فلوروسنت متصل به آنتی‌بادی‌های مونوکلونالی مانند anti-CD41 یا anti-GPIIb/IIIa استفاده کرد. هم‌چنین می‌توان از آنکسین V (Anexin V) نیز برای اتصال به فسفولیپیدهای آنیونیک به عنوان مارکر فعال‌سازی پلاکت استفاده نمود. میکرو پارتیکل‌های پلاکتی از روی اندازه و پارامترهای پراکندگی قابل افتراق از پلاکت‌ها می‌باشند (۴۱، ۳۷).

کنترل کیفی در آزمایش‌های عملکردی:

در تمامی روش‌های عملکردی که از پلاکت‌های اهداکنندگان سالم استفاده می‌شود، لازم است اهداکنندگان حداقل طی دو هفته قبل از اهدای پلاکت هیچ‌گونه دارو یا ماده غذایی که بر روی عملکرد پلاکت تأثیرگذار است را مصرف نکرده باشند. هم‌چنین جهت کنترل کیفی روش‌های عملکردی می‌توان از سرم یا پلاسما بیماران HIT که قبلاً تشخیص قطعی داده شدند به عنوان کنترل مثبت و از سرم یا پلاسما افراد سالم فاقد HIT به عنوان کنترل منفی

اتوماتیک آزمایشگاهی در دسترس می‌باشند که تاکنون سه روش معرفی شده‌اند: روش HemoIL- HIT-Ab (PF4-H) که بر پایه آگلوتیناسیون ذرات لاتکس می‌باشد و روش‌های HemoIL Acustar HIT-IgG و HemoIL Acustar HIT-Ab (IgG, A, M) بر پایه شناسایی کمی لومینسانس می‌باشند. در روش بررسی آگلوتیناسیون بر پایه ذرات لاتکس، آگلوتیناسیون ذرات کووت شده با sulfonate PF4/polyvinyl anti-PF4/heparin توسط آنتی‌بادی مونوکلونال، antibody anti-PF4/heparin در حضور anti-PF4/heparin antibodies انسانی مهار شده، این روش قادر به افتراق بین زیر کلاس‌های مختلف آنتی‌بادی (IgG, IgM یا IgA) نمی‌باشد. روش بررسی کمی لومینسانس بر پایه اتصال anti-PF4/heparin antibodies به PF4/polyvinyl sulfonate می‌باشد. این روش‌ها می‌تواند بر روی سرم یا پلاسمای بیمار انجام شده و قادر به افتراق زیر کلاس‌های مختلف آنتی‌بادی هستند. اخیراً مطالعه‌ها نشان داده‌اند نتایج مثبت این آزمایش‌ها با احتمال بیش از ۸۵٪ بیانگر این است که نمونه، حاوی آنتی‌بادی‌های فعال‌کننده پلاکت‌ها می‌باشد (۴۷، ۴۵).

الگوریتم تشخیصی:

در صورتی که تشخیص ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین تنها بر پایه یافته‌های بالینی و یا آزمایشگاهی باشد، می‌تواند منجر به عدم تشخیص و یا تشخیص بیش از اندازه HIT گردد چرا که هیچ کدام از روش‌های ارزیابی بالینی و آزمایشگاهی دارای حساسیت و اختصاصیت ۱۰۰٪ نمی‌باشند. از طرفی ممکن است بعضی از بیماران با امتیاز بالینی پایین دارای HIT بوده در حالی که بعضی دیگر از بیماران با امتیاز بالینی بالا HIT نداشته باشند. به همین دلیل تشخیص صحیح HIT نخست بر پایه علائم بالینی بیمار بوده و در صورت وجود علائم بالینی در گام بعدی، تست‌های آزمایشگاهی درخواست می‌شود. این استراتژی برای تشخیص بیماران را می‌توان در غالب یک الگوریتم نمایش داد (شکل ۲) (۴۸، ۸). در مطالعه‌ای که توسط فارم و همکارانش در سال ۲۰۱۷ جهت ارزیابی حساسیت و

روش‌های بررسی بر پایه ذرات، سریع بودن زمان انجام آزمایش‌ها (۱۵ دقیقه) می‌باشد (۴۴).

۲- *lateral flow immunoassay (LFI-HIT):*

جهت تشخیص آنتی‌بادی علیه کمپلکس Heparin-PF4 که زیر گروه IgG می‌باشد به کار می‌رود و نتیجه آزمایش به شکل کیفی (مثبت یا منفی) گزارش می‌شود. اصول آزمایش بر پایه تشخیص اتصال آنتی‌بادی در سرم بیمار (در صورت وجود) با کمپلکس PF4/Polyanion نشاندار شده با لیگاند بوده که این مجموعه به نانوپارتیکل‌های طلا که یک آنتی‌بادی ضد لیگاند را حمل می‌نمایند متصل خواهد شد و نهایتاً در مسیر مویرگی حرکت نمونه و بافر توسط آنتی‌بادی ضد IgG انسانی بی‌حرکت شده و قابل شناسایی می‌گردند. هر استریپ تست برای بررسی نمونه یک بیمار طراحی شده و در مدت ۱۵ دقیقه بدون نیاز به تجهیزات خاص آزمایشگاهی قابل انجام می‌باشد. این آزمایش دارای NPV بالایی بوده و نتیجه منفی با احتمال بالا تشخیص HIT را رد می‌کند (۴۵). با این وجود در مطالعه‌ای که توسط لروکس و همکارانش انجام شد، مشاهده گردید این آزمایش دارای PPV مطلوبی نبوده و باید تنها به عنوان یک آزمایش غربالگری استفاده شود و در مواردی که نتیجه این آزمایش مثبت است باید آزمایش ELISA جهت تایید نتیجه حاصله انجام شود (۴۶).

۳- *Health TEST Heparin/Platelet factor 4 Antibody Assay Q*

این روش از سیستمی به نام Particle Immuno-Filtration استفاده می‌کند. در این روش سرم بیمار به چاهک‌های واکنشی حاوی ذرات رنگی کووت شده با PF4 (و نه arin-PF4) اضافه می‌شود و در نهایت ذرات آگلوتینه نشده در طول فیلتر غشایی مهاجرت می‌کنند. از این رو آزمایش منفی را با رنگ آبی در چاهک، و نبود رنگ را به عنوان نتیجه مثبت در نظر می‌گیرند (۴۷).

۴- روش‌های دستگاهی:

تعدادی از روش‌های بررسی ایمنی برای دستگاه‌های

جدول ۱: مزایا و معایب روش‌های تشخیصی HIT (۴۵)

نوع/آزمایش	اساس آزمایش	مثال	مزایا	معایب
ایمونولوژیک	شناسایی آنتی‌بادی‌های در گردش علیه کمپلکس هپارین - PF4 بدون توجه به توانایی آن‌ها در فعال‌سازی پلاکت‌ها	Poly specific ELISA IgG-specific ELISA	حساسیت بالا، راحت بودن جهت انجام، در دسترس بودن	اختصاصیت پایین
عملکردی	شناسایی آنتی‌بادی‌های در گردش علیه کمپلکس هپارین - PF4 با توجه به توانایی آن‌ها در فعال‌سازی پلاکت‌ها	SRA HIPA	حساسیت بالا اختصاصیت بالا	از نظر تکنیکی انجام این آزمایش‌ها مشکل بوده محدودیت در دسترسی دارد

اختصاصیت الگوریتم تشخیصی برای HIT انجام شد، حساسیت و اختصاصیت این الگوریتم را ۹۴٪ گزارش نمودند (۴۹).

دارو درمانی:

بیمارانی که ظن بالینی متوسط یا بالایی به HIT دارند، باید تمام مسیرهای تزریق هپارین در آن‌ها قطع شده و ضد انعقاد‌های جایگزین به ویژه مهارکننده‌های مستقیم ترومبین (DTI: Direct Thrombin Inhibitor) برای آن‌ها شروع شود. هم‌چنین در بیمارانی که مشکوک به HIT هستند نباید LMWH با UFH جایگزین گردد زیرا هر چند LMWH با احتمال کمتری منجر به HIT می‌شود اما می‌تواند با آنتی‌بادی‌های HIT واکنش متقاطع داده و منجر به بدتر شدن شرایط این سندروم شود.

مناسب‌ترین ضد انعقاد برای استفاده در بیماران HIT دقیقاً مشخص نیست. داروهایی که در این زمینه استفاده می‌شوند باید دارای ویژگی‌هایی از جمله: سریع‌الاثربودن، توانایی مختل کردن آبشار انعقادی فعال شده در سطح ترومبین و یا فاکتور Xa، خطر خونریزی پایین، عدم نیاز به مانیتورینگ و یا مانیتورینگ راحت و شاید مهم‌ترین عامل، آشنایی پزشک با نحوه استفاده از این داروها باشد.

مهارکننده‌های مستقیم ترومبین داخل رگی (Parenteral Direct Thrombin Inhibitors):


این دسته از داروها به گستردگی برای مدیریت

HIT استفاده می‌شوند. Argatroban توسط FDA برای درمان HIT تایید شده است و bivalirudin در ایالت متحده برای تداخلات کرونری زیر پوستی در بیمارانی که HIT دارند و یا در خطر HIT هستند استفاده می‌شود. Desirudin برای HIT تایید نشده است اما برای جلوگیری از ترومبوز ورید عمقی بعد از جراحی شکستگی لگن استفاده می‌شود. Lepirudin برای استفاده در HIT تایید شده است اما تولید آن به دلیل مسائل تجاری در اروپا در سال ۲۰۱۱ و در آمریکای شمالی در سال ۲۰۱۲ متوقف شده است. مهارکننده‌های مستقیم ترومبین باعث افزایش وابسته به دوز aPTT می‌شوند که امکان مانیتورینگ راحت را می‌دهد (۵۱، ۵۰).

تغییر به آنتاگونیست‌های ویتامین K:

HIT به عنوان یک فاکتور خطر برای ترومبوآمبولیسم‌های بعدی در نظر گرفته می‌شود. از آن جا که این خطر برگشت‌پذیر و گذرا بوده از این رو پیشنهاد می‌شود ضد انعقاد درمانی برای ۴ تا ۶ هفته در بیماران با HIT ایزوله و ۳ ماه در بیماران با ترومبوزادامه یابد. از شروع درمان سریع با آنتاگونیست‌های ویتامین K (مثل وارفارین) باید اجتناب شود چرا که توانایی بالاقوه برای بدتر کردن شرایط پروترومبوتیک از طریق کاهش سریع پروتئین C که یک ضد انعقاد طبیعی است را دارا می‌باشد.

به محض این که شمارش پلاکت در فاز حاد HIT به



شکل ۲: الگوریتم تشخیصی ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین (۴۸)

قرار می‌گرفتند و به منظور کاهش خطر بروز رخدادهای ترومبوتیک استفاده شد. اگر چه هنوز بهترین زمان استفاده از تعویض پلازما تعیین نشده است، با این وجود در مواردی که دسترسی به گزینه‌های درمانی وجود نداشته و یا مقاومت به مهارکننده‌های مستقیم ترومبین وجود دارد و هم‌چنین در زمان بروز عوارضی مانند خونریزی ناشی از مصرف این داروها می‌توان از این روش بهره گرفت (۵۲).

نتیجه‌گیری

بررسی مقالات منتشر شده در چند سال اخیر نشان می‌دهد ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین، هم‌چنان یک عارضه جانبی خطرناک ناشی از درمان با هپارین بوده و نیازمند تشخیص صحیح و به موقع می‌باشد. از آن‌جا که این عارضه یک رخداد بالینی-آزمایشگاهی است، در این مطالعه در مرحله اول توجه دقیق به علائم بالینی بیماران با استفاده از سیستم‌های ارزیابی بالینی شرح داده شد و سپس انجام تست‌های آزمایشگاهی مناسب (آزمایش‌های ایمونولوژیک و سپس در صورت لزوم انجام آزمایش‌های عملکردی) برای جلوگیری از تشخیص بیش از حد و یا عدم تشخیص HIT که از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد، توضیح داده شد. با توجه به جمعیت ۸۰ میلیونی کشور ایران و میزان شیوع ۱ تا ۵ درصدی این بیماری بالاقوه خطرناک در میان جمعیت‌های مختلف بیماران دریافت‌کننده داروی هپارین و هم‌چنین عدم ارائه پلن کامل تشخیص آزمایشگاهی این بیماری در کشور ایران، راه‌اندازی یک آزمایشگاه مرجع ارائه‌دهنده آزمایش‌های آزمایشگاهی (ایمونولوژیک و عملکردی) ضروری به نظر می‌رسد.

سطح طبیعی برگشت، وارفارین باید به آهستگی در دوز ۵ میلی‌گرم یا کمتر، روزانه و به تدریج تجویز شود تا به INR ۲ تا ۳ برسد. استفاده هم‌زمان از مهارکننده‌های مستقیم ترومبین و آنتاگونیست‌های ویتامین K به ویژه آرگاتروبان که باعث افزایش در INR می‌شود، می‌تواند چالش برانگیز باشد (۵۱، ۵۰).

تزریقی پلاکت:

برخلاف وجود ترومبوسیتوپنی شدید در HIT، خونریزی خود به خودی در این بیماران شایع نمی‌باشد. با این وجود بیماران HIT نیازمند روش‌های تهاجمی، ممکن است به صورت پروفیلاکسی جهت کاهش خطر خونریزی نیازمند تزریق پلاکت باشند. گزارش‌های متعددی در مورد تزریق پلاکت به بیماران HIT وجود دارد که این تزریق را به اضافه کردن سوخت بر روی آتش که منجر به تشدید ترومبوز می‌گردد، تشبیه نموده‌اند. با این وجود هنوز شواهد حمایت‌کننده مستقیمی در مورد افزایش خطر ترومبوز در بیماران با HIT که تحت تزریق پلاکت قرار گرفته‌اند وجود ندارد اما از طرف دیگر شواهد برای حمایت از تزریق پلاکت در این گروه از بیماران بسیار محدود می‌باشد (۵۲، ۱۱).

تعویض پلازما:

تا قبل از استفاده از مهارکننده‌های مستقیم ترومبین، از تعویض پلازما برای درمان HIT حاد استفاده می‌شد اما بعد از ظهور این داروها، این روش تنها در زمان‌های کوتاهی برای کاهش میزان تیترا آنتی‌بادی علیه کمپلکس Heparin-PF4، در بیمارانی که در معرض دوباره هپارین

References:

- 1- Franchini M. Heparin-induced thrombocytopenia: an update. *Thromb J* 2005; 3(1): 14.
- 2- Arepally GM. Heparin-induced thrombocytopenia. *Blood* 2017; 129(21): 2864-72.
- 3- Shaikh N. Heparin Induced Thrombocytopenia: Can Be Excluded. *J Blood Disord Transfus* 2011: S2.
- 4- Lo GK, Sigouin CS, Warkentin TE. What is the potential for overdiagnosis of heparin-induced thrombocytopenia? *Am J Hematol* 2007; 82(12): 1037-43.
- 5- Levy JH, Hursting MJ. Heparin-induced thrombocytopenia, a prothrombotic disease. *Hematol Oncol Clin North Am* 2007; 21(1): 65-88.
- 6- Dhakal B, Kreuziger LB, Rein L, Kleman A, Fraser R, Aster RH, et al. Disease burden, complication rates, and health-care costs of heparin-induced

- thrombocytopenia in the USA: a population-based study. *Lancet Haematol* 2018; 5(5): e220-e31.
- 7- Kelton JG, Warkentin TE. Heparin-induced thrombocytopenia: a historical perspective. *Blood* 2008; 112(7): 2607-16.
 - 8- Greinacher A. Heparin-induced thrombocytopenia. *N Engl J Med* 2015; 373(3): 252-61.
 - 9- Warkentin TE, Basciano PA, Knopman J, Bernstein RA. Spontaneous heparin-induced thrombocytopenia syndrome: two new cases and a proposal for defining this disorder. *Blood* 2014; 123(23): 3651-4.
 - 10- Warkentin TE, Greinacher A. Heparin-induced thrombocytopenia and cardiac surgery. *Ann Thorac Surg* 2003; 76(2): 638-48.
 - 11- Levy JH, Winkler AM. Heparin-induced thrombocytopenia and cardiac surgery. *Curr Opin Anaesthesiol* 2010; 23(1): 74-9.
 - 12- Lindhoff-Last E, Gerdson F, Ackermann H, Bauersachs R. Determination of heparin-platelet factor 4-IgG antibodies improves diagnosis of heparin-induced thrombocytopenia. *Br J Haematol* 2001; 113(4): 886-90.
 - 13- Warkentin TE. Platelet count monitoring and laboratory testing for heparin-induced thrombocytopenia: recommendations of the College of American Pathologists. *Arch Pathol Lab Med* 2002; 126(11): 1415-23.
 - 14- Junqueira DR, Zorzela LM, Perini E. Unfractionated heparin versus low molecular weight heparins for avoiding heparin-induced thrombocytopenia in postoperative patients. *Cochrane Database Syst Rev* 2017; 4: CD007557.
 - 15- Krzych Ł, Nowacka E, Knapik P. Heparin-induced thrombocytopenia. *Anaesthesiol Intensive Ther* 2015; 47(1): 63-76.
 - 16- Salter BS, Weiner MM, Trinh MA, Heller J, Evans AS, Adams DH, *et al.* Heparin-induced thrombocytopenia: a comprehensive clinical review. *J Am Coll Cardiol* 2016; 67(21): 2519-32.
 - 17- Fathi M. Heparin-induced thrombocytopenia (HIT): Identification and treatment pathways. *Glob Cardiol Sci Pract* 2018; 2018(2): 15.
 - 18- Onwuemene O, Arepally GM. Heparin-induced thrombocytopenia: research and clinical updates. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program* 2016; 2016(1): 262-8.
 - 19- Aster RH. Heparin-induced thrombocytopenia and thrombosis. *N Engl J Med* 1995; 332(20): 1374-6.
 - 20- Ahmadinejad M, Shahbazi M, Chegini A, Shamriz R, Ahmadinejad Z. Prevalence of Heparin Induced Thrombocytopenia Among Iranian Patients with Cardiac Surgery. *Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis* 2011; 1: 1366-7.
 - 21- Lee GM, Arepally GM. Diagnosis and management of heparin-induced thrombocytopenia. *Hematol Oncol Clin North Am* 2013; 27(3): 541-63.
 - 22- Warkentin T. Heparin-induced thrombocytopenia. *Curr Opin Crit Care* 2015 Dec; 21(6): 576-85.
 - 23- Samhouri Y, Telfah M, Kouides R, Woodlock T. Utilization of 4T score to determine the pretest probability of heparin-induced thrombocytopenia in a community hospital in upstate New York. *J Community Hosp Intern Med Perspect* 2016; 6(4): 32522.
 - 24- Farley S, Cummings C, Heuser W, Wang S, Calixte R, Hanna A, *et al.* Prevalence and overtesting of true heparin-induced thrombocytopenia in a 591-bed tertiary care, teaching hospital. *J Intensive Care Med* 2019; 34(6): 464-71.
 - 25- Shahbazi M, Ahmadinejad M, Chegini A. Evaluation of 4T score for possible heparin induced thrombocytopenia diagnosis. *Sci J Iran Blood Transfus Organ* 2017; 14(4): 272-80. [Article in Farsi]
 - 26- Favalaro EJ, McCaughan G, Mohammed S, Lau KKE, Gemmell R, Cavanaugh L, *et al.* HIT or miss? A comprehensive contemporary investigation of laboratory tests for heparin induced thrombocytopenia. *Pathology* 2018; 50(4): 426-36.
 - 27- Lo G, Juhl D, Warkentin T, Sigouin C, Eichler P, Greinacher A. Evaluation of pretest clinical score (4 T's) for the diagnosis of heparin-induced thrombocytopenia in two clinical settings. *J Thromb Haemost* 2006; 4(4): 759-65.
 - 28- Cuker A, Gimotty PA, Crowther MA, Warkentin TE. Predictive value of the 4Ts scoring system for heparin-induced thrombocytopenia: a systematic review and meta-analysis. *Blood* 2012; 120(20): 4160-7.
 - 29- Piednoir P, Allou N, Provenchère S, Berroeta C, Huisse MG, Philip I, *et al.* Heparin-induced thrombocytopenia after cardiac surgery: an observational study of 1,722 patients. *J Cardiothorac Vasc Anesth* 2012; 26(4): 585-90.
 - 30- Motie M, Kazemzadeh G, Gazeran S. Comparing the incidence of heparin-induced thrombocytopenia (HIT) in patients receiving heparin (UHF) and enoxaparin (LMWH). *Biomedical Research* 2017; 28(5): 2002-7.
 - 31- Beigmohammadi M, Hussain Khan Z, Hossein K. Enoxaparin in Suspected Heparin Induce Thrombocytopenia: An Observational Follow-Up in Critically Ill Patients. *Biomed J Sci & TecRes* 2018; 3(3): 1-5.
 - 32- Cuker A, Arepally G, Crowther M, Rice L, Datko F, Hook K, *et al.* The HIT Expert Probability (HEP) Score: a novel pre-test probability model for heparin-induced thrombocytopenia based on broad expert opinion. *J Thromb Haemost* 2010; 8(12): 2642-50.
 - 33- Pishko AM, Fardin S, Lefler DS, Paydary K, Vega R, Arepally GM, *et al.* Prospective comparison of HEP score and 4Ts score for the diagnosis of heparin induced thrombocytopenia. *Blood Adv* 2018; 2(22): 3155-62.
 - 34- Demma LJ, Winkler AM, Levy JH. A diagnosis of heparin-induced thrombocytopenia with combined clinical and laboratory methods in cardiothoracic surgical intensive care unit patients. *Anesth Analg* 2011; 113(4): 697-702.
 - 35- Otis SA, Zehnder JL. Heparin-induced thrombocytopenia: current status and diagnostic challenges. *Am J Hematol* 2010; 85(9): 700-6.
 - 36- Nagler M, Bakchoul T. Clinical and laboratory tests for the diagnosis of heparin-induced thrombocytopenia. *Thromb Haemost* 2016; 116(5): 823-34.
 - 37- Favalaro EJ, McCaughan G, Pasalic L. Clinical and laboratory diagnosis of heparin induced

- thrombocytopenia: an update. *Pathology* 2017; 49(4): 346-55.
- 38- Warkentin TE, Sheppard JA. Testing for heparin-induced thrombocytopenia antibodies. *Transfus Med Rev* 2006; 20(4): 259-72.
- 39- Warkentin TE, Arnold DM, Nazi I, Kelton JG. The platelet serotonin-release assay. *Am J Hematol* 2015; 90(6): 564-72.
- 40- Minet V, Dogné JM, Mullier F. Functional Assays in the Diagnosis of Heparin-Induced Thrombocytopenia: A Review. *Molecules* 2017; 22(4): E617.
- 41- Lee DH, Warkentin TE, Denomme GA, Hayward CP, Kelton JG. A diagnostic test for heparin-induced thrombocytopenia: detection of platelet microparticles using flow cytometry. *Br J Haematol* 1996; 95(4): 724-31.
- 42- Scharf RE. Drug that affect platelet function. *Semin Thromb Hemost* 2012; 38(8): 865-83.
- 43- Ahmadinejad M. MD. "Is it Time to Renew the Guidelines for Diagnosis of HIT?". *EC Cardiology* 2018; 5: 371-3.
- 44- Sun L, Gimotty PA, Lakshmanan S, Cuker A. Diagnostic accuracy of rapid immunoassays for heparin-induced thrombocytopenia. A systematic review and meta-analysis. *Thromb Haemost* 2016; 115(5): 1044-55.
- 45- Cuker A. Clinical and laboratory diagnosis of heparin-induced thrombocytopenia: an integrated approach. *Semin Thromb Hemost* 2014; 40(1): 106-14.
- 46- Leroux D, Hezard N, Lebreton A, Bauters A, Suchon P, de Maistre E, *et al.* Prospective evaluation of a rapid nanoparticle-based lateral flow immunoassay (STic Expert®) HIT for the diagnosis of heparin-induced thrombocytopenia. *Br J Haematol* 2014; 166(5): 774-82.
- 47- Bakchoul T, Zöllner H, Greinacher A. Current insights into the laboratory diagnosis of HIT. *Int J Lab Hematol* 2014; 36(3): 296-305.
- 48- Cuker A, Cines DB. How I treat heparin-induced thrombocytopenia. *Blood* 2012; 119(10): 2209-18.
- 49- Farm M, Bakchoul T, Frisk T, Althaus K, Odenrick A, Norberg EM, *et al.* Evaluation of a diagnostic algorithm for Heparin-Induced Thrombocytopenia. *Thromb Res* 2017; 152: 77-81.
- 50- McKenzie SE, Sachais BS. Advances in the pathophysiology and treatment of heparin-induced thrombocytopenia. *Curr Opin Hematol* 2014; 21(5): 380-7.
- 51- Howard-Thompson A, Usery JB, Lobo BL, Finch CK. Heparin-induced thrombocytopenia complicated by warfarin-induced skin necrosis. *Am J Health Syst Pharm* 2008; 65(12): 1144-7.
- 52- Kelton JG, Arnold DM, Bates SM. Nonheparin Anticoagulants for Heparin-Induced Thrombocytopenia. *N Engl J Med* 2013; 368: 737-44.

Review Article

Heparin induced thrombocytopenia

Shahbazi M.¹, Ahmadinejad M.²

¹Blood Transfusion Research Center, High Institute for Research and Education in Transfusion Medicine, Tehran, Iran

Abstract

Background and Objectives

Heparin is still a commonly used anticoagulant in prophylaxis and treatment of thromboembolic events. Heparin-induced thrombocytopenia (HIT) is a life-threatening adverse drug reaction of heparin. The diagnosis of HIT is made based on two important criteria, firstly clinical evaluation and secondly laboratory testing. In this comprehensive review, the authors will emphasize the risk factors, clinical presentation, pathophysiology, diagnostic principals and treatment of HIT.

Materials and Methods

Our study method was based on the search in the PubMed Database by related key words like: "heparin", "heparin induced thrombocytopenia", "pathophysiology", "diagnosis" and "treatment" published during 1997 to 2018.

Results

The disease is still a life-threatening event caused by the creation of an antibody against the heparin-PF4 complex and, if platelets are activated, can lead to thrombotic events in patients. Laboratory diagnostic methods are important in excluding or confirming the diagnosis of HIT, especially in patients who are moderate or highly clinical probability of HIT suspected.

Conclusions

Today, with a better understanding of the pathophysiology of the disease as well as the advances made in the speed and precision of laboratory diagnostic methods, an important development has occurred in the diagnosis of HIT.

Key words: Heparin, Thrombocytopenia, Diagnosis

Received: 1 Jan 2019

Accepted: 12 May 2019

Correspondence: Ahmadinejad M., MD, Pathologist. Assistant Professor of Blood Transfusion Research Center, High Institute for Research and Education in Transfusion Medicine.
P.O.Box: 14665-1157, Tehran, Iran. Tel: (+9821) 88601599; Fax : (+9821) 88601599
E-mail: minoam@gmail.com