

شیوع و نوع آلوآنتی‌بادی‌های گلوبول قرمز در بیماران نیازمند به خون مراجعه‌کننده به بیمارستان نمازی شیراز در سال ۱۳۸۹

الهام قربانی علی‌آبادی^۱، علیرضا توسلی^۲، احمد قره‌باغیان^۳، لیلا کسریان^۴، ریحانه خادمی^۵، ابوالفضل طالعی^۶

چکیده

سابقه و هدف

آلویمونیزاسیون در بیماران با سابقه تزریق خون مزمن، شایع است (حدود ۶۰٪). این مشکل در بیمارانی که به صورت مزمن خون دریافت نمی‌کنند، کمتر و حدود ۲٪-۱٪ است. آلویمونیزاسیون، عامل چندین مشکل از تاخیر در فراهم نمودن خون سازگار تا واکنش‌های همولیزی تاخیری پس از تزریق خون می‌باشد. هدف این مطالعه، بررسی شیوع و نوع آلوآنتی‌بادی‌های گلوبول‌های قرمز در بیماران نیازمند خون بیمارستان نمازی شیراز بود.

مواد و روش‌ها

در یک مطالعه مقطعی گذشته‌نگر، شیوع آلوآنتی‌بادی ۳۴۸۷ بیمار بدون سابقه تزریق مزمن خون، با آزمایش غربالگری آنتی‌بادی و شناسایی نوع آنتی‌بادی با آزمایش پانل سل، بررسی گردید. برای بیماران دارای آلوآنتی‌بادی، اطلاعاتی نظیر سن، جنس، سابقه تزریق خون و جراحی جمع‌آوری و نتایج با استفاده از نرم‌افزار SPSS ۱۵ و آزمون کای‌دو، با اطمینان ۹۵٪ پردازش و تحلیل شدند.

یافته‌ها

از ۳۴۸۷ بیمار، ۲۸ نفر دارای آلوآنتی‌بادی بودند، بنابراین شیوع آلوآنتی‌بادی ۰/۸٪ برآورد گردید. شایع‌ترین آلوآنتی‌بادی‌های مهم بالینی به ترتیب: anti-K ۶ مورد (۲۳٪)، anti-E ۴ مورد (۱۵٪) و anti-C ۳ مورد (۱۱٪) بودند (شایع‌ترین آلوآنتی‌بادی مهم بالینی در مردان anti-K و در زنان anti-C بود).

نتیجه‌گیری

در این مطالعه شیوع آلوآنتی‌بادی به سن و جنس بیماران بستگی نداشت و در افراد با سابقه تزریق خون و عمل جراحی بیشتر بود. از عوامل مؤثر در شیوع بیشتر این آلوآنتی‌بادی‌ها، شیوع بالاتر آنتی‌ژن‌های مربوطه در جمعیت، قدرت آنتی‌ژنسته بالاتر و فقدان انجام آزمون سازگاری و تعیین گروه برای این آنتی‌ژن‌ها می‌باشد.

کلمات کلیدی: آنتی‌ژن‌ها و آنتی‌بادی‌های گلوبول قرمز، آزمایش‌های سرولوژیکی، تزریق خون

تاریخ دریافت: ۹۰/۹/۱۹

تاریخ پذیرش: ۹۱/۱۲/۱۳

- ۱- کارشناس ارشد هماتولوژی - مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پایگاه منطقه‌ای آموزشی انتقال خون فارس - شیراز - ایران
- ۲- متخصص آسیب‌شناسی - استادیار مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پایگاه منطقه‌ای آموزشی انتقال خون فارس - شیراز - ایران
- ۳- مؤلف مسؤول: PhD ایمونوهماٹولوژی بالینی - دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - مرکز تحقیقات بیماری‌های مادرزادی خونی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران - ایران - صندوق پستی: ۱۷۴۴۳-۱۹۸۵۷
- ۴- متخصص پزشکی اجتماعی - دانشیار مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پایگاه منطقه‌ای آموزشی انتقال خون فارس - شیراز - ایران
- ۵- دانشجوی PhD هماتولوژی - مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون - تهران - ایران
- ۶- کارشناس میکروب‌شناسی - مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پایگاه منطقه‌ای آموزشی انتقال خون فارس - شیراز - ایران

مقدمه

به غیر از Anti-A و Anti-B که به شکل طبیعی حضور دارند، آلوانتی‌بادی‌های گلبول‌های قرمز تحت عنوان آلوانتی‌بادی‌های غیر منتظره نامیده می‌شوند (۱). آلوانتی‌بادی‌ها فقط با گلبول‌های قرمز آلوژن (غیر خودی) واکنش می‌دهند. ممکن است ایمن‌سازی نسبت به آنتی‌ژن‌های گروه خونی روی گلبول‌های قرمز آلوژن متعاقب بارداری، تزریق خون و یا پیوند ایجاد شود (۲). آلوایمونیزاسیون، عامل چندین مشکل از تاخیر در فراهم نمودن خون سازگار تا واکنش‌های همولیزی تاخیری پس از انتقال خون می‌باشد (۳).

آلوایمونیزاسیون در بیمارانی که سابقه تزریق خون مزمن و مکرر دارند شایع است. اکثر مطالعه‌های بررسی آلوانتی‌بادی‌ها در مورد بیمارانی انجام گرفته است که به شکل مزمن و مکرر خون دریافت می‌کنند مانند هموگلوبینوپاتی‌ها، بدخیمی‌های خونی، گیرندگان پیوند عضو و بیماران نقص کلیوی و میزان بروز آلوایمونیزاسیون در این افراد تا حدود ۶۰٪ گزارش شده است (۴-۶). به علت افزایش طول عمر جمعیت، افزایش احتمال نیاز به جراحی و احتمال نیاز به خون بیش از یک بار، بررسی شیوع آلوانتی‌بادی‌ها در بیمارانی که به شکل مزمن خون دریافت نمی‌کنند، ضروری به نظر می‌رسد. در مطالعه‌های گذشته‌نگر، شیوع آلوانتی‌بادی در این دسته از بیماران حدود ۱٪-۲٪ برآورد شده است (۷).

تعیین میزان بروز و شیوع آلوانتی‌بادی‌های گروه‌های خونی، به وضعیت جغرافیایی جمعیت مورد مطالعه بستگی دارد. تعمیم نتایج یک مطالعه به مطالعه دیگر تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گرفته و شاخص‌هایی مانند نژاد، جنس و افراد جمعیت مورد مطالعه (بیمار، اهداکننده و ...) آن را مشکل می‌سازد. اکثر داده‌های توصیفی قبلی به جوامع غربی و یک مورد نیز به کویت منسوب می‌شود (۸). در کشور ما نیز فراوانی آنتی‌ژنی در افراد سالم تخمین زده شده است و اندازه‌گیری فراوانی آلوانتی‌بادی‌ها در بیمارانی مانند تالاسمی‌ها که به شکل مزمن و درمانی نیازمند خون بوده‌اند، متمرکز بوده است (۹). تنها یک تحقیق بر روی شیوع آلوانتی‌بادی‌ها در افراد بستری در بیمارستان کاندید

عمل جراحی در تهران که فاقد سابقه تزریق خون مزمن و مکرر بودند، انجام گرفته است (۱۰).

هدف از این مطالعه، بررسی شیوع و نوع آلوانتی‌بادی‌های گلبول‌های قرمز در بیماران نیازمند به خون (بدون سابقه تزریق مکرر خون) در بیمارستان نمازی شیراز بود. از طرف دیگر، به وسیله این مطالعه می‌توان روش غربالگری آنتی‌بادی که به شکل روتین انجام نمی‌شود را به کارکنان بیمارستان مذکور آموزش داد.

مواد و روش‌ها

در یک مطالعه مقطعی گذشته‌نگر، نمونه سرم ۳۴۸۷ بیمار بستری در بیمارستان نمازی شیراز که دارای شرایط لازم (وجود آزمون کراس‌مچ و عدم وجود سابقه تزریق مکرر خون) بودند، از لحاظ آلوانتی‌بادی‌ها مورد ارزیابی قرار گرفتند.

روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بود و با مراجعه به پرونده پزشکی بیماران و بانک خون بیمارستان، اطلاعات مورد نیاز اعم از سن، جنس، سوابق پزشکی و نوع آنتی‌بادی در مورد تمام بیماران دارای آلوانتی‌بادی جمع‌آوری گردید. بیماران به ۲ دسته دارای آلوانتی‌بادی و فاقد آلوانتی‌بادی تقسیم شدند.

آزمایش غربالگری آنتی‌بادی بر اساس روش استاندارد و با استفاده از سلول‌های معرف غربالگر Biotestcell-P3 ساخت کشور آلمان انجام گرفت (۱۱). ۲ حجم سرم بیمار با ۱ حجم سلول‌های معرف غربالگر در ۳ ویال به طور جداگانه و به شرح زیر آزمایش شدند: در حرارت اطاق محلول (Liss (Low Ionic Strength Solution) در حرارت ۳۷ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۵ دقیقه افزوده شد و سپس سلول‌ها ۳ بار در بافر فسفات سالین شستشو داده شدند و به آن‌ها آنتی‌گلوبولین اضافه شد. مشاهده همولیز یا آگلوتیناسیون به مفهوم واکنش مثبت بود.

برای بیمارانی که در آزمایش غربالگری آنتی‌بادی O cell نتیجه مثبت داشتند و یا به عبارتی دارای آنتی‌بادی در سرمشان بودند، توسط پانل ۱۱ گلوبولی Biotestcell-II1 ساخت کشور آلمان، نوع آنتی‌بادی شناسایی شد. روش انجام آزمون پانل سل بسیار مشابه آزمایش

سنی بیماران $23/7 + 45/4$ سال و سن افراد شرکت کننده ۹۱ - ۲ سال بود. میانگین سنی در گروه دارای آلوانتی بادی $43/6$ سال و در گروه فاقد آلوانتی بادی $45/4$ سال بود که ارتباطی بین سن و حضور آلوانتی بادی ها وجود نداشت. (۳۲۶۱ نفر) $93/5\%$ از بیماران مورد مطالعه بدون سابقه تزریق خون و (۲۲۶ نفر) $6/5\%$ نیز دارای سابقه تزریق خون بودند. به عبارت دیگر، (۱۶ نفر از ۲۸ نفر) 57% افراد دارای آلوانتی بادی، سابقه تزریق خون داشتند (اما نه به شکل مزمن که در بیماران مولتی ترانسفیوژن دیده می شود). شیوع آلوانتی بادی در افراد با سابقه تزریق خون بیشتر بود ($p < 0/05$). از مجموع افراد مورد مطالعه، (۳۲۳۷ نفر) 93% هیچ گونه سابقه ای از عمل جراحی نداشته و (۲۵۰ نفر) 7% سابقه عمل جراحی داشته اند. (۱۵ نفر از ۲۸ نفر) 53% افراد دارای آلوانتی بادی، سابقه عمل جراحی داشتند. شیوع آلوانتی بادی در افراد با سابقه عمل جراحی بیشتر بود ($p < 0/05$).

جدول ۱: شیوع و نوع آنتی بادی ها

آنتی ژن	مرد	زن	مجموع
K	۴ (۲۵)	۲ (۲۰)	۶ (۲۳)
E	۳ (۱۸/۷۵)	۱ (۱۰)	۴ (۱۵)
C	۰	۳ (۳۰)	۳ (۱۱)
Le ^a	۷ (۴۳/۷۵)	۰	۷ (۲۷)
Le ^b	۰	۲ (۲۰)	۲ (۸)
Lu ^a	۱ (۶/۲۵)	۱ (۱۰)	۲ (۸)
D	۰	۱ (۱۰)	۱ (۴)
Fy ^a	۱ (۶/۲۵)	۰	۱ (۴)
مجموع	۱۶ (۶۱/۵۴)	۱۰ (۳۸/۴۶)	۲۶ (۱۰۰)

در مجموع ۸ نوع آلوانتی بادی یافت شد که شامل موارد زیر می باشد: Le^a، K، E، C، Le^b، Lu^a، Fy^a، D. شایع ترین آلوانتی بادی های مهم بالینی anti-K ۶ مورد (۲۳٪)، anti-E ۴ مورد (۱۵٪)، anti-C ۳ مورد (۱۱٪) و شایع ترین آلوانتی بادی بدون اهمیت بالینی anti-Le^a ۷ مورد (۲۷٪) بود که فقط در مردان به دست آمد. در این مطالعه شایع ترین آلوانتی بادی های مهم بالینی در زنان anti-C ۳

غربالگری آنتی بادی است، با این تفاوت که تعداد سلول های پانل ۱۱ ویال شامل ۱۱ نوع سلول از گروه خونی O با آنتی ژن های مشخص بوده و ویال ۱۲ به عنوان اتوکنترل در نظر گرفته شد. ویال اتوکنترل، سرم یا پلاسما بیمار به علاوه گلبول های قرمز خود بیمار می باشد.

ترکیب آنتی ژن های پانل به گونه ای بود که بتوان آنتی بادی های مهم و حایز اهمیت بالینی که در ۳۷ درجه سانتی گراد و یا در فاز آنتی گلوبین در ۳۷ درجه سانتی گراد واکنش می دهند، را شناسایی کرد.

برای بیماران که آزمایش اتوکنترل مثبت داشتند، آزمایش آنتی گلوبولین مستقیم (DAT) گذاشته شد.

با مراجعه به پرونده پزشکی بیماران و بانک خون بیمارستان اطلاعاتی از قبیل سن، جنس، سابقه تزریق خون، سابقه جراحی و نوع آنتی بادی در مورد تمام بیماران دارای آلوانتی بادی جمع آوری گردید. نتایج حاصله با استفاده از نرم افزار SPSS ۱۵ و با اطمینان ۹۵٪ و آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته ها

از تعداد ۳۴۸۷ نفر بیمار در این مطالعه، ۲۸ نفر دارای آلوانتی بادی تشخیص داده شدند. بنابراین شیوع آلوانتی بادی در این مطالعه $0/8\%$ برآورد گردید. ۲۶ آلوانتی بادی در ۲۶ بیمار شناسایی شد. در ۲ بیمار با غربالگری آنتی بادی مثبت، نوع آلوانتی بادی مشخص نگردید که در یکی از آن ها کراس مچ ناسازگار هم چنین آزمایش های DAT و اتوکنترل مثبت شد، به همین دلیل احتمال وجود اتو آنتی بادی در وی مطرح گردید و در بیمار دوم که به دلیل کم بودن نمونه سرم و عدم دسترسی مجدد به وی نوع آنتی بادی مشخص نشد.

از ۳۴۸۷ بیمار شرکت کننده، ۲۱۸۹ نفر ($62/8\%$) مرد و ۱۲۹۸ نفر ($37/2\%$) زن بودند. از ۲۸ فرد دارای آلوانتی بادی، 57% مرد (۱۶ نفر از ۲۸ نفر) و 43% زن (۱۲ نفر از ۲۸ نفر) بودند. به عبارت دیگر از ۲۱۸۹ مرد شرکت کننده در مطالعه، ۱۶ نفر ($0/7\%$) از جمعیت مردان و از ۱۲۹۸ زن، ۱۲ نفر ($0/9\%$) از جمعیت زنان دارای آنتی بادی بودند. میانگین

بودند (۱۴). با اندازه‌گیری شیوع آلوانتی‌بادی‌ها در کویت که بر روی ۱۷۹۰۴۵ نمونه خون در سال‌های ۲۰۰۱-۱۹۹۲ انجام گرفت، میزان شیوع آلوانتی‌بادی‌ها ۰/۴۹٪ تعیین شد و فراوان‌ترین آن‌ها به ترتیب (۲۷/۳٪) anti-D، (۱۸/۵٪) anti-E و (۱۵/۶٪) anti-K بودند.

شیوع آلوانتی‌بادی در زنان کویتی بیشتر از مردان بود (۸). در مطالعه دیگری که به منظور بررسی شیوع و ویژگی آلوانتی‌بادی‌ها در تهران بین سال‌های ۸۸-۱۳۸۷ انجام گرفت، شیوع آلوانتی‌بادی‌ها ۰/۹۷٪ و شایع‌ترین آلوانتی‌بادی‌های مهم بالینی anti-K، anti-E و anti-C گزارش شدند (۱۰).

در مطالعه حاضر از ۲۸ فرد دارای آلوانتی‌بادی، ۵۷٪ مرد (۱۶ نفر از ۲۸ نفر) و ۴۳٪ زن (۱۲ نفر از ۲۸ نفر) بودند. به عبارت دیگر از ۲۱۸۹ مرد شرکت‌کننده در مطالعه، ۱۶ نفر (۰/۷٪ از جمعیت مردان) و از ۱۲۹۸ زن، ۱۲ نفر (۰/۹٪ از جمعیت زنان) دارای آنتی‌بادی بودند. شیوع آلوانتی‌بادی به جنس بستگی نداشت. که برخلاف مطالعه‌های انجام شده در مینه‌سوتا و کویت بود که در آن مطالعه‌ها، شیوع آلوانتی‌بادی در زنان بیشتر از مردان بود (۱۴، ۸).

اگر چه با افزایش سن، بیماران بیشتر تحت تاثیر عوامل محرک ایمنی برای تولید آلوانتی‌بادی‌ها قرار می‌گیرند، اما در مطالعه حاضر، مشابه مطالعه انجام شده در تهران، ارتباطی بین سن و حضور آلوانتی‌بادی‌ها وجود نداشت.

از آن جایی که ۱۶ نفر از ۲۸ نفر یا ۵۷٪ افراد دارای آلوانتی‌بادی سابقه تزریق خون داشتند، مشابه مطالعه‌های گذشته، در این مطالعه مشخص شد که سابقه تزریق خون از علل تاثیرگذار در تولید آلوانتی‌بادی است و بایستی آن را در سوابق بیمار به دقت بررسی نمود (۱۰). به نظر می‌رسد که سابقه تزریق خون عامل اصلی ایجادکننده آلوانتی‌بادی‌های گروه خونی مخصوصاً در مردان باشد.

از آن جایی که ۱۵ نفر از ۲۸ نفر یا ۵۳٪ افراد دارای آلوانتی‌بادی سابقه عمل جراحی داشتند، مشابه مطالعه‌های گذشته، در این مطالعه مشخص شد که سابقه عمل جراحی از علل تاثیرگذار در تولید آلوانتی‌بادی است و بایستی آن را در سوابق بیمار به دقت بررسی نمود (۱۰). سابقه عمل

مورد (۳۰٪) و شایع‌ترین آلوانتی‌بادی‌های مهم بالینی در مردان anti-K ۴ مورد (۲۵٪) بودند.

بحث

ناسازگاری گروه‌های خونی منجر به واکنش‌های همولیزی به واسطه مکانیسم‌های ایمنی می‌گردد. بنابراین به منظور اجتناب از چنین عوارضی، آزمایش‌های سازگاری قبل از تزریق خون انجام می‌شود (۴).

آزمایش‌های قبل از تزریق خون به منظور اطمینان از سازگاری ABO بین سرم بیمار و گلوبول‌های قرمز اهداکننده، هم چنین عدم حضور آلوانتی‌بادی‌های مهم بالینی می‌باشد (۱۲). آزمایش‌های قبل از تزریق خون عبارتند از: بررسی گروه خونی ABO و Rh، غربالگری آنتی‌بادی، تعیین نوع آنتی‌بادی غیر منتظره، انتخاب واحدهای RBC اهدایی مناسب و انجام آزمایش کراس‌مچ بر روی آن‌ها (۴).

در آزمایش غربالگری آنتی‌بادی در مقایسه با کراس‌مچ، سلول‌های انتخاب شده دقیق با فنوتیپ مشخص استفاده می‌شود که این سلول‌ها به طور مطلوب رقیق شده‌اند و در محلول نگهدارنده ذخیره می‌شوند. به لحاظ تکنیکی، کراس‌مچ برای غربالگری آنتی‌بادی که به درستی انجام بگیرد، جایگزین مناسبی نیست (۱۳).

در مطالعه گذشته‌نگر حاضر، فاکتورهای احتمالی که بر روی آلوایمیونیزه شدن تاثیر می‌گذارند مانند سن، جنس، سابقه تزریق خون و سابقه جراحی مورد بررسی قرار گرفتند.

در تحقیق حاضر که روی ۳۴۸۷ نمونه سرم انجام گرفت، در ۲۸ بیمار آزمایش غربالگری آنتی‌بادی مثبت گردید. در مجموع شیوع آلوانتی‌بادی‌ها در جمعیت مورد مطالعه حدود ۰/۸٪ بود که مشابه با سایر مطالعه‌های مرتبط می‌باشد. شایع‌ترین آلوانتی‌بادی‌های مهم بالینی در این مطالعه (۲۳٪) anti-K و در مرتبه بعدی (۱۵٪) anti-E و (۱۱٪) anti-C بودند. در مطالعه‌ای مربوط به سال‌های ۱۹۹۵-۱۹۷۵ که در منطقه مینه‌سوتا انجام شد، میزان شیوع آلوانتی‌بادی کمتر از ۱٪ بود و فراوان‌ترین آنتی‌بادی‌های گزارش شده anti-E، anti-Le^a و anti-K

خونی در دوره بارداری ضعیف شده و اغلب با بروز بالاتر آلوآنتی‌بادی مربوطه همراه می‌گردد (۱۰).

نتیجه‌گیری

مهم‌ترین عامل ایجاد آلوآنتی‌بادی در بیماران در این مطالعه، سابقه تزریق خون و عمل جراحی می‌باشد. بنابراین باید به عنوان سابقه مؤثر در تولید آلوآنتی‌بادی در تاریخچه پزشکی بیمار نیازمند تزریق خون در نظر گرفته شود.

حضور آلوآنتی‌بادی مهم بالینی در سرم بیمار و تجویز خون حاوی آنتی‌ژن واکنش‌دهنده با آن به صورت واکنش همولیتیک تاخیری بعد از تزریق خون ظاهر شده و عوارض عدیده‌ای را برای بیمار به وجود می‌آورد. آزمایش غربالگری آنتی‌بادی در صورت انجام دقیق و با استفاده از پانل‌های مطلوب و حساس می‌تواند جایگزین مطمئن و کم هزینه‌تری برای کراس‌مچ باشد، بدون این که بیمار گیرنده خون را در معرض خطر واکنش‌های همولیزی قرار دهد.

تشکر و قدردانی

این تحقیق حاصل پایان‌نامه کارشناسی ارشد هماتولوژی مصوب مرکز تحقیقات مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون می‌باشد. بدین وسیله از مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران، به دلیل حمایت‌های مالی در انجام این پروژه، تشکر و قدردانی می‌گردد.

جراحی می‌تواند نشانگر تزریق خون احتمالی حین عمل باشد که حتی خود بیمار از آن مطلع نیست، بنابراین آن را باید در سوابق بیمار جستجو نمود.

شایع‌ترین آلوآنتی‌بادی‌های مهم بالینی در این مطالعه anti-K (۲۳٪) و در مرتبه بعدی anti-E (۱۵٪) و (۱۱٪) anti-C بودند. این آلوآنتی‌بادی‌ها می‌توانند باعث واکنش همولیتیک بعد از تزریق خون و بیماری همولیتیک در جنین و نوزاد گردند و طول عمر گلبول‌های تزریقی را به طور چشمگیری کاهش دهند، لذا شناسایی آن‌ها دارای اهمیت فراوان است. در مطالعه‌های گذشته نیز شایع‌ترین آلوآنتی‌بادی‌های مهم بالینی anti-K و anti-E بودند. از عوامل مؤثر در شیوع بیشتر این آلوآنتی‌بادی‌ها احتمالاً شیوع بالاتر آنتی‌ژن‌های مربوطه در جمعیت، قدرت آنتی‌ژن‌سیته بالاتر و فقدان آزمون سازگاری و تعیین گروه برای این آنتی‌ژن‌ها قبل از تزریق خون می‌باشد (۷). سایر آلوآنتی‌بادی‌ها در مطالعه حاضر Fy^a ، Lu^a ، Le^b ، Le^a و anti-D بودند.

از نکات مثبت این مطالعه در نظر گرفتن آنتی‌بادی‌های واکنش‌دهنده در دمای اتاق (RT) در آزمایش‌های قبل از تزریق خون بود که توانایی مداخله در آزمایش‌ها را دارند، لیکن در اکثر مطالعه‌های قبلی به آن‌ها توجه نشده بود (۸). مشابه مطالعه‌های گذشته، شیوع بالاتر $anti-Le^b$ در زنان در دوره بارداری دیده می‌شود. زیرا بیان این آنتی‌ژن گروه

References:

- 1- Pinkerton PH, Coovadia AS, Goldstein J. Frequency of delayed hemolytic transfusion reactions following antibody screening and immediate-spin crossmatching. *Transfusion* 1992; 32(9): 814-7.
- 2- Issitt PD, Anstee DJ. *Applied blood group serology*. Durham, NC: Montgomery Scientific Publications; 1998: 873-905.
- 3- Zumberg MS, Procter JL, Lottenberg R, Kitchens CS, Klein HG. Autoantibody formation in the alloimmunized red blood cell recipient: clinical and laboratory implications. *Arch Intern Med* 2001; 161(2): 285-90.
- 4- Shulman IA, Maffei LM, Downes KA. North American pretransfusion testing practices, 2001-2004: results from the College of American Pathologists Interlaboratory Comparison Program survey data, 2001-2004. *Arch Pathol Lab Med* 2005; 129(8): 984-9.
- 5- Schonewille H, Haak HL, van Zijl AM. Alloimmunization after blood transfusion in patients with hematologic and oncologic diseases. *Transfusion* 1999; 39(7): 763-71.
- 6- Redman M, Regan F, Contreras M. A prospective study of the incidence of red cell allo-immunisation following transfusion. *Vox Sang* 1996; 71(4): 216-20.
- 7- Schonewille H, van de Watering LM, Brand A. Additional red blood cell alloantibodies after blood transfusions in a nonhematologic alloimmunized patient cohort: is it time to take precautionary measures? *Transfusion* 2006; 46(4): 630-5.
- 8- Ameen R, Al-Eyaadi O, Al-Shemmari S, Chowdhury R, Al-Bashir A. Frequency of red blood cell alloantibody in Kuwaiti population. *Med Princ Pract* 2005; 14(4): 230-4.
- 9- Moafi AR, Rahgozar S, Pourfathollah AA, Hariri MM.

- Blood group antigens frequency: a comparative study in intermediate thalassemics versus healthy people in Isfahan. *Sci J Iran Blood Transfus Organ* 2005; 2(3): 23-9. [Article in Farsi]
- 10- Gharehbaghian A, Khademi R, Amiri F, Lotfi G, Rahbari Bonab M. Frequency and specificity of red blood cell alloantibodies in general patients population with request for surgery in four selected hospitals in Tehran. *Vox Sang* 2010; 99(Supplement 1): 339-40.
- 11- Brecher M. Technical Manual. 15th ed. Bethesda, MD: AABB; 2005. p. 423-52.
- 12- Huh YO. Pretransfusion Testing of Red Blood Cells: Current Status. *Current Issues in Transfusion Medicine* 1994; 3(1). Available from: <http://www3.mdanderson.org/~citm/H-94-01.html>.
- 13- Wallis JP. Is it time to give up the crossmatch? *J Clin Pathol* 2000; 53(9): 673-5.
- 14- Winters JL, Pineda AA, Gorden LD, Bryant SC, Melton LJ 3rd, Vamvakas EC, *et al.* RBC alloantibody specificity and antigen potency in Olmsted County, Minnesota. *Transfusion* 2001; 41(11): 1413-20.

Original Article

Evaluation of frequency and specificity of RBC alloantibodies in Namazi Hospital patients in Shiraz, 2010

Ghorbani Ali-Abadi E.^{1,2}, Tavassoli A.R.^{1,2}, Gharehbaghian A.^{3,4}, Kasraian L.^{1,2},
Khademi R.¹, Taleie A.^{1,2}

¹Blood Transfusion Research Center, High Institute for Research and Education in Transfusion Medicine, Tehran, Iran

²Shiraz Regional Educational Blood Transfusion Center, Shiraz, Iran

³Paramedical Faculty, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

⁴Pediatric Congenital Hematologic Disorders Research Center of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Abstract

Background and Objectives

Alloimmunization with the prevalence rate of 60% is a common problem in chronically transfused patients. This problem has been reported to be less common in transfused hospital-based patients, amounting to 1-2 percent. Alloimmunization can lead to some difficulty varying from delay in the provision of similar blood types to delayed hemolytic transfusion reactions. The aim of this study was to analyze alloimmunization against RBCs among non-chronically transfused patients in Namazi Hospital in Shiraz.

Materials and Methods

Retrospective analysis of 3487 non-chronically transfused patients was conducted with antibody screening test and identification of patients' alloantibodies with the panel cell test. For patients with alloantibody, the data for sex, age, and history of transfusion and surgery were collected. Finally, the data were analyzed by SPSS software v. 15 using chi-square (CI= 95%).

Results

Twenty-eight out of 3487 patients had alloantibody (prevalence rate of 0.8%). The most common clinically significant alloantibodies found were anti-K (23%), anti-E (15%) and anti-C (11%). The most common clinically significant alloantibodies identified in males and females were anti-K and anti-C, respectively.

Conclusions

Alloantibody prevalence rate did not show any correlation with age and sex and was more common in patients with surgery history and transfusion record. Important factors contributing to the higher prevalence of the above alloantibodies are the higher prevalence of the related antigens in the population, higher antigenicity power, and the lack of crossmatch and grouping for the antigens before blood transfusion.

Key words: RBC antigens and antibodies, Serological testing, Blood Transfusion

Received: 10 Dec 2011

Accepted: 3 Mar 2013

Correspondence: Gharehbaghian A., PhD of Clinical Immunohematology. Associate Professor of Paramedical Faculty, Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Pediatric Congenital Hematologic Disorders Research Center of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. P.O.Box: 19857-17443, Tehran, Iran. Tel: (+9821) 22439982; Fax: (+9821) 22439982
E-mail: Gharehbaghian@gmail.com