

خون

فصلنامه علمی پژوهشی

دوره ۱۵ شماره ۱ بهار ۹۷ (۸۶-۹۷)

گفتمان انتقال خون

غربالگری سیفلیس در خون‌های اهدایی

مریم خیراندیش^۱، علی‌اکبر پورفتح‌الله^۲، مهتاب مقصودلو^۳، صدیقه امینی کافی‌آباد^۴، سیامک اسدی^۵، محمد حسین برادران^۶، اسماعیل پوریانی^۷، نقی تقواوی^۸، میر محمد علی حسینی^۹، سهیلا خسروی^{۱۰}، بابک رضازاده^{۱۱}، ایمان زارعی^{۱۲}، ابراهیم سلطانیان^{۱۳}، سید مرتضی طباطبایی^{۱۴}، امید علی عادلی^{۱۵}، مجتبی تهرمان رضائیه^{۱۶}، محمد سعید کریمیان^{۱۷}، احمد مرادی^{۱۸}، وحید مشمر^{۱۹}، افشین محمدی^{۲۰}، محمد ملک محمدی فرادنیه^{۲۱}، فاطمه سادات مهدویانی^{۲۲}، محمد رضا مهدی‌زاده^{۲۳}، روح‌الله میرزا^{۲۴}، مرتضی نوریان بیدگلی^{۲۵}، احسان روش‌روان^{۲۶}، حمید رضا اسلامی^{۲۷}، مهدی‌اکبری دهبالایی^{۲۸}، رستم حسن‌زاده^{۲۹}، مجید زینلی^{۳۰}، محمد حسین کریمی^{۳۱}، عبدالعزیز فقهی^{۳۲}، کرامت ناموری^{۳۳}، مهندوش مهران^{۳۴}

تاریخ دریافت: ۹۶/۱۱/۵

تاریخ پذیرش: ۹۶/۱۲/۲۰

- ۱- مولف مستول: PhD ایمونولوژی - دانشیار مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون - تهران - ایران - صندوق پستی: ۱۴۶۶۵-۱۱۵۷ PhD ایمونولوژی - استاد دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس - مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون - تهران - ایران
- ۲- متخصص پزشکی اجتماعی - دانشیار مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون - تهران - ایران
- ۳- متخصص آسیب‌شناسی بالینی و تشریحی - دانشیار مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون - تهران - ایران
- ۴- پزشک عمومی - مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پایگاه منطقه‌ای انتقال خون زنجان - زنجان - ایران
- ۵- پزشک عمومی - مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پایگاه منطقه‌ای انتقال خون قزوین - قزوین - ایران
- ۶- پزشک عمومی - مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پایگاه منطقه‌ای انتقال خون مازندران - ساری - ایران
- ۷- پزشک عمومی - مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پایگاه منطقه‌ای انتقال خون یزد - یزد - ایران
- ۸- پزشک عمومی - مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پایگاه منطقه‌ای انتقال خون گرگان - گرگان - ایران
- ۹- پزشک عمومی - مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پایگاه منطقه‌ای انتقال خون سیستان و بلوچستان - زاهدان - ایران
- ۱۰- پزشک عمومی - مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پایگاه منطقه‌ای آموزشی انتقال خون سیستان و بلوچستان - زاهدان - ایران
- ۱۱- پزشک عمومی - مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون اردبیل - اردبیل - ایران
- ۱۲- پزشک عمومی - مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون هرمزگان - بندرعباس - ایران
- ۱۳- پزشک عمومی - مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پایگاه منطقه‌ای آموزشی انتقال خون کرمانشاه - کرمانشاه - ایران
- ۱۴- متخصص کودکان - مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پایگاه منطقه‌ای انتقال خون تهران - تهران - ایران
- ۱۵- پزشک عمومی - مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پایگاه منطقه‌ای انتقال خون خرم‌آباد - ایران
- ۱۶- پزشک عمومی - مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پایگاه منطقه‌ای آذربایجان غربی - ارومیه - ایران
- ۱۷- پزشک عمومی - مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پایگاه منطقه‌ای انتقال خون کردستان - سنندج - ایران
- ۱۸- پزشک عمومی - مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پایگاه منطقه‌ای انتقال خون گیلان - رشت - ایران
- ۱۹- پزشک عمومی - مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پایگاه منطقه‌ای آموزشی انتقال خون آذربایجان شرقی - تبریز - ایران
- ۲۰- پزشک عمومی - مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پایگاه منطقه‌ای انتقال خون همدان - همدان - ایران
- ۲۱- پزشک عمومی - مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پایگاه منطقه‌ای انتقال خون چهارمحال و بختیاری - شهرکرد - ایران
- ۲۲- پزشک عمومی - مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پایگاه منطقه‌ای انتقال خون مرکزی - اراک - ایران
- ۲۳- پزشک عمومی - مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پایگاه منطقه‌ای انتقال خون کرج - کرج - ایران
- ۲۴- PhD خون‌شناسی آزمایشگاهی و بانک خون - استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان و مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پایگاه منطقه‌ای انتقال خون کرمان - کرمان - ایران
- ۲۵- پزشک عمومی - مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پایگاه منطقه‌ای انتقال خون قم - قم - ایران
- ۲۶- پزشک عمومی - مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پایگاه منطقه‌ای انتقال خون خراسان شمالی - بجنورد - ایران
- ۲۷- پزشک عمومی - مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پایگاه منطقه‌ای انتقال خون خراسان رضوی - مشهد - ایران
- ۲۸- دکترای تخصصی باکتری‌شناسی پژشکی - مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پایگاه منطقه‌ای انتقال خون ایلام - ایلام - ایران
- ۲۹- پزشک عمومی - مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پایگاه منطقه‌ای انتقال خون کهگیلویه و بویراحمد - یاسوج - ایران
- ۳۰- پزشک عمومی - مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پایگاه منطقه‌ای آموزشی انتقال خون اصفهان - اصفهان - ایران
- ۳۱- PhD ایمونولوژی - دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پایگاه منطقه‌ای آموزشی انتقال خون فارس - شیراز - ایران
- ۳۲- پزشک عمومی - مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پایگاه منطقه‌ای آموزشی انتقال خون خوزستان - هواز - ایران
- ۳۳- پزشک عمومی - مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پایگاه منطقه‌ای انتقال خون بوشهر - بوشهر - ایران
- ۳۴- پزشک عمومی - مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون - تهران - ایران

۴۵۶

در این خصوص ظهور مجدد سیفلیس به HIV نسبت داده می‌شود. بنابراین، تأکید زیادی بر ضرورت ایجاد آگاهی از نظر ابتلا به سیفلیس در غربالگری این بیماران صورت گرفته است^(۹).

در حال حاضر الگوریتم مشخص و در عین حال یکسان جهت تشخیص سیفلیس وجود ندارد. از سال ۱۹۸۲، سازمان بهداشت جهانی (World Health Organization)، آزمایش‌های تروپونمایی و غیر تروپونمایی را برای غربالگری سیفلیس توصیه می‌نماید اما، فرآیند تشخیصی مبتنی بر معاینه مستقیم بیمار، در مراحل اولیه سیفلیس یعنی زمانی که زخم وجود دارد، می‌باشد^(۱۰). از آن جایی که تروپونما پالیدوم از باکتری‌های غیر قابل کشت می‌باشد، میکروسکوپ زمینه تاریک در شناسایی عفونت اولیه حاد بسیار مفید بوده، به شناسایی مستقیم اسپیروکت کمک می‌کند^(۱۱، ۱۰). اما به دلیل وابستگی شدید به فرد با تجربه در تشخیص، چندان قابل استفاده نخواهد بود.

آزمایش Polymerase Chain Reaction (PCR) و آزمایش‌های مولکولی نیز می‌توانند در شناسایی عفونت اولیه مفید باشند اما به علت هزینه بالا جهت تشخیص در اهداکنندگان مناسب نیستند^(۱۲).

در حال حاضر، آزمایش‌های سرولوژیکی به عنوان مفیدترین راه کار تشخیصی در نظر گرفته می‌شوند^(۱۳، ۱۵)، در این آزمایش‌ها دو نوع آنتی‌بادی، آنتی‌بادی‌های غیر تروپونمایی که به کار دیولیپین‌های خارج شده از سلول‌های صدمه دیده می‌بانند می‌چسید و آنتی‌بادی‌های تروپونمایی یعنی آنتی‌بادی‌هایی که مستقیماً علیه آنتی‌ژن‌های اختصاصی هستند، شناسایی می‌شوند. آزمایش‌های غیر تروپونمایی شامل Rapid-Plasma-Reagins (RPR) و VDRL (Veneral Disease Research Laboratory) می‌باشند. این آزمایش‌ها ارزان، ساده و دارای حساسیت ۷۵٪ بوده و زمانی که عفونت فعال است، به میزان ۱۰۰٪ افزایش می‌باید. طول مدت آزمایش کوتاه، در حدود ۳۰ دقیقه است و به این علت بسیار مناسب بخش‌های اورژانس و بیماران دارای علائم بالینی قوی مشکوک به سیفلیس می‌باشد^(۱۶).

در سال‌های اخیر، تلاش‌های بسیار زیادی جهت ارتقای سلامت خون و هم چنین استقرار الگوریتم تشخیصی مؤثر و کارآمد، جهت غربالگری اهداکنندگان خون صورت گرفته است.

سیفلیس به عنوان یک عفونت قابل انتقال از طریق خون یک تهدید جدی برای سلامت عمومی جامعه محسوب می‌شود.

بیماری سیفلیس از طریق اسپیروکت تروپونما پالیدوم با تظاهرات بالینی چهار مرحله‌ای ایجاد می‌شود. این چهار مرحله شامل، عفونت سیفلیس اولیه و ثانویه، سیفلیس نهفته ابتدایی و تأخیری و فاز غیر عفونی می‌باشد.

اولین فاز بیماری با زخم‌های بدون درد با نام شانکر (Chancre) مشخص می‌شود که در مدت ۶ هفته ناپدید می‌گردد. در صورتی که بیماری بدون درمان باشد، فاز دوم بیماری در مدت ۱۰ هفته از شروع اولین شانکر آغاز می‌گردد. این مرحله شامل تب، ضعف و بی‌حالی، لنفادنوپاتی، از دست رفتن اشتها و راش‌های ماکولوپاپولار (Maculo Papular) می‌باشد.

فاز سوم بیماری شامل گسترش اسپیروکت به سیستم عصبی، قلبی و استخوان است^(۱، ۲).

از نظر تاریخچه، سابقه بیماری به قرن پانزدهم و با ورود از دنیای جدید (New World) به اروپا بر می‌گردد. گسترش بیماری پس از چند دهه، در شروع قرن ۱۹ در بسیاری مناطق گزارش شد^(۳).

در اواخر قرن بیستم به علت استفاده از پنی‌سیلین، کاهش قابل توجهی در شیوع بیماری مشاهده شد^(۴). با این وجود، در شروع دهه‌های ۱۹۹۰، سیفلیس اولیه و ثانویه در سراسر دنیا گزارش شد^(۵). اوج همه‌گیری جدید بیماری در ابتدا بین مردان هم جنس‌گرا، دوچندی‌ها و سپس به جمعیت دارای تماس جنسی با دیگران گسترش یافت^(۶). اخیراً در اروپا، مرکز کنترل بیماری‌ها، افزایش قابل توجهی از موارد سیفلیس را گزارش کرده است^(۷). مطابق با این روند، در ایتالیا، گزارش‌های انتیتو ملی سلامت، افزایش ۸ برابری از موارد سیفلیس اولیه و ثانویه را در فاصله سال‌های ۱۹۹۶-۲۰۰۸ نشان می‌دهد^(۸).

حدود ۱۰۰ درصد در فاز ثانویه قابلیت کاربردی و تشخیصی دارد.

TPPA عموماً در مقایسه با TPHA برای شناسایی سیفیلیس اولیه ارجحیت دارد(۲۱).

در مراکز انتقال خون، این نوع آزمایش‌های تروپونمایی، نیازمند ملزمات فراوان جهت گردش کار مفید و مؤثر می‌باشدند. از طرفی به علت گرانتر بودن در مقایسه با آزمایش‌های غیر تروپونمایی و از همه مهم‌تر بروز واکنش‌های مثبت کاذب، بسیار محدود می‌شوند.

در دهه‌های گذشته آزمایش‌های مبتنی بر آنزیم - ایمنی سیفیلیس : EIAs : Enzyme Immuno assays ، جهت شناسایی راه اندازی شده‌اند و به نظر می‌رسد جایگزین مناسبی برای RPR/VDRL و TPHA باشند.

این موضوع به خصوص از نظر قابلیت اتوماسیون شدن جهت غربالگری سیفیلیس در اهداف‌گان حائز اهمیت است(۲۵-۲۸).

اولین EIAs تروپونمایی جهت غربالگری در بانک خون آمریکا طی سال‌های ۱۹۸۰ تائید شد و پس از آن جهت تشخیص کلینیکی، توسط FDA در سال ۲۰۰۱ تایید گردید. تاکنون، نسل‌های جدیدتر EIA به روش اتومات با حساسیت بیشتر از ۹۵ تا ۹۹ درصد و اختصاصیت ۹۸ تا ۹۹ درصد، بیشتر از نسل اول معرفی شده‌اند(۲۹).

از آن جایی که این روش، قادر به شناسایی IgM و IgG اختصاصی سیفیلیس به طور هم‌زمان می‌باشد، بنابراین فاز سرونگاتیو دوره پنجره را به دنبال عفونت کوتاه می‌کند(۳۰، ۳۱).

در خصوص آزمایش تائیدی مناسب جهت تائید نتایج غربالگری مثبت اولیه، آزمایش FTA-Abs (Flourescent Antibody Absorption Test) چندین سال به عنوان آزمایش تائیدی در بعضی از آزمایشگاه‌ها استفاده می‌شد(۳۲). این آزمایش از نظر تکنیکی به مراتب پیچیده‌تر از روش آگلوتیناسیون می‌باشد، اما به خوبی در خصوص تائید سرم‌های مثبت در غربالگری کارآیی دارد، اما جهت تائید سرم‌های منفی چندان مناسب نیست. چرا که موارد منفی کاذب در عفونت‌های HIV با این

آنتی‌بادی‌های غیر تروپونمایی در ابتدای عفونت(۷) تا ۱۰ روز پس از ظهور زخم اولیه) یا چند هفته پس از عفونت قابل شناسایی هستند. شناسایی این آنتی‌بادی‌ها نشانه عفونت فعال بوده، برای پایش درمان بسیار مهم‌اند. در واقع کاهش تیتر این آنتی‌بادی‌ها نشانه اثربخشی آنتی‌بیوتیک می‌باشد. در عین حال افزایش تیتر نشانه بازگشت یا عفونت مجدد است.

در اهداف‌گان، شناسایی این آنتی‌بادی‌ها جهت شناسایی عفونت تازه، به خصوص زمانی که شیوع و بروز آن بالا رود، بسیار مهم است. اما یکی از مهم‌ترین معایب این آزمایش‌ها، واکنش‌های بیولوژیک کاذب مثبت هستند، که به علت حضور آنتی‌بادی‌های غیر تروپونمایی در سایر بیماری‌ها نظیر مئونوکلئوز عفونی، آبله مرغان، سرخک، مalaria، جذام، بیماری‌های بافت هم‌بند نظیر SLE ، سایر عفونت‌های اسپریوکتی و بدخیمی‌ها، نیز می‌باشد(۱۷، ۱۸).

به همین دلیل آزمایش‌های اختصاصی تروپونمایی توسعه و پیشرفت داشته‌اند. در این آزمایش‌ها از آنتی‌زن‌های ناتیو(Native) یا نوترکیب تریپانوما پالیدوم جهت شناسایی آنتی‌بادی‌های اختصاصی استفاده می‌شود. IgM ضد تروپونمایی در حدود دو هفته پس از عفونت و IgG در حدود ۴ هفته پس از عفونت ظاهر می‌شود(۱۹). IgM و آنتی‌بادی‌های غیر تروپونمایی به دنبال درمان سیفیلیس اولیه کاهش می‌یابد. در حالی که IgG ضد تروپونمایی مدت بیشتری ماندگار است(۲۰). در آزمایش‌های تروپونمایی، میزان واکنش آنتی‌بادی‌ها علیه آنتی‌زن‌های تریپانوزوم ارزیابی می‌گردد و عمدتاً مبتنی بر واکنش‌های آگلوتیناسیون مختلف می‌باشد. در TPHA (Treponema Pallidum Hemagglutination Assay) از گلبول‌های قرمز و در TPPA (Treponema Pallidum Particle Agglutination Assay) از پارتیکل‌های ژلاتین استفاده می‌کنند. در فاز فعال عفونت، تیتر بالایی از آنتی‌بادی‌ها بین روش‌ها قابل شناسایی و در فاز نهفته بیماری تیتر آنتی‌بادی‌ها کاهش می‌یابند.

از نظر کلینیکی، TPHA در هفته چهارم عفونت با حساسیت حدود ۷۰-۸۰ درصد در عفونت اولیه و در

مواد و روش‌ها

مراحل انجام این گفتمان از بهار ۱۳۹۶ آغاز شد. در این گفتمان، ۶ سؤال درخصوص آزمایش غربالگری RPR جهت شناسایی موارد سیفلیس در خون‌های اهدایی طرح و برای ۳۱ پایگاه انتقال خون در سراسر کشور ارسال شد. از همکاران درخواست شد، نظرات خود را به طور دقیق برای بازه زمانی سال‌های ۹۳ تا ۹۵ تنظیم و متناسب با استانداردهای سازمان انتقال خون ارسال نمایند. داده‌ها شامل تعداد موارد مثبت RPR در اهداکنندگان مراجعه کننده به پایگاه‌های انتقال خون به تفکیک گروه‌های سنی، جنس و نوع اهدا بود.

هم چنین نوع آزمایش‌های تائیدی و این که در کدام پایگاه آزمایش تائیدی گذاشته می‌شود، مورد بررسی قرار گرفت. طی مدت ۶ ماه، از مجموع ۳۱ پایگاه انتقال خون، ۲۹ پایگاه در این گفتمان شرکت و نظرات خود را اعلام کردند. داده‌های جمع‌آوری شده مورد بازبینی قرار گرفت و در مواردی که داده‌ها هم خوانی نداشت، از مدیر پایگاه مربوطه درخواست شد که مجدداً داده‌های پایگاه خود را بررسی نماید. یافته‌های پایگاه‌های انتقال خون، در قالب جداول جمع‌آوری و به صورت زیر ارائه گردید. سؤالات و پاسخ‌های مرتبط به طور خلاصه در ادامه خواهند آمد. لازم به ذکر است، جهت غربالگری سیفلیس پایگاه‌های اصفهان، کردستان، چهار محال و بختیاری، البرز، مازندران، همدان، لرستان، خراسان رضوی، ایلام، گلستان، قزوین، گیلان، اردبیل، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، تهران، یزد، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، کرمانشاه، فارس، قم و آذربایجان شرقی از کیت داخلی آنیسان (Enison, Immunotrep, Iran) و پایگاه‌های آذربایجان غربی و زنجان از کیت خارجی امگا (Omega, Immunotrep, OD051/OD061: UK) استفاده کردند.

در پایگاه خوزستان در سال‌های ۹۴ و ۹۳ از کیت آنیسان و در سال ۹۵ از کیت امگا استفاده شد. در پایگاه خراسان شمالی در سال ۹۳، کیت آنیسان و در سال ۹۴ از هر دو کیت آنیسان و امگا و در سال ۹۵ نیز از کیت امگا جهت غربالگری استفاده شد.

آزمایش گزارش شده است (۲۴).

به همین دلیل، با وجود این که بسیاری از آزمایشگاه‌ها، جهت تایید موارد مثبت سیفلیس از این آزمایش استفاده می‌کنند، اما چندان توصیه نمی‌شود (۲۹). بنابراین TPPA را به عنوان جایگزین مناسب FTA-Abs و FTA-Abs را جهت آزمایش تائیدی معرفی می‌نمایند (۲۷).

برخی نیز آزمایش‌های وسترن بلات تروپونمایی را به دلیل حساسیت و اختصاصیت بالا و سادگی، به عنوان جایگزین مناسب FTA-Abs توصیه می‌نمایند (۳۳).

در مجموع، استفاده از آزمایش‌های تروپونمایی به منظور غربالگری بدون محدودیت نخواهد بود، هم چنین خطر نتایج مثبت و منفی کاذب نیز وجود دارد (۲۸، ۲۷، ۲۳).

استفاده از آزمایش‌های غیر تروپونمایی برای غربالگری روتین نیز مناسب آزمایش‌ها با حجم بالا نمی‌باشد، ضمن این که خطر افزایش موارد منفی کاذب به علت حساسیت کم در مقایسه با آزمایش‌های تروپونمایی اختصاصی حتی برای عفونت تازه و یا به دلیل پدیده پروزن می‌تواند اتفاق افتد (۲۶). علاوه بر این، موارد مثبت کاذب که اغلب با آزمایش‌های غیر تروپونمایی و یا EIAs اتفاق می‌افتد، سبب ایجاد مشکلات متعددی در تصمیم‌گیری خواهد شد. بنابراین تکرار آزمایش و یا درمان‌های غیر ضروری را می‌تواند در پی داشته باشد. این مسئله درخصوص اهداکنندگان در غربالگری روتین به سبب خطر پایین بیماری، بسیار با اهمیت تر نخواهد بود (۲۵، ۲۶، ۴۹).

در این گفتمان، هدف ما ارائه نظرات کارشناسانه و اقدامات عملی انجام شده، مطابق با SOP‌های موجود در مورد یا موارد مثبت RPR بود.

جهت ارزیابی میزان آشنازی و تسلط پایگاه‌ها با موارد مثبت کاذب آزمایش RPR و موارد مثبت گزارش شده، با آزمایش تائیدی، سؤالاتی طرح و جواب‌های ارسالی جمع‌بندی شد. علاوه بر این، با توجه به اهمیت بیولوژیکی اسپیروکت‌های تروپونما پالیدوم و از دست رفتن بیماری‌زایی آن پس از ۷۲ ساعت در درجه حرارت يخچال، ضرورت انجام غربالگری سیفلیس در اهداکنندگان خون به بحث گذاشته شد.

خون

فصلنامه مدنی قضائی

دوره ۱۵، شماره ۱، بهار ۹۷

جدول ۱: شیوع موارد RPR مثبت در اهداکنندگان به تفکیک جنس، سن، نوع اهدای سال‌های ۹۳-۹۵

نوع اهدای			گروههای سنی								جنس		نام استان
با سابقه	مستمر	بار اول	۶۵ >	۵۶-۶۵	۴۶-۵۵	۳۶-۴۵	۲۶-۳۵	۲۱-۲۵	≤ ۲۰	مرد	زن		
۰/۰۱۶	۰/۰۱۳	۰/۰۵۳	-	۰/۰۱۴	۰/۰۱۶	۰/۰۱۹	۰/۰۲۵	۰/۰۳۱	۰	۰/۰۲۱	۰/۰۲۶	اصفهان	
۰/۰۴۵	۰/۰۱۹	۰/۰۷۶	-	۰/۰۱۸	۰/۰۲۸	۰/۰۴۱	۰/۰۳۶	۰/۰۳۰	۰/۰۱۷	۰/۰۳۴	۰/۰۷۴	خوزستان	
۰/۰۶۴	۰/۰۱۶	۰/۱۲۳	-	۰/۱۱۵	۰/۰۹۲	۰/۰۶۸	۰/۰۳۰	۰/۰۸۰	۰/۰۵۵	۰/۰۶۲	۰/۱۷۹	کردستان	
۰/۰۰۹	۰	۰/۰۰۷	-	۰	۰/۰۱۴	۰	۰/۰۰۳	۰	۰	۰/۰۰۴	۰	چهار محال و بختیاری	
۰	۰	۰/۰۰۸	-	۰	۰/۰۰۶	۰	۰/۰۰۲	۰	۰	۰/۰۰۱	۰	خراسان شمالی	
۰/۰۷۴	۰/۰۶۲	۰/۱۱۸	-	۰/۱۰۸	۰/۰۲۸	۰/۰۸۳	۰/۰۸۰	۰/۰۶۳	۰/۰۲۶	۰/۰۷۹	۰/۱۸۰	البرز	
۰/۰۱۶	۰/۰۱۵	۰/۰۱۴	-	۰/۰۱۱	۰/۰۰۵	۰/۰۰۸	۰/۰۰۹	۰/۰۰۴	۰	۰/۰۱۵	۰	مازندران	
۰/۰۱۹	۰/۰۰۱	۰/۰۱۶	-	۰/۰۱۹	۰/۰۲۴	۰/۰۰۹	۰/۰۰۴	۰	۰	۰/۰۰۹	۰	همدان	
۰/۰۰۶	۰/۰۰۵	۰/۰۴۴	-	۰/۰۲۰	۰/۰۱۰	۰/۰۰۸	۰/۰۲۰	۰/۰۱۵	۰	۰/۰۱۲	۰/۰۱۸	لرستان	
۰/۰۱۰	۰/۰۰۸	۰/۰۲۷	-	۰/۰۱۹	۰/۰۲۰	۰/۰۱۵	۰/۰۰۹	۰/۰۰۹	۰/۰۰۷	۰/۰۱۳	۰/۰۱۱	خراسان رضوی	
۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰۲	۰	ایلام	
۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گلستان	
۰/۰۳۴	۰/۰۱۳	۰/۰۵۹	-	۰/۰۸۰	۰/۰۴۹	۰/۰۱۱	۰/۰۳۴	۰/۰۱۶	۰/۰۵۶	۰/۰۲۶	۰/۰۶۴	قزوین	
۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	۰/۰۰۲	-	۰	۰/۰۰۶	۰	۰/۰۰۱	۰	۰	۰/۰۰۱	۰	گیلان	
۰/۰۲۱	۰/۰۱۱	۰/۰۸۰	-	۰/۰۰۲	۰/۰۲۶	۰/۰۴۱	۰/۰۱۳	۰/۰۳۶	۰	۰/۰۲۷	۰/۱۰۷	آذربایجان غربی	
۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اردبیل	
۰/۰۳۱	۰/۰۱۸	۰/۰۶۸	-	۰/۰۴۳	۰/۰۳۸	۰/۰۲۰	۰/۰۳۱	۰/۰۲۳	۰/۰۳۷	۰/۰۲۳	۰/۱۱۸	زنجان	
۰/۰۱۱	۰/۰۰۵	۰/۰۲۹	-	۰/۰۲۵	۰/۰۳۴	۰/۰۰۶	۰/۰۱۱	۰/۰۰۵	۰/۰۱۲	۰/۰۱۱	۰/۰۲۰	سیستان و بلوچستان	
۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کرمان	
۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هرمزگان	
۰/۰۲۸	۰/۰۱۵	۰/۰۸۳	-	۰	۰/۰۳۰	۰/۰۲۹	۰/۰۳۲	۰/۰۶۸	۰/۰۲۲	۰/۰۳۰	۰/۰۷۴	مرکزی	
۰/۰۵۶	۰/۰۳۹	۰/۰۸۷	-	۰/۰۶۸	۰/۰۷۳	۰/۰۷۶	۰/۰۷۳	۰/۰۴۹	۰/۰۶۹	۰/۰۵۶	۰/۰۹۵	تهران	
۰/۰۳۶	۰/۰۰۸	۰/۱۴۱	-	۰/۰۵۱	۰/۰۴۳	۰/۰۴۵	۰/۰۲۲	۰/۰۲۴	۰/۰۳۰	۰/۰۳۵	۰	یزد	
۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کهگیلویه و بویر احمد	
۰/۰۰۳	۰/۰۰۴	۰	-	۰	۰/۰۱۲	۰/۰۰۳	۰/۰۰۲	۰	۰	۰/۰۰۳	۰/۰۲۰	بوشهر	
۰/۰۰۲	۰/۰۰۲	۰	-	۰	۰	۰/۰۰۲	۰/۰۰۱	۰/۰۰۴	۰	۰/۰۰۱	۰	کرمانشاه	
۰/۰۲۳	۰/۰۱۳	۰/۰۵۷	-	۰/۰۲۳	۰/۰۲۲	۰/۰۲۱	۰/۰۲۵	۰/۰۲۳	۰	۰/۰۲۱	۰/۰۵۴	فارس	
۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قم	

میزان شیوع موارد RPR مثبت در اهداکنندگان به تفکیک جنس، سن، نوع اهدا طی سال‌های ۹۳-۹۵ در جداول ۱ و ۲ آمده است. همان طور که جدول ۱ نشان می‌دهد، میزان شیوع موارد مثبت RPR در استان‌های گلستان، اردبیل، کرمان، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد و قم صفر می‌باشد. بالاترین میزان شیوع مربوط به استان‌های البرز و کردستان است.

مقایسه میزان موارد⁺ RPR در زنان و مردان نشان می‌دهد که در ۱۳ پایگاه، میزان شیوع در زنان بیشتر از مردان است. همان طور که پیش‌بینی می‌شد، کمترین میزان شیوع مربوط به اهداکنندگان مستمر و بیشترین مربوط به اهداکنندگان بار اول می‌باشد. یافته‌های این مطالعه در جدول ۲ نشان می‌دهند، روند شیوع موارد مثبت RPR در استان‌های کردستان، البرز و آذربایجان غربی رو به افزایش است. علاوه بر این، بررسی نتایج پایگاه‌ها در سال‌های ۹۳-۹۵ نشان می‌دهد که از مجموع ۵۹۳۹۹۲۷ اهدا، هیچ مورد هم‌زمانی با سایر عفونت‌های قابل انتقال از طریق خون (HCV، HBV و HIV) با نتایج مثبت RPR وجود ندارد.

پایگاه مرکزی، در سال ۹۳، از کیت ایسان و امگا، در سال ۹۴ و ۹۵ از کیت امگا استفاده کرد. علاوه بر این، پایگاه‌هایی که آزمایش‌های تائیدی موارد مثبت RPR را انجام می‌دهند از کیت ایمونوفلوروسانس (Euro Immune, Germany) استفاده کرده‌اند.

یافته‌ها

سؤال ۱: اطلاعات درخصوص موارد مثبت و منسی مشاهده شده RPR در اهداکنندگان مراجعه کننده به پایگاه شما اطلاعات خواسته شده در جدول شماره یک و دو را به طور دقیق تکمیل نمایید.

در این سؤال، از مراکز انتقال خون خواسته شد تا میزان اهدای خون را به تفکیک سال، جنس، گروه‌های سنی نوع اهدا و کیت مصرفی در انجام آزمایش RPR بر روی خون‌های اهدایی در فاصله زمانی ۹۳-۹۵ به همراه نام کمپانی در جدول شماره ۱ ارسالی، گزارش کنند. علاوه بر این، تعداد موارد مثبت RPR (واکنش‌گر) را به تفکیک جنس، گروه‌های سنی و نوع اهدا در جدول ۲ ارسالی، تکمیل نمایند.

جدول ۲: روند شیوع موارد مثبت RPR در اهداکنندگان به تفکیک گروه سنی و نوع اهدا طی سال‌های ۹۳-۹۵

استان	اهداکنندگان	شیوع										نوع اهدا			
		≤ ۲۰	۲۱-۲۵	۲۶-۳۵	۳۶-۴۵	۴۶-۵۵	۵۶-۶۵	۶۵ >	بار اول	مستمر	با سابقه	با	با	با	با
تهران	۹۳ سال	۰/۰۱۷	۰	۰/۰۵۶	۰/۰۱۶	۰/۰۱۵	۰/۰۰۹	-	۰/۰۶۰	۰/۰۰۸	۰/۰۰۶	۰/۰۰۸	۰/۰۰۶	۰/۰۰۸	۰/۰۰۸
	۹۴ سال	۰/۰۲۹	۰	۰/۰۳۴	۰/۰۱۱	۰/۰۳۶	۰/۰۱۰	-	۰/۰۷۲	۰/۰۲۲	۰/۰۱۴	۰/۰۲۲	۰/۰۱۴	۰/۰۲۲	۰/۰۲۲
	۹۵ سال	۰/۰۱۷	۰	۰/۰۳۱	۰/۰۲۴	۰/۰۰۷	۰/۰۱۵	۰/۰۲۴	-	۰/۰۲۷	۰/۰۰۹	۰/۰۲۹	۰/۰۰۹	۰/۰۰۹	۰/۰۰۹
آذربایجان غربی	۹۳ سال	۰/۰۳۲	۰	۰/۰۴۰	۰/۰۰۹	۰/۰۴۴	۰/۰۰۵	-	۰	۰/۰۵۶	۰/۰۲۱	۰/۰۴۲	۰/۰۲۱	۰/۰۰۹	۰/۰۰۸
	۹۴ سال	۰/۰۳۷	۰/۰۵۲	۰/۰۳۰	۰/۰۳۸	۰/۰۳۲	۰/۰۴۳	۰/۰۵۴	-	۰/۰۹۳	۰/۰۱۶	۰/۰۴۷	۰/۰۱۶	۰/۰۰۹	۰/۰۰۸
	۹۵ سال	۰/۰۳۶	۰	۰/۰۵۴	۰/۰۲۹	۰/۰۴۷	۰/۰۳۴	-	۰/۰۷۸	۰/۰۲۰	۰/۰۴۵	۰/۰۲۰	۰/۰۰۹	۰/۰۰۸	۰/۰۰۸
کهگیلویه و بویراحمد	۹۳ سال	۰/۰۱۶	۰	۰/۰۳۰	۰/۰۰۶	۰/۰۰۶	۰/۱۱۵	-	۰/۰۲۷	۰/۰۰۹	۰/۰۱۳	۰/۰۰۹	۰/۰۰۹	۰/۰۰۸	۰/۰۰۸
	۹۴ سال	۰/۰۴۵	۰	۰/۰۳۳	۰/۰۰۴۰	۰/۰۴۰	۰/۰۲۱	۰	-	۰/۰۹۱	۰/۰۱۷	۰/۰۵۶	۰/۰۱۷	۰/۰۰۹	۰/۰۰۸
	۹۵ سال	۰/۱۰۵	۰/۲۱۵	۰/۰۲۰۴	۰/۰۰۹۹	۰/۰۹۹	۰/۱۸۵	۰/۱۳۹	۰/۲۳۰	-	۱۸/۷۵	۰/۹۴۶	۰/۱۱۹	۰/۰۹۴۶	۰/۰۹۴۶
گلستان	۹۳ سال	۰/۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰/۰۲۲	-	۰	۰/۰۲۹	۰/۰۱۳	۰	۰	۰/۰۱۳	۰/۰۱۳
	۹۴ سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰/۰۲۹	۰/۰۱۳	۰	۰	۰/۰۱۳	۰/۰۱۳
	۹۵ سال	۰/۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰/۰۱۱	-	۰	۰/۰۲۹	۰/۰۰۸	۰/۰۱۳	۰	۰/۰۰۸	۰/۰۰۸

خون

فصلنامه مدنی و حقوقی

دوره ۱۵، شماره ۱، بهار ۹۷

•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	سال ۹۳	ب.
•	•	•	۰/۰۲۰	-	•	۰/۰۱۸	•	۰/۰۰۶	•	•	۰/۰۰۴	سال ۹۴	ب.
•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	سال ۹۵	ب.
۰/۰۲۴	۰/۰۰۹	۰/۰۶۳	-	۰/۹۹۰	۰/۰۴۵	۰/۰۲۷	۰/۰۲۴	۰/۰۱۸	•	۰/۰۳۰	سال ۹۳	ب.	
۰/۰۲۹	۰/۰۵۴	۰/۰۷۵	-	۰/۰۴۸	۰/۱۰۳	۰/۰۵۴	۰/۰۳۱	۰/۰۵۸	•	۰/۰۵۳	سال ۹۴	ب.	
۰/۱۶۸	۰/۱۰۸	۰/۲۰۶	-	۰/۰۸۵	۰/۰۱۸	۰/۱۵۵	۰/۱۷۴	۰/۱۱۲	۰/۰۷۰	۰/۱۵۳	سال ۹۵	ب.	
۰/۰۱۵	۰/۰۱۴	۰/۰۱۷	-	۰/۰۱۲	۰/۰۰۲	۰/۰۱۰	۰/۰۰۸	۰/۰۰۶	•	۰/۰۱۵	سال ۹۳	ب.	
۰/۰۱۷	۰/۰۱۴	۰/۰۰۴	-	۰/۰۲۳	۰/۰۰۶	۰/۰۰۶	۰/۰۰۶	۰/۰۰۷	•	۰/۰۱۳	سال ۹۴	ب.	
۰/۰۱۵	۰/۰۱۶	۰/۰۲۱	-	•	۰/۰۰۸	۰/۰۰۶	۰/۰۱۳	•	•	۰/۰۱۶	سال ۹۵	ب.	
•	•	۰/۰۰۹	-	•	•	۰/۰۰۹	•	•	•	۰/۰۰۲	سال ۹۳	ب.	
۰/۰۲۸	•	۰/۰۲۰	-	•	۰/۰۲۸	۰/۰۰۹	۰/۰۰۶	•	•	۰/۰۱۲	سال ۹۴	ب.	
۰/۰۲۷	۰/۰۰۴	۰/۰۲۳	-	۰/۰۵۶	۰/۰۴۳	۰/۰۰۹	۰/۰۰۷	•	•	۰/۰۱۴	سال ۹۵	ب.	
•	•	۰/۰۰۱	-	۰/۰۶۶	•	۰/۰۹۳	۰/۰۲۰	•	•	۰/۰۱۲	سال ۹۳	ب.	
•	۰/۰۱۰	۰/۰۳۶	-	•	•	۰/۰۰۹	۰/۰۳۳	•	•	۰/۰۱۳	سال ۹۴	ب.	
۰/۰۱۶	۰/۰۰۴	۰/۰۴۲	-	•	۰/۰۳۰	•	۰/۰۰۷	۰/۰۵۷	•	۰/۰۱۳	سال ۹۵	ب.	
۰/۰۰۸	۰/۰۰۷	۰/۰۱۷	-	•	۰/۰۱۷	۰/۰۰۷	۰/۰۰۹	۰/۰۱۲	•	۰/۰۰۹	سال ۹۳	ب.	
۰/۰۰۲	۰/۰۰۸	۰/۰۳۹	-	۰/۰۱۸	۰/۰۲۱	۰/۰۲۰	۰/۰۰۳	۰/۰۱۴	۰/۰۲۳	۰/۰۱۳	سال ۹۴	ب.	
۰/۰۱۸	۰/۰۰۹	۰/۰۲۸	-	۰/۰۳۶	۰/۰۲۰	۰/۰۱۹	۰/۰۱۳	•	•	۰/۰۱۵	سال ۹۵	ب.	
•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	سال ۹۳	ب.
•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	۰/۰۰۷	سال ۹۴	ب.	
•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	سال ۹۵	ب.
۰/۰۲۶	۰/۰۱۳	۰/۰۲۹	-	•	۰/۰۴۹	۰/۰۱۲	۰/۰۲۵	•	•	۰/۰۲۰	سال ۹۳	ب.	
۰/۰۱۱	•	۰/۰۲۹	-	•	۰/۰۲۱	•	۰/۰۱۶	•	۰/۰۹۰	۰/۰۰۹	سال ۹۴	ب.	
۰/۰۶۲	۰/۰۲۶	۰/۱۲۰	-	۰/۱۹۹	۰/۰۷۳	۰/۰۲۰	۰/۰۵۸	۰/۰۴۹	۰/۰۸۲	۰/۰۵۳	سال ۹۵	ب.	
•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	سال ۹۳	ب.
۰/۰۰۵	۰/۰۰۴	•	-	•	۰/۰۱۳	•	۰/۰۰۳	•	•	۰/۰۰۴	سال ۹۴	ب.	
•	•	۰/۰۰۷	-	•	۰/۰۰۶	•	•	•	•	۰/۰۰۱	سال ۹۵	ب.	
۰/۰۱۱	۰/۰۱۰	۰/۰۳۹	-	۰/۰۴۵	۰/۰۲۱	۰/۰۲۳	۰/۰۰۴	•	•	۰/۰۱۷	سال ۹۳	ب.	
۰/۰۲۶	۰/۰۰۸	۰/۰۷۱	-	۰/۰۵۲	۰/۰۲۸	۰/۰۲۳	۰/۰۲۳	۰/۰۳۲	•	۰/۰۲۶	سال ۹۴	ب.	
۰/۰۲۵	۰/۰۱۶	۰/۱۲۷	-	۰/۰۶۰	۰/۰۳۰	۰/۰۷۷	۰/۰۱۹	۰/۰۶۷	•	۰/۰۴۴	سال ۹۵	ب.	
•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	سال ۹۳	ب.
•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	سال ۹۴	ب.
•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	سال ۹۵	ب.
۰/۰۶۳	۰/۰۱۶	۰/۰۸۸	-	۰/۱۳۲	۰/۰۹۶	۰/۰۱۶	۰/۰۴۷	•	۰/۱۰۴	۰/۰۴۴	سال ۹۳	ب.	
۰/۰۳۱	۰/۰۱۶	۰/۰۹۰	-	•	•	۰/۰۴۵	۰/۰۴۶	۰/۰۳۵	•	۰/۰۳۴	سال ۹۴	ب.	
•	۰/۰۰۷	۰/۰۲۳	-	•	۰/۰۲۶	•	•	۰/۰۳۹	•	۰/۰۰۸	سال ۹۵	ب.	

سال												میں بین عمر کا نکاح
۹۳	۹۴	۹۵	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۰۰	۱۰۱	۱۰۲	۱۰۳	۱۰۴	
سال	سال	سال	سال	سال	سال	سال	سال	سال	سال	سال	سال	
۰/۰۰۵	۰/۰۰۵	۰/۰۱۲	-	۰/۰۸۷	۰	۰	۰/۰۰۶	۰/۰۰۶	۰/۰۱۶	۰/۰۰۷	۹۳	سال
۰/۰۲۲	۰/۰۱۲	۰/۰۴۴	-	۰	۰/۰۵۸	۰/۰۱۹	۰/۰۲۴	۰	۰/۰۱۹	۰/۰۲۱	۹۴	سال
۰/۰۰۶	۰	۰/۰۳۹	-	۰	۰/۰۴۰	۰	۰/۰۰۳	۰/۰۰۸	۰	۰/۰۰۷	۹۵	سال
۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳	سال
۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴	سال
۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	سال
۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳	سال
۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴	سال
۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	سال
۰/۰۲۸	۰	۰/۰۶۵	-	۰	۰	۰/۰۲۸	۰/۰۳۶	۰/۰۱۹	۰	۰/۰۲۲	۹۳	سال
۰/۰۲۶	۰/۰۲۱	۰/۰۹۹	-	۰	۰/۰۶۲	۰/۰۲۶	۰/۰۳۳	۰/۰۶۱	۰/۰۶۶	۰/۰۳۹	۹۴	سال
۰/۰۲۸	۰/۰۲۱	۰/۰۸۶	-	۰	۰/۰۲۵	۰/۰۳۳	۰/۰۲۶	۰/۱۲۸	۰	۰/۰۳۶	۹۵	سال
۰/۰۶۴	۰/۰۴۲	۰/۰۹۱	-	۰/۰۹۵	۰/۰۸۳	۰/۰۸۳	۰/۰۸۳	۰/۰۵۷	۰/۰۷۰	۰/۰۶۴	۹۳	سال
۰/۰۶۳	۰/۰۲۹	۰/۱۰۲	-	۰/۰۵۰	۰/۰۶۹	۰/۰۸۲	۰/۰۷۴	۰/۰۵۵	۰/۰۸۱	۰/۰۶۱	۹۴	سال
۰/۰۳۹	۰/۰۴۵	۰/۰۷۰	-	۰/۰۶۲	۰/۰۶۷	۰/۰۶۳	۰/۰۶۲	۰/۰۳۴	۰/۰۵۴	۰/۰۵۱	۹۵	سال
۰/۰۳۷	۰/۰۰۴	۰/۱۰۳	-	۰/۱۱۱	۰/۰۳۰	۰/۰۴۷	۰/۰۴۰	۰	۰	۰/۰۳۷	۹۳	سال
۰/۰۴۴	۰/۰۰۴	۰/۰۷۹	-	۰/۰۵۰	۰/۰۴۳	۰/۰۵۳	۰/۰۰۶	۰	۰	۰/۰۲۶	۹۴	سال
۰/۰۲۶	۰/۰۱۵	۰/۲۳۴	-	۰	۰/۰۵۳	۰/۰۳۴	۰/۰۲۰	۰/۰۹۱	۰/۱۱۰	۰/۰۳۷	۹۵	سال
۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳	سال
۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴	سال
۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	سال
۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳	سال
۰/۰۱۱	۰/۰۱۰	۰	-	۰	۰/۰۳۶	۰	۰/۰۰۷	۰	۰	۰/۰۰۸	۹۴	سال
۰	۰/۰۰۴	۰	-	۰	۰	۰/۰۰۹	۰	۰	۰	۰/۰۰۲	۹۵	سال
۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳	سال
۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴	سال
۰/۰۰۶	۰/۰۰۷	۰	-	۰	۰	۰/۰۰۷	۰/۰۰۴	۰/۰۱۳	۰	۰/۰۰۵	۹۵	سال
۰/۰۲۱	۰/۰۰۷	۰/۰۶۴	-	۰/۰۴۵	۰/۰۳۰	۰/۰۱۸	۰/۰۱۸	۰/۰۱۳	۰	۰/۰۲۱	۹۳	سال
۰/۰۱۹	۰/۰۱۲	۰/۰۴۵	-	۰	۰/۰۱۷	۰/۰۱۵	۰/۰۳۰	۰/۰۰۷	۰	۰/۰۱۹	۹۴	سال
۰/۰۲۸	۰/۰۱۹	۰/۰۶۲	-	۰/۰۲۶	۰/۰۲۲	۰/۰۳۰	۰/۰۲۷	۰/۰۵۲	۰	۰/۰۲۸	۹۵	سال

سؤال ۲- ب: به نظر شما چه اقدامی در این خصوص (نمونه خون، اهل اکننده و کیسه خون فرآورده) می‌توان انجام داد؟

در این قسمت از سؤالات از همکاران نظرات کارشناسی و فنی فراتر از دستورالعمل‌ها و استانداردهای سازمان با توجه به تجارت خود درخصوص اقدام لازم در مواجه با نمونه‌های مثبت آزمایش RPR خواسته شد.

سؤال ۲-الف: در صورت مواجهه شدن با مورد یا موارد مشتب آزمایش RPR، اقدام برای نمونه خون، اهل اکننده و کیسیه خون و فرآورده‌های آن چه خواهد بود؟

پاسخ‌های ارائه شده در جدول ۳ آمده است. همان طور که مشاهده می‌شود امکان کیسه خون/فرآورده و ثبت در نرم‌افزار اطلاعات اهداکنندگان توسط ۲۸ استان شرکت کننده در مطالعه ذکر شده است.

جدول ۳: اقدام مراکز انتقال خون در مواجهه با نمونه RPR مثبت به تفکیک استان

سازمان که در صورت منفی بودن فرد مورد نظر به چرخه اهدا ب گدد.

- ۷- املاحی پلاکت و قرار دادن کيسه خون و فرآورده‌ها در یخچال و مصرف آن پس از ۳-۴ روز (زنگان، بندرعباس)
- ۸- بررسی بیشتر سایر عفونت‌های متقله از طریق خون به علت مشت شدن آزمایش

تعدادی از مراکز به ضرورت انطباق نرمافزار اتوماسیون
اهداکنندگان با تغییرات دستورالعمل ها و روش های کاری
تاكید نموده از جمله امکان اهدای مجدد اهداکننده ای که
سابقه آزمایش RPR مثبت و FTA-Abs منفی در داخل
سازمان داشته و آزمایش RPR در داخل سازمان بعد
از گذشت ۱۲ ماه منفی شود. لازم به ذکر است در حال
حاضر، امکان پذیرش این افراد طبق
SOP.00.TM.117.SOP/03
فعالی اجازه پذیرش این اهداکنندگان را نمی دهد.

در یک جمع‌بندی کلی، پایگاه‌ها پس از امحای نمونه خون، کیسه و فرآورده‌های خونی عمدتاً موارد زیر را پیشنهاد دادند:

- انجام آزمایش‌های تائیدی به صورت متمرکز در ستاد
 - ارسال نمونه‌های مثبت از طرف پایگاه به آزمایشگاه‌های تخصصی جهت تایید نمونه
 - انجام آزمایش‌های تائیدی PCR, FTA-Abs و وسترن بلاط
 - اطلاع رسانی و مشاوره با اهداکننده و دادن اطلاعات کافی درخصوص ماهیت آزمایش، بیماری و هم چنین احتمال بالای مثبت کاذب و در نهایت درخواست آزمایش تاییدی برای ایشان
 - معاف دائم اهداکننده (پاسوچ)
 - حذف اهداکننده از چرخه اهدا به صورت موقت، امحای کیسه و فرآورده‌ها، انجام آزمایش تائیدی توسط

اریتماتوس و بدخیمی‌ها.

سؤال ۴: جهت تایید موارد مثبت گزارش شده *RPR*، از چه روش یا روش‌هایی می‌توان استفاده کرد؟

به دنبال طرح سؤال ۳ و یادآوری موارد مثبت کاذب، در سؤال ۳ از همکاران خواسته شد به آزمایش‌ها و شیوه‌هایی که قادر به شناسایی موارد مثبت واقعی سیفلیس در اهداکنندگان می‌باشد، اشاره نمایند. در واقع در این آزمایش‌ها، آنتیژن‌های نوترکیب یا آنتیژن اصلی تروپونما پالیدوم جهت شناسایی آنتی‌بادی‌های اختصاصی تروپونمایی استفاده می‌شود.

آن‌تی‌بادی‌های اختصاصی IgM، دو هفته پس از عفونت و آنتی‌بادی‌های IgG چهار هفته پس از عفونت اولیه تولید و قابل شناسایی می‌باشند.

آن‌تی‌بادی‌های IgM اختصاصی و آنتی‌بادی‌های غیر تروپونمایی پس از درمان سیفلیس اولیه کاهش می‌یابند. در حالی که آنتی‌بادی‌های IgG اختصاصی مدت زمان زیادی حتی پس از درمان بیماری نیز در سرم قابل شناسایی هستند. همکاران در پاسخ به سؤال به آزمایش‌های اختصاصی زیر اشاره داشتند:

TPH، PCR، MHA-TP، FTA-Abs و سترن بلات و آزمایش الایزا.

در آزمایش‌های تروپونمایی، میزان واکنش آنتی‌بادی با آنتی‌ژن‌های اختصاصی و بر اساس واکنش آگلوتیناسیون ارزیابی می‌شود. در آزمایش هماگلوتیناسیون تروپونما پالیدوم (TPHA) از گلbul قرمز و در آزمایش پارتیکل آگلوتیناسیون (TPPA) یا میکروهماگلوتیناسیون MHA-TP از پارتیکل‌های ژلاتینی استفاده می‌شود. افزایش تیتر آنتی‌بادی در این آزمایش‌ها با عفونت حد بیماری مرتبط و در فاز نهفته بیماری کاهش می‌یابد.

سؤال ۵: آیا در پایگاه شما جهت تایید موارد مثبت اقدام می‌شود؟ (در داخل پایگاه یا ارسال نمونه به خارج از پایگاه) اطفاً در صورت مثبت بودن جواب، درخصوص اقدام انجام شده جدول شماره ۳ را به طور دقیق تکمیل نمایید.

در این سؤال از همکاران مستقر در پایگاه خواسته شده

نکته دیگر مطرح شده در این خصوص آن است که اهداکننده‌ای با آزمایش مثبت RPR و FTA-Abs منفی (انجام شده در خارج سازمان)، واجد شرایط اهدای خون است، مثبت کاذب وی در نظر گرفته نمی‌شود و نیاز به دوره انتظار ندارد. علاوه بر این اهداکننده‌ای که مبتلا به سیفلیس بوده و ۱۲ ماه از اتمام درمان و بهبودی کامل وی و شریک جنسی‌اش گذشته باشد، می‌تواند اهداکننده خون باشد، در حالی که اهداکننده با آزمایش RPR مثبت و FTA-Abs مثبت که آزمایش وی در داخل سازمان انجام گرفته است، معاف دائم می‌شود و امکان اهدای مجدد بعد از درمان برای وی وجود ندارد (هر چند ابتلای تعدادی از این افراد در بررسی‌های خارج سازمان هم محرز نمی‌شود).

بنابراین شواهد، برخی از همکاران انتقال خون استان‌ها معتقدند معافیت دائم اهداکننده بر این اساس ضرورتی نخواهد داشت چرا که حتی اهداکننده پرخطر نیز یک سال معاف می‌شود. اجرایی شدن بازگشت اهداکننده پس از معافیت وقت مورد انتظار و از پیشنهادات همکاران بود.

سؤال ۳: با توجه به این که در این آزمایش موارد مثبت کاذب وجود دارد، چه شرایطی در ایجاد آن نقش دارد؟

هدف از طرح این سؤال، مرور علل بروز موارد مثبت کاذب بود که با انجام آزمایش‌های غیر تروپونمایی نظیر RPR می‌تواند بر نتایج مثبت واقعی سیفلیس در اهداکنندگان خون تاثیر داشته باشد.

در واقع یکی از معایب اساسی آزمایش‌های غیر تروپونمایی، واکنش‌های بیولوژیک مثبت کاذب به علت ایجاد آنتی‌بادی‌های غیر اختصاصی و غیر تروپونمایی ناشی از وجود و حضور سایر بیماری‌ها و عفونت‌های (۱۸)، (۱۷).

همکاران پایگاه‌ها در این قسمت به موارد متعددی اشاره کرده‌اند:

بیماری‌های اتوایمیون، سایر عفونت‌های اسپیروکتی، منونوکلئوز عفونی، آبله مرغان، سرخجه، مالاریا، جذام، بیماری‌های بافت همبند نظریه بیماری سیستمیک لوپوس

جدول ۴: اقدامات انجام شده توسط پایگاههای انتقال خون جهت تائید موارد RPR مثبت به تفکیک استان

غربالگری ذکر شد می‌توان به وجود خطر در مصرف خون تازه و پلاکت و همچنین امکان تشخیص سایر عفونت‌ها (Surrogate Marker) در صورت وجود اشاره کم کرد.

پاسخ به این سؤال نشان دهنده اشراف کامل همکاران
بر غیر اختصاصی بودن آزمایش غربالگری RPR جهت
تشخیص سیفلیس در اهداکنندگان و احتمال وقوع بالای
موارد مشتبه کاذب در اهداکنندگان می‌باشد.

بحث

آزمایش سیفلیس، قدیمی ترین آزمایش عفونی است که بیش از ۶۰ سال بر روی خون‌های اهدایی انجام می‌شود و در حال حاضر نیز سازمان جهانی بهداشت (WHO) بر انجام آن تأکید می‌کند. به طوری که در آخرین گزارش WHO، درخصوص «سلامت خون و دسترسی به آن» از بین کشورهای شرکت‌کننده در ارسال گزارش، ۱۷۳ کشور آزمایش غربالگری سیفلیس را بر روی تمامی نمونه‌های اهداکنندگان خون انجام می‌دهند، کشورهای دانمارک و

در صورت انجام آزمایش تاییدی بر روی نمونه‌های مثبت RPR اهداکنندگان، اطلاعات خواتمه شده از موارد تاییدی را به تفصیل جنس، گروه سینی و نوع اهدای برای ما ارسال نمایند(جدول ۴). موارد ذکر شده به صورت خلاصه آورده شده است. طبق اعلام مراکز انتقال خون تنها در ۴ پایگاه اصفهان، تهران، فارس و کهگیلویه و بویراحمد برای آزمایش تاییدی اقدام می‌شود. دو پایگاه اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد جهت تائید موارد مثبت، نمونه‌ها را برای پایگاه‌های تهران و شیراز به ترتیب ارسال می‌نمایند. در هر دو پایگاه استان فارس و تهران از آزمایش تاییدی FTA-Abs استفاده می‌شود.

سؤال ۶: از آن جایی که اسپیروکت‌های تروپونیما پالیدوم پس از سه تا چهار روز در درجه حرارت یخچال بیماری زایی خود را از دست می‌دهند، به نظر شما آیا اساساً انجام آزمایش سیفلیس بر روی خون‌های اهدایی ضروری است؟ لطفاً از جواب خود دفاع کنید.

مراکز انتقال خون تأکید بر ضرورت انجام آزمایش غربالگری سیفلیس داشتند. از جمله دلایلی که برای این

۱۰

جهت ارزیابی میزان آشنایی و تسلط پایگاه‌ها با موارد مثبت کاذب، آزمایش RPR و آزمایش تاییدی موارد مثبت گزارش شده، سؤالاتی طرح و جواب‌های ارسالی جمع‌بندی شد.

علاوه بر این، با توجه به اهمیت بیولوژیکی اسپیروکت‌های تروپونمای پالیدوم و از دست رفتن بیماری زایی آن پس از ۷۲ ساعت در درجه حرارت یخچال، ضرورت انجام غربالگری سیفلیس در اهداکنندگان به بحث گذاشته شد. نظرات کارشناسانه درخصوص نقاط ضعف و قابل بحث الگوریتم تشخیصی اهداکنندگان + RPR را ائمه گردید.

نتایج مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۴ درخصوص میزان شیوع سیفلیس در بین اهداکنندگان خون مراجعت کننده به پایگاه وصال در سال‌های ۸۵-۹۱ به چاپ رسیده است، تنشان می‌دهد که میزان شیوع موارد RPR^+ تایید شده با آزماس $FTA-Abs$ ، $۰/۰۱$ درصد است.^(۳۵)

ایسلند، برنامه غربالگری غیر روتین دارند و نروژ نیز منحصرًا اهداکنندگان بار اول را آزمایش می‌کند (۳۴). در غربالگری اهداکنندگان، استفاده از آزمون‌های غیر تروپونمایی برای حجم بالای آزمایش‌ها مناسب نیست و احتمال افزایش موارد منفی کاذب، به علت کم بودن حساسیت آزمایش در مقایسه با آزمایش‌های اختصاصی و هم چنین افزایش موارد مثبت کاذب به علت اختصاصی کمتر را، به دنبال خواهد داشت. بنابراین ضرورت به کارگیری روش‌های اختصاصی به خوبی احساس می‌شود. از طرفی، تفسیر نتایج آزمایش‌ها با روش دستی (چه اختصاصی و چه غیر اختصاصی) بدون اشکال نبوده، می‌تواند در بین آزمایشگاه‌های مختلف و کارشناسان انجام‌دهنده بسیار متفاوت باشد. بنابراین استفاده از روش‌های اختصاصی به شیوه خودکار جهت انجام حجم بالای آزمایش‌ها توصیه می‌شود. در این گفتمان، هدف ما ارائه نظرات کارشناسانه و اقدامات عملی انجام شده، مطابقه با SOP‌های موجود، با مورد داشت RPR

جدول ۵: عوامل مطرح شده در خصوص ضرورت انجام RPR بر خون های اهدایی پایگاه های انتقال خون به تفکیک استان

جواب ندادهاند.

خواهد داشت که آیا وضعیت موجود جهت غربالگری سیفلیس در اهداکنندگان می‌تواند تضمین‌کننده سلامت خون در ایران باشد(۳۷). به هر حال آن‌چه که بدیهی است انطباق نرم‌افزار اتوماسیون اهداکنندگان با تعییرات دستورالعمل‌ها می‌تواند منجر به کاهش از دست رفت‌دانمی⁺ RPR اهداکنندگان با تست تائیدی منفی گردد. از این‌نظر، نظر به پیر شدن جمعیت کشور و متعاقب آن اهداکنندگان خون، حذف شدن درصد کمتری از اهداکنندگان که عمدتاً در گروه‌های سنی جوانتر هستند، آینده گنجینه جمعیتی اهداکنندگان خون را با خطر کمتری مواجه می‌کند. از طرفی ارزیابی مهارتی و آموزش‌های ضمن خدمت کارشناسان مستقر در آزمایشگاه‌ها با توجه به ماهیت پر خطا آزمایش RPR، ضرورت بازنگری در این خصوص را بیش از پیش ایجاد می‌کند. برگزاری دوره‌های کوتاه مدت یک روزه، ارسال نمونه‌های مجهول با ماهیت مشخص برای پایگاه‌ها، راهنمایی در موارد غیر قابل تشخیص و نظارت بر نتایج به دست آمده توصیه می‌شود. علاوه بر این، به نظر می‌رسد گنجاندن آزمایش‌های اختصاصی سیفلیس و تائیدی در برنامه سیستم خودکار و اتمات استقرار یافته اخیر در بعضی از پایگاه‌ها، ضمن تعییر الگوریتم تشخیص فعلی به مسیری سخت‌گیرانه‌تر، سبب برداشتن گام‌های مطمئن‌تری در راستای حفظ سلامت خون گردد.

تشکر و قدردانی

بدین‌وسیله نویسنده‌گان مقاله از کلیه پرسنل پایگاه‌های انتقال خون که در تدوین پاسخ سوالات همکاری صمیمانه نموده‌اند سپاسگزارند. هم چنین از خانم مژگان نریمانی که مسئولیت تایپ و ویرایش مقاله را بر عهده داشتند قدردانی می‌شود.

نتایج به دست آمده در این مطالعه از مجموع ۲۸ پایگاه شرکت‌کننده در گفتمان، با نتایج این مقاله هماهنگی دارد. همان طور که در نتایج نیز بیان شد، میزان شیوع موارد مثبت⁺ RPR در استان‌های کردستان، البرز و آذربایجان غربی رو به افزایش است. بنابراین ضرورت بازنگری فرآیند آزمایش، مدیریت و کنترل موارد مثبت، بیش از پیش احساس می‌شود.

از طرفی میزان شیوع اهداکنندگان⁺ RPR در استان‌های گلستان، اردبیل، کرمان، هرمزگان، کهکیلویه و بویراحمد و قم صفر می‌باشد. نظر به احتمالات و عوامل مداخله‌کننده در ایجاد نتایج مثبت کاذب که در قسمت مقدمه بر شمردیم، احتمال صفر بودن نتایج آزمایش بسیار ضعیف است بنابراین ضرورت پی‌گیری و بررسی مجلد فرآیند آزمایش، به خصوص آمادگی مهارتی کارشناسان انجام‌دهنده آزمایش توصیه می‌شود.

در این مطالعه، بررسی ۲۹ پایگاه در سال‌های ۹۳-۹۵ نشان داد که از مجموع ۵۹۳۹۹۲۷ اهدا، هیچ مورد هم زمانی با سایر عفونت‌های قابل انتقال از طریق خون(HIV، HCV و HBV) با نتایج مثبت RPR وجود ندارد. در گزارشی که در سال ۲۰۰۹ در آمریکا نیز به چاپ رسیده است، نشان می‌دهد که انجام آزمایش‌های سرولوژیکی سیفلیس بر روی ۱۴۸ میلیون اهدا، فقط در یک مورد HIV⁺ با نتایج آزمایش سیفلیس هم خوانی دارد(۳۶). بنابراین انجام آزمایش سیفلیس جنبه مارکری جایگزین (Surrogate marker) جهت شناسایی سایر عفونت‌ها به خصوص HIV در کشور ما محسوب نمی‌شود.

نتیجه‌گیری

در مجموع، با عنایت به تأکید سازمان جهانی بهداشت بر انجام غربالگری سیفلیس بر خون‌های اهدای و با توجه به نتایج حاصل از نظرات همکاران در پایگاه‌های انتقال خون سراسر کشور، همچنان این سؤال وجود

References:

- 1- Golden MR, Marra CM, Holmes KK. Update on syphilis: resurgence of an old problem. *JAMA* 2003; 290(11): 1510-4.
- 2- Merritt HH, Adams RD, Solomon HC. *Neurosyphilis*. New York: Oxford University Press; 1940.
- 3- Peeling RW, Mabey DC. Syphilis. *Nat Med* 2004; 2: 448-9.
- 4- World Health Organization. *Treponemal Infections*. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 1982.
- 5- Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Sexually Transmitted Disease Surveillance 2012. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, CDC; 2014.
- 6- Koedijk FD, van Benthem BH, Vrolings EM, Zuilhof W, van der Sande MA. Increasing sexually transmitted infection rates in young men having sex with men in the Netherlands, 2006-2012. *Emerg Themes Epidemiol* 2014; 11: 12.
- 7- Janier M, Hegyi V, Dupin N, Unemo M, Tiplica GS, Potocnik M, et al. 2014 European guideline on the management of syphilis. *J Eur Acad Dermatol Venereol* 2014; 28(12): 1581-93.
- 8- Salfa MC, Regine V, Ferri M Suligoi B. e la Rete Sentinella dei Centri Clinici e dei Laboratori di Microbiologia clinica. Le Infezioni sessualmente trasmesse: i dati dei due Sistemi di sorveglianza sentinella attivi in Italia. *Notiziario ISS* 2014; 27: 4-39.
- 9- Kaplan JE, Benson C, Holmes KK, Brooks JT, Pau A, Masur H, et al. Guidelines for prevention and treatment of opportunistic infections in HIV-infected adults and adolescents: Recommendations from CDC, the National Institutes of Health, and the HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America. *MMWR Recomm Rep* 2009; 58(RR-4): 1-207; quiz CE1-4.
- 10- Glatz M, Juricevic N, Altwegg M, Bruisten S, Komericki P, Lautenschlager S, et al. A multicenter prospective trial to assess a new real-time polymerase chain reaction for detection of *Treponema pallidum*, herpes simplex-1/2 and *Haemophilus ducreyi* in genital, anal and oropharyngeal ulcers. *Clin Microbiol Infect* 2014; 20(12): O1020-7.
- 11- Liu H, Rodes B, Chen CY, Steiner B. New tests for syphilis: Rational design of a PCR method for detection of *Treponema pallidum* in clinical specimens using unique regions of the DNA polymerase I gene. *J Clin Microbiol* 2001; 39(5): 1941-6.
- 12- Ferreira SC, de Almeida-Neto C, Nishiya AS, Di-Lorenzo-Oliveira C, Ferreira JE, Alencar CS, et al. Prevalence of *Treponema pallidum* DNA among blood donors with two different serologic tests profiles for syphilis in São Paulo, Brazil. *Vox Sang* 2014; 106(4): 376-8.
- 13- Orton SL, Liu H, Dodd RY, Williams AE. ARINET Epidemiology Group. Prevalence of circulating *Treponema pallidum* DNA and RNA in blood donors with confirmed-positive syphilis tests. *Transfusion* 2002; 42(1): 94-9.
- 14- Müller I, Brade V, Hagedorn HJ, Straube E, Schörner C, Frosch M, et al. Is serological testing a reliable tool in laboratory diagnosis of syphilis. Meta-analysis of eight external quality control surveys performed by the German infection serology proficiency testing program? *J Clin Microbiol* 2006; 44(4): 1335-41.
- 15- Egglestone SI, Turner AJ. Serological diagnosis of syphilis. PHLS Syphilis Serology Working Group. *Commun Dis Public Health* 2000; 3(3): 158-62.
- 16- Tiwari AK, Pandey PK, Dara RC, Rawat GS, Raina V, Bhargava R. Evaluation of a new serological test for syphilis based on chemiluminescence assay in a tertiary care hospital. *Asian J Transfus Sci* 2015; 9(1): 65-9.
- 17- Larsen SA, Steiner BM, Rudolph AH. Laboratory diagnosis and interpretation of tests for syphilis. *Clin Microbiol Rev* 1995; 8(1): 1-21.
- 18- Naidu NK, Bharucha ZS, Sonawane V, Ahmed I. Comparative study of Treponemal and non-Treponemal test for screening of blood donated at a blood center. *Asian J Transfus Sci* 2012; 6(1): 32-5.
- 19- Luger A. Serological diagnosis of syphilis: Current methods. In: Young H, McMillan A. *Immunological Diagnosis of Sexually Transmitted Diseases*. New York: Marcel Dekker; 1988. p. 249-74.
- 20- Hunter MG, Robertson PW, Post JJ. Significance of isolated reactive treponemal chemiluminescence immunoassay results. *J Infect Dis* 2013; 207(9): 1416-23.
- 21- Young H. Guidelines for serological testing for syphilis. *Sex Transm Infect* 2000; 76(5): 403-5.
- 22- Sommese L, Iannone C, Cacciatore F, De Iorio G, Napoli C. Comparison between screening and confirmatory serological assays in blood donors in a region of South Italy. *J Clin Lab Anal* 2014; 28(3): 198-203.
- 23- Binnicker MJ, Jespersen DJ, Rollins LO. Treponema-specific tests for serodiagnosis of syphilis: Comparative evaluation of seven assays. *J Clin Microbiol* 2011; 49(4): 1313-7.
- 24- Maple PA, Ratcliffe D, Smit E. Characterization of *Treponema pallidum* particle agglutination assay-negative sera following screening by treponemal total antibody enzyme immunoassays. *Clin Vaccine Immunol* 2010; 17(11): 1718-22.
- 25- Seña AC, White BL, Sparling PF. Novel *Treponema pallidum* serologic tests: A paradigm shift in syphilis screening for the 21st century. *Clin Infect Dis* 2010; 51(6): 700-8.
- 26- Rodríguez I, Alvarez EL, Fernández C, Miranda A. Comparison of a recombinant-antigen enzyme immunoassay with *Treponema pallidum* hemagglutination test for serological confirmation of syphilis. *Mem Inst Oswaldo Cruz* 2002; 97(3): 347-9.
- 27- Pope V, Fears MB, Morrill WE, Castro A, Kikkert SE. Comparison of the Serodia *Treponema pallidum* particle agglutination, Captia Syphilis-G, and SpiroTek Reagin II tests with standard test techniques for diagnosis of syphilis. *J Clin Microbiol* 2000; 38(7): 2543-5.
- 28- Schmidt BL, Edjlalipour M, Luger A. Comparative evaluation of nine different enzyme-linked

- immunosorbent assays for determination of antibodies against *Treponema pallidum* in patients with primary syphilis. *J Clin Microbiol* 2000; 38(3): 1279-82.
- 29- Park Y, Park Y, Joo SY, Park MH, Kim HS. Evaluation of a fully automated treponemal test and comparison with conventional VDRL and FTA-ABS tests. *Am J Clin Pathol* 2011; 136(5): 705-10.
- 30- Young H, Pryde J, Duncan L, Dave J. The Architect Syphilis assay for antibodies to *Treponema pallidum*: An automated screening assay with high sensitivity in primary syphilis. *Sex Transm Infect* 2009; 85(1): 19-23.
- 31- Choi SJ, Park Y, Lee EY, Kim S, Kim HS. Comparisons of fully automated syphilis tests with conventional VDRL and FTA-ABS tests. *Clin Biochem* 2013; 46(9): 834-7.
- 32- Aktas G, Young H, Moyes A, Badur S. Evaluation of the fluorescent treponemal antibody absorption test for detection of antibodies (immunoglobulins G and M) to *Treponema pallidum* in serologic diagnosis of syphilis. *Int J STD AIDS* 2007; 18(4): 255-60.
- 33- Franken AA, Oliver JH, Litwin CM. Comparison of a combined nontreponemal (VDRL) and treponemal immunoblot to traditional nontreponemal and treponemal assays. *J Clin Lab Anal* 2015; 29(1): 68-73.
- 34- Global status report on blood safety and availability 2016. Geneva: World Health Organization; 2017. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
- 35- Mohammadali F, Pourfathollah A. Association of ABO and Rh Blood Groups to Blood-BorneInfections among Blood Donors in Tehran-Iran. *Iran J Public Health* 2014; 43(7): 981-9.
- 36- Zou S, Notari EP, Fang CT, Stramer SL, Dodd RY. Current value of serologic test for syphilis as a surrogate marker for blood-borne viral infections among blood donors in the United States. *Transfusion* 2009; 49(4): 655-61.
- 37- WHO. Screening donated blood for transfusion-transmissible infections: recommendations. USA: WHO; 2010. p. 24-44.

Forum

Syphilis Screening in Donated Blood

Kheirandish M.¹, Pourfathollah A.A.^{1,2}, Maghsudlu M.¹, Amini Kafi-abad S.¹, Asadi S.^{1,3}, Baradaran M.H.^{1,4}, Pooriani E.^{1,5}, Taghvae N.^{1,6}, Ali Hosseini M.M.^{1,7}, Khosravi S.^{1,8}, Rezazadeh B.^{1,9}, Zarei I.^{1,10}, Soltanian E.^{1,11}, Tabatabaie S.M.^{1,12}, Adeli O.A.^{1,13}, Ghahraman Rezaieyeh M.^{1,14}, Karimian M.S.^{1,15}, Moradi A.^{1,16}, Mosmer V.^{1,17}, Mohammadi A.^{1,18}, Malek Mohammadi Faradonbeh M.^{1,19}, Mahdaviani F.S.^{1,20}, Mehdizadeh M.R.^{1,21}, Mirzaie R.^{1,22,23}, Noorian Bidgoli M.^{1,24}, Roshanravan E.^{1,25}, Esalami H.R.^{1,26}, Akbari Dehbalaie M.^{1,27}, Hasanzadeh R.^{1,28}, Zeinali M.^{1,29}, Karimi M.H.^{1,30,31}, Feghhi A.H.^{1,32}, Namvari K.^{1,33}, Mehran M.¹

¹Blood Transfusion Research Center, High Institute for Research and Education in Transfusion Medicine, Tehran, Iran

²Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

³Zanjan Regional Blood Transfusion Center, Zanjan, Iran

⁴Qazvin Regional Blood Transfusion Center, Qazvin, Iran

⁵Mazandaran Regional Blood Transfusion Center, Sari, Iran

⁶Yazd Regional Blood Transfusion Center, Yazd, Iran

⁷Golestan Regional Blood Transfusion Center, Gorgan, Iran

⁸Sistan & Baluchestan Regional Blood Transfusion Center, Zahedan, Iran

⁹Ardebil Regional Blood Transfusion Center, Ardebil, Iran

¹⁰Hormozgan Regional Blood Transfusion Center, Bandar-Abbas, Iran

¹¹Kermanshah Regional Blood Transfusion Center, Kermanshah, Iran

¹²Tehran Regional Blood Transfusion Center, Tehran, Iran

¹³Lorestan Regional Blood Transfusion Center, Khorramabad, Iran

¹⁴Azerbaijan-Gharbi Regional Blood Transfusion Center, Urmia, Iran

¹⁵Kurdestan Regional Blood Transfusion Center, Kurdestan, Iran

¹⁶Guilan Regional Blood Transfusion Center, Rasht, Iran

¹⁷Azerbaijan-Sharghi Regional Educational Blood Transfusion Center, Tabriz, Iran

¹⁸Hamedan Regional Blood Transfusion Center, Hamedan, Iran

¹⁹Chaharmahal & Bakhtiari Regional Blood Transfusion Center, Shahrekurd, Iran

²⁰Arak Regional Blood Transfusion Center, Arak, Iran

²¹Alborz Regional Blood Transfusion Center, Karaj, Iran

²²Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

²³Kerman Regional Blood Transfusion Center, Kerman, Iran

²⁴Qom Regional Blood Transfusion Center, Qom, Iran

²⁵Khorasan Shomali Regional Blood Transfusion Center, Bojnourd, Iran

²⁶Khorasan Razavi Regional Blood Transfusion Center, Mashhad, Iran

²⁷Ilam Regional Blood Transfusion Center, Ilam, Iran

²⁸Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Regional Blood Transfusion Center, Yasouj, Iran

²⁹Isfahan Regional Blood Transfusion Center, Isfahan, Iran

³⁰Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

³¹Shiraz Regional Blood Transfusion Center, Shiraz, Iran

³²Khuzestan Regional Blood Transfusion Center, Ahvaz, Iran

³³Bushehr Regional Blood Transfusion Center, Bushehr, Iran

Received: 25 Jan 2018

Accepted: 11 Mar 2018

Correspondence: Kheirandish M., PhD of Immunology. Associate Professor of Blood Transfusion Research Center, High Institute for Research and Education in Transfusion Medicine.

P.O.Box: 14665-1157, Tehran, Iran. Tel: (+9821) 88602395; Fax: (+9821) 88628741

E-mail: m.kheirandish@ibto.ir