

خون

دوره ۷ شماره ۲ تابستان ۸۹ (۷۷-۷۰)

مقاله پژوهشی

بررسی مولکولی آلفا تالاسمی از نظر جهش‌های حذفی و غیر حذفی در حاملین مشکوک ایرانی

بهنائز زربخش^۱، الهام فرشادی^۲، آرین آریانی کاشانی^۳، مرتضی کریمی پور^۴، آزیتا آذرکیوان^۵، راضیه حبیبی پورفتیده^۶، محمد صادق فلاح^۷، فرشته مریمی^۸، علیرضا کردافشاری^۹، زهرا کائینی مقدم^{۱۰}، حمیده باقریان^{۱۱}، سیروس زینلی^{۱۲}

چکیده

سابقه و هدف

زوج‌های بسیاری در وضعیت نامشخص از نظر داشتن نقص در ژن‌های تالاسمی وجود دارند که تعیین قطعی این نواقص برای برنامه غربالگری قبل از ازدواج و نیز برای کمک به مشاوره ژنتیک ضروری می‌باشد. در این بررسی افراد مشکوک به آلفا تالاسمی، از نظر جهش‌های مختلف حذفی و غیر حذفی مورد بررسی مولکولی قرار گرفتند.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه توصیفی، نمونه‌های مشکوک به آلفا تالاسمی با $\text{MCV} < 80 \text{ fL}$ ، $\text{MCH} < 27 \text{ pg}$ ، به همراه سطح آهن و HbA_2 طبیعی از بین مراجعین به انسیتو پاستور ایران به طور تصادفی جدا و مورد بررسی قرار گرفتند. جهش‌های حذفی با روش Multiplex gap-PCR و جهش‌های غیر حذفی با روش ARMS-PCR و تعیین توالی (Sequencing) بررسی شدند.

یافته‌ها

از میان ۱۴۰ نمونه، در ۱۲۶ نفر (۹۰٪) جهش در خوش ژن آلفا گلوبین تعیین شد. در بررسی جهش‌های حذفی، وجود حداقل یک حذف در ۹۹ نفر (۷۱٪) از افراد نشان داده شد. در بررسی جهش‌های غیر حذفی، حداقل یک جهش نقطه‌ای در ۲۷ نفر (۲۸٪) از نمونه‌های فاقد جهش حذفی دیده شد. در مجموع ۹ جهش مختلف در این افراد تعیین شد. شایع‌ترین جهش، حذف $\alpha^{\text{nt}} - \alpha^{\text{nt}}$ در ۱۰۰ آل (۳۵٪) در مجموع ۲۸۰ کروموزوم مورد بررسی و به دنبال آن جهش غیر حذفی در ۲۵ آل (۸٪) بود.

نتیجه‌گیری

در این مطالعه به دلیل استفاده از روش تعیین توالی، جهش‌های نقطه‌ای در خوش ژن آلفا گلوبین فراوانی بیشتری را نسبت به سایر تحقیقات انجام شده توسط دیگر محققین کشور نشان می‌دهد. یافته‌های این مطالعه می‌تواند در برنامه کشوری مهار تالاسمی بسیار مفید باشد.

کلمات کلیدی: آلفا تالاسمی، جهش، PCR، ایران

تاریخ دریافت: ۸/۵/۷

تاریخ پذیرش: ۱۹/۲/۶

۱- دکترای دامپزشکی - انسیتو پاستور ایران

۲- کارشناس زیست‌شناسی عمومی - انسیتو پاستور ایران

۳- کارشناس زیست‌شناسی سلولی مولکولی - انسیتو پاستور ایران

۴- PhD فرآورده‌های بیولوژیک - استادیار انسیتو پاستور ایران

۵- فوق تحصص خون و انکلولوژی - استادیار مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران

۶- کارشناس ارشد هماتولوژی - مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران و پایگاه منطقه‌ای انتقال خون گیلان

۷- PhD ژنتیک پژوهشی - مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی کوثر

۸- پژوهش عمومی - انسیتو پاستور ایران

۹- پژوهش عمومی - مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی کوثر

۱۰- مؤلف مسؤول: PhD ژنتیک انسانی - دانشیار انسیتو پاستور ایران و مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی کوثر- صندوق پستی: ۱۳۱۸۵-۱۶۶۷

مقدمه

از مشکلات دیگری که در مشاوره ژنتیک زوج‌های مشکوک به ناقل تالاسمی با آن مواجه هستیم، همراهی ناقل آلفا تالاسمی با بنا تالاسمی است. در این مورد نیز تشخیص دقیق ژن‌های درگیر بسیار لازم و ضروری می‌باشد.

در این مطالعه بررسی مولکولی خوشه ژنی آلفا گلوبین در داوطلبینی با اندرس‌های خونی کاهش یافته^(۲۷) MCH <۸۰ و سطح آهن و HbA₂ (MCV) طبیعی که مشکوک به آلفا تالاسمی بودند و از مراکز بهداشت شهر تهران به انتیتو پاستور ایران ارجاع شده بودند، انجام گرفت.

مواد و روش‌ها


مطالعه انجام شده از نوع توصیفی بود. ۱۴۰ نمونه از میان داوطلبان ازدواج که به دنبال طرح غربالگری تالاسمی به مراکز بهداشت سطح شهر تهران مراجعه کرده بودند و مشکوک به حمل نقص در ژن‌های آلفا گلوبین بودند (MCV و MCH کاهش یافته به همراه سطح آهن و HbA₂ طبیعی) به صورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. پس از دریافت رضایت‌نامه، نمونه خون از افراد مراجعه کننده جهت استخراج DNA و بررسی مولکولی برای تعیین وضعیت نقص احتمالی در ژن آلفا گلوبین گرفته شد. تخلیص DNA از خون، با روش salting out طبق دستورالعمل استاندارد صورت پذیرفت^(۱۴).

نمونه‌ها ابتدا از نظر وجود چهار جهش حذفی متداول در کشور شامل حذف‌های تک ژنی $\alpha^{\text{III}}-\alpha^{\text{IV}}$ و $\alpha^{\text{I}}-\alpha^{\text{II}}$ و Multiplex gap-^{MED} حذف‌های دو ژنی $\alpha^{20/5}-\alpha^{20/5}$ با روش PCR بررسی شدند^(۱۵). در شکل نتایج حاصل از یک Multiplex Gap PCR با تعداد چهار جهش حذفی مختلف در حالت‌های هتروزیگوت، هموزیگوت و هتروزیگوت مرکب (نه حالت مختلف) نمایش داده شده است^(۷) (شکل ۱).

افراد فاقد جهش در بررسی با روش gap-Multiplex PCR ابتدا با روش ARMS-PCR جهت یافتن جهش‌های $\alpha^{\text{CD19}}-\alpha^{\text{CS}}$ و $\alpha^{\text{5nt}}-\alpha^{\text{5nt}}$ مورد بررسی قرار گرفتند (شکل ۲). ژن‌های آلفا ۱ و ۲ در سایر نمونه‌هایی که با این روش‌ها، جهش موجود در آن‌ها مشخص نشد، برای بررسی

تالاسمی یکی از مشکلات اساسی بهداشتی، اقتصادی، روانی و اجتماعی به حساب می‌آید. غربالگری ناقلين پیش از ازدواج برای بتاتالاسمی، تقریباً از سال ۱۳۷۶ در کشور اجباری گردید^(۲، ۱). از زمانی که در کشور غربالگری زوجین داطلب ازدواج به عنوان راه‌کاری اجباری برای جلوگیری از تولد افراد تالاسمی مطرح شده، پیشرفت‌های نسبتاً خوبی در عرصه شناخت نواقص ژنتیکی در ژن‌های بتا و آلفا گلوبین حاصل شده است. تا پیش از سال ۱۳۷۵ تقریباً ۱۵ موتاسیون روی ژن بتا گلوبین شناخته شده بود و بر روی ژن آلفا گلوبین شناختی بر مبنای تحقیقات داخلی وجود نداشت. به کمک تحقیقات گسترشده‌ای که محققین کشورمان در مراکز مختلف چه در ارتباط با مراکز خارجی و یا بدون ارتباط با آن‌ها انجام داده‌اند، اطلاعات ارزشمندی در خصوص درک بهتری از نواقص مولکولی این ژن‌ها به دست آمده است^(۲-۱۱).

خوشه ژنی آلفا گلوبین در انسان بر روی کروموزوم ۱۶ واقع شده و شامل ۷ ژن می‌باشد که دو ژن مهم و اصلی آن یعنی α_1 و α_2 گلوبین از نظر ترتیب توالی ژنی بسیار مشابهند. نقص مولکولی در این ژن‌ها، سندروم‌هایی با شدت متفاوت ایجاد می‌کنند. به این معنا که در نتیجه درگیری یک یا دو ژن، تغییرات خفیف ($75 > MCV > 80$ و $25 < MCV < 27$) تا شدید ($27 > MCV > 25$) در پارامترهای هماتولوژیک و تظاهرات بالینی از کم خونی نامحسوس تا جزیی رخ می‌دهد. با درگیری ۳ ژن، بیماری هموگلوبین H (HbH) تترامر زنجیره بتا می‌باشد^(۱) ایجاد می‌گردد. اکثر بیماران H نیازی به تزریق خون ندارند و کم خونی آن‌ها ملایم است، اما بعضی از موارد این بیماری به خصوص در موارد همراهی یک جهش نقطه‌ای با یک جهش حذفی دو ژنی، نیازمند دریافت خون هستند. با درگیری هر ۴ ژن، امکان تولید زنجیره آلفا وجود ندارد، زندگی پس از تولد بدون تزریق خون قبل و بعد از تولد امکان‌پذیر نیست و هیدروپس فتالیس نتیجه بارداری خواهد بود. در چنین حالتی هموگلوبین چنین یک تترامر از زنجیره گاما است که به آن "هموگلوبین بارت's Bart's" می‌گویند^(۱۲، ۱۳).




شکل ۱: الکتروفورز محصولات Multiplex gap-PCR بروی ژل یک درصد با رنگ آمیزی اتیدیوم بروماید. باند نرمال برای ژن آلفا با سایز ۱۸۰۰ جفت باز، باند حذف تک ژنی α^{37} - با سایز ۲۰۲۲ جفت باز، باند حذف تک ژنی α^{42} - با سایز ۱۶۲۸ جفت باز، باند حذف ۲ ژنی $\alpha^{20.5}$ - با سایز ۲۰۰۷ جفت باز و باند حذف ۲ ژنی α^{Med} - با سایز ۲۰۰۷ جفت باز دیده می‌شود. لازم به ذکر است، از آن جایی که کنترل داخلی در این آزمایش از منطقه ژن α_2 انتخاب گردیده است، بدیهی است که در ستون‌هایی که حاوی دو جهش حذفی هستند دیده نمی‌شود.

از نظر سایر جهش‌های نقطه‌ای، تعیین توالی شدند. برای این کار محصول PCR به شرکت Prim در کره جنوبی فرستاده شد و پاسخ آن‌ها به کمک نرم‌افزار SIS مکس، تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها

۱۴۰ نمونه مشکوک به آلفا تالاسمی با $MCV < 80 \text{ fL}$ ، $MCH < 27 \text{ pg}$ ، به همراه سطح آهن و HbA_2 طبیعی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی ۴ جهش Multiplex حذفی شایع درخوشه ژن آلفا گلوبین با روش gap-PCR، وجود حداقل یک حذف را در ۹۹ نفر (۷۰/۷۱٪) از افراد نشان داد. در بررسی جهش‌های غیر حذفی با روش ARMS-PCR، یک جهش نقطه‌ای در ۱۹ نفر (۴۶/۳۴٪) از نمونه‌های فاقد جهش دیده شد. بررسی بقیه نمونه‌ها به روش تعیین توالی، وجود جهش نقطه‌ای در ۸ نفر را نشان داد. در ۱۳ نفر از افراد واحد یک جهش Multiplex حذفی که جهش یافته شده به تنها یک توجیه گر اندرس‌های هماتولوژی آن‌ها نبود، در بررسی بیشتر، وجود یک جهش نقطه‌ای نیز در آن‌ها مشاهده شد.



شکل ۲: Multiplex ARMS-PCR مربوط به جهش‌های α^{CD19} - ۵nt، $\alpha^{Constant Spring}$ - ۸۱۶bp، α^{Spring} - ۱۸۹bp (متروزیگوت)، α^{5nt} - ۷۶۸bp و α^{5nt} - ۹۳۲bp دیده می‌شود.

خون

فصلنامه علمی پژوهشی

دوره ۷، شماره ۲، تابستان ۸۹

جدول ۱: توزیع فراوانی جهش‌های شناخته شده در این مطالعه و اندکس‌های هماتولوژی هر ژنتوتیپ

MCH (mean ± SD)	MCV (mean ± SD)	درصد	تعداد	ژنوتایپ
۲۴/۸ ± ۱/۳	۷۵/۳ ± ۲/۱	۱۰/۰	۱۴	$\alpha\alpha/\alpha\alpha$
۲۴ ± ۱/۶	۷۵ ± ۲/۹	۲۳/۵	۳۳	$-\alpha^{3.7}/\alpha\alpha$
۲۲/۱ ± ۱/۴	۷۰ ± ۳/۱	۱۷/۸	۲۵	$-\alpha^{3.7}/-\alpha^{3.7}$
۲۳/۸ ± ۱/۹	۷۴/۸ ± ۳/۷	۱۰/۷	۱۵	$\alpha^{5n}t\alpha/\alpha\alpha$
۲۰/۳ ± ۰/۶۷	۶۷/۱ ± ۴/۹	۱۰/۰	۱۴	$-\alpha^{3.7}/\alpha^{5n}t\alpha$
۲۰/۳ ± ۰/۱۴	۶۴/۶ ± ۲/۵	۵/۷	۸	$-\alpha^{3.7}/\alpha^{5n}t\alpha$
۲۲/۰ ± ۰/۷	۶۹/۵ ± ۰/۷	۳/۶	۵	$-\alpha^{20.5}/\alpha\alpha$
۲۲/۸ ± ۱/۱	۷۱/۱ ± ۲/۹	۲/۸	۴	$\alpha^{CS}\alpha/\alpha\alpha$
۱۹/۸ ± ۱/۱	۷۱ ± ۰/۹	۱/۲	۳	$-\alpha^{4.2}/\alpha\alpha$
۱۷/۷ ± ۰/۹	۶۵ ± ۱/۸	۱/۲	۳	$-\alpha^{3.7}/-\alpha^{20.5}$
۲۳/۷ ± ۰/۹	۷۲/۹ ± ۰/۱۴	۱/۲	۳	$-\alpha^{3.7}/-\alpha^{4.2}$
۲۳/۵ ± ۰/۹۱	۷۷/۹ ± ۱/۵	۱/۴	۲	$-\alpha^{3.7}/\alpha^{CS}\alpha$
۲۳/۵ ± ۰/۷	۷۴ ± ۰	۱/۴	۲	$\alpha^{cd19}\alpha/\alpha\alpha$
۱۹ ± ۲/۸	۶۳/۳ ± ۳/۵	۱/۴	۲	$\alpha^{PA2(4A>G)}\alpha/\alpha\alpha$
۱۸/۲ ± ۳	۶۱/۴ ± ۶/۲	۱/۴	۲	$\alpha^{PA2(4A>G)}\alpha/\alpha^{PA2(4A>G)}\alpha$
۱۸/۰ ± ۱/۸	۶۰/۵ ± ۲	۱/۴	۲	$-\alpha^{20.5}/\alpha^{5n}t\alpha$
۲۲	۷۰	۰/۷	۱	$\alpha^{cd19}\alpha/-\alpha^{3.7}$
۲۴	۷۱	۰/۷	۱	$\alpha\alpha/\alpha^{PA2(6A>G)}\alpha$
۱۹/۸	۶۴/۹	۰/۷	۱	$-\alpha^{4.2}/\alpha^{PA2(4A>G)}\alpha$
		۱۰۰	۱۴۰	جمع


جدول ۲: فرکانس آل‌لی جهش‌های یافته شده در مجموعه ژنی آلفا

درصد	تعداد	ژنوتایپ
۳۵/۷۱	۱۰۰	$-\alpha^{3.7}$
۸/۹۳	۲۵	$\alpha\alpha^{5n}t$
۵/۰۰	۱۴	$-\alpha^{MED}$
۳/۵۷	۱۰	$-\alpha^{20.5}$
۲/۸۶	۸	$\alpha^{PA2(4A>G)}\alpha$
۲/۵۰	۷	$-\alpha^{4.2}$
۲/۱۴	۶	$\alpha\alpha^{CS}$
۱/۰۷	۳	$\alpha^{cd19}\alpha$
۱۰ + ۲۸/۲۱	۲۸ + ۷۹	آل طبیعی
۱۰۰	۲۸۰	جمع

در کل نتیجه بررسی‌های مولکولی در ۱۲۶ نفر (۹۰٪) از افراد مورد بررسی نشانگر وجود جهش در خوش ژنی آلفا بود (جدول ۱).

در مجموع ۹ جهش مختلف در این افراد تعیین شد. شایع‌ترین جهش، حذف α -در ۱۰۰ آل (۳۵/۷۱) در مجموع ۲۸۰ کروموزوم مورد بررسی و به دنبال آن جهش غیر حذفی α در ۲۵ آل (۸/۹۳) بود (جدول ۲).

در مورد نمونه‌هایی که با روش‌های Multiplex Gap-PCR و ARMS-PCR، تعیین ژنوتایپ نشدند، با روش تعیین توالی هر دو حالت هتروزیگوت و هموزیگوت جهش در سیگنال پلی A به صورت AATAAA>AATGAA تعیین شد (شکل ۳).



شکل ۳: جهش در سیگنال پلی A به صورت $AATAAA \rightarrow AATGAA$: جهش آدنین به گوانین به صورت هتروزیگوت در نوکلوتید ۸۶۹ مشاهده می‌گردد.

بحث

آزمایش تعیین توالی برای ژن‌های آلفا، می‌تواند وجود موتاسیون‌های نقطه‌ای و حذف‌های کوچک را در نمونه‌های فاقد جهش‌های حذفی بزرگ و یا در نمونه‌های واجد یک حذف کوچک یا یک آلل غیر حذفی همراه با اندکس‌های هماتولوژیک بسیار پایین تراز حد مورد انتظار، مشخص کند. اکثر منابع از وجود چند جهش مهم در ژن α_2 (که سه برابر بیشتر از α_1 محصول دارد) نام برده‌اند که در برخی از تحقیقات محققان ایرانی داخل کشور نیز گزارش شده است (۲۰، ۱۷-۲۰، ۱۱، ۱۰، ۸).

در این مطالعه جهش α_2 -در $100\%/\text{۳۵}71$ آلل از آلل‌های بررسی شده، تشخیص داده شد. فراوانی جهش α_2 -در مطالعه‌های سایر محققین کشور به میزان $32/8\%$ ، $42/5\%$ و $44/9\%$ در بین افراد واجد جهش گزارش شده است (۳، ۵، ۱۰). در صورت محاسبه فراوانی آللی جهش α_2 -در کل جمعیت مورد مطالعه، این میزان در ۲ مقاله اخیر $22/30\%$ و $24/11\%$ خواهد بود (۳، ۵).

جهش در سیگنال پلی A به صورت $>AATAAA$ ، از جهش‌هایی است که به ارت بردن فرم هموژیگوت آن، ایجاد فنوتیپ بیماری H می‌کند که شدیدتر از فرم حذفی این بیماری است (۲۱). در مطالعه حاضر این جهش بالاترین فراوانی آللی در میان جهش‌های غیر حذفی را نشان داد. یاوریان جهش در کدون ۱۹ ژن α_2 را برای اولین بار در سال ۲۰۰۳ گزارش کرد که در جمعیت هموژن استان هرمزگان، $12/2\%$ از آلل‌های معیوب

بیوسترز طبیعی هموگلوبین نیاز به ژن سالم، تقویت کننده‌ها، خاموش کننده‌ها، آغازگرها و منطقه کترول (LCR = Locus control region) دارد. جهش‌های متعددی موجب بروز تالاسمی می‌شوند که تعداد بسیاری از آن‌ها شرح داده شده است. این جهش‌ها ممکن است در هر مرحله از بیان ژن گلوبین، نسخه‌برداری، Pre-mRNA mRNA translation، splicing و یا پایداری mRNA و assembly بعد از ترجمه و نهایتاً پایداری پلی‌پیتید‌گلوبین تاثیرگذار باشند (۱۶).

با وجودی که بیش از پنجاه سال از تحقیقات در سطح جهانی برای سندروم تالاسمی می‌گذرد و با وجود پیشرفت‌های غیر قابل انکاری که در شناخت مکانیسم اثر جهش‌های ژنی در بروز علایم بالینی حاصل شده است، هنوز تالاسمی یکی از مشکلات گسترده بهداشتی در جهان به شمار می‌رود.

پزشکان گاهی آلفا تالاسمی خفیف را با کم خونی فقر آهن اشتباه کرده و آهن تجویز می‌نمایند که البته تاثیری روی این کم خونی ندارد. در فردی که ناقل آلفا تالاسمی خفیف و یا شدید می‌باشد، معمولاً RBC بیش از حد طبیعی و Hb طبیعی و یا مرزی (آقایان $14/5 <$ و خانم‌ها $\geq 12/5$)، MCV کمتر از 80 و MCH کمتر از 27 است. شباهت آزمایشگاهی در پارامترهای خونی والدین می‌تواند نقش مهمی در تشخیص افراد ناقل مشکوک به آفات تالاسمی ایفا نماید.

تحقیقات مشابه نشان می‌دهد که نوع نقص مولکولی، در شدت تظاهر بیماری نقش دارد. بیماران مبتلا به HbH متاثر از جهش‌های غیر حذفی (α/α) در مقایسه با فرم حذفی آن (α/α) دارای عوارض شدیدتر بوده و بیشتر به تزریق خون وابسته می‌شوند. مواردی نیز که به واسطه فرم هموزیگوت برخی از این جهش‌ها (α/α / α/α) به تنها می‌باشد، وجود آمده باشد، وجود دارد (Personal Observation) (۲۳، ۲۱، ۱۷). لذا مشخص کردن وضعیت نقص در ژن‌های آلفا گلوبین جهت تعیین ناقل بودن فرد از نظر آلفا یا بتا تالاسمی و نیاز به تشخیص پیش از تولد حائز اهمیت است.

نتیجه‌گیری

با توجه به نتیجه این مطالعه به نظر می‌رسد به دلیل اهمیت تعیین وضعیت ناقل بودن زوج‌ها از نظر آلفا تالاسمی به خصوص در مواردی که طرف دیگر ناقل قطعی بتا تالاسمی می‌باشد، تعیین توالی ژن آلفا ۱ و ۲ گلوبین برای بررسی جهش‌های غیر حذفی ضروری می‌باشد.

با افزودن روش تعیین توالی مستقیم برای بررسی جهش‌های منطقه‌ای و نیز با استفاده از روش‌های بررسی کمی دوزاژ ژن، تعداد نسخه ژنی یا gene dosage study، Multiple Ligation dependent Real Time PCR و شامل probe Amplification در بررسی بیشتر مواردی که هم چنان ناشناخته می‌مانند، شناخت جهش‌های خونی غیر شایع موارد آلفا تالاسمی تسهیل می‌گردد.

تشکر و قدردانی

بخشی از این تحقیق توسط صندوق حمایت از پژوهشگران، حمایت مالی شده است. بدین‌وسیله تقدیر خود را از همکارانمان در مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی کوثر و بخش پزشکی مولکولی انتیتو پاستور ایران اعلام می‌داریم. هم چنین از همکاران خود در مرآکز بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دلیل معرفی خانواده‌ها تقدیر و تشکر می‌نماییم.

مربط با آلفا تالاسمی را تشکیل می‌داد (۱۱). در حالی که در مطالعه ما فراوانی این جهش بسیار کمتر می‌باشد. این تفاوت می‌تواند احتمالاً ناشی از شیوع بالاتر جهش CD19 در منطقه جنوب کشور باشد. در این مطالعه، جهش فوق در دو فرد از شمال ایران (گیلان) و یک فرد از منطقه مرکزی کشور تشخیص داده شد.

فراوانی آللی جهش cd142 (TAA>CAA) یا هموگلوبین Constant Spring در مطالعه حاضر ۲/۱۴٪ بود. گرشاسی فراوانی این جهش غیر حذفی را در جمعیت مورد مطالعه خود ۰/۲٪ اعلام کرده بود. این فراوانی در مطالعه هادوی ۱۰/۶٪ و تمدنی ۳/۳٪ گزارش گردید که در صورت محاسبه فراوانی آللی جهش در کل جمعیت مورد مطالعه، این میزان در ۲ مقاله اخیر ۵/۸۲٪ و ۱/۷۶٪ خواهد بود (۳، ۵).

حذف ۵ نوکلئوتید از ابتدای ایترون ۱ ژن α_2 (IVS1;5-bp del) از جهش‌های مهم دیگر این ژن است که در ایران نیز گزارش شده است (۲۲).

اساساً، در جمعیت‌های با فراوانی بالای اختلالات هموگلوبین، نوع و فراوانی جهش‌ها می‌تواند بسیار متغیر باشد. افزایش برخی از این جهش‌ها در مناطق به خصوص، به دلیل انتخاب طبیعی آنها در مقاومت نسبت به انگل مalaria (مناطق مalaria خیز)، اتفاق افتاده است. مثال آن مناطقی هستند که ترکیب متفاوتی از چند جهش محدود را که مخصوص آن جمعیت گردیده، بروز می‌دهند. بنابراین، داشتن اطلاعات اولیه از ریشه نژادی یک فرد ناقل، می‌تواند به پیشگویی حضور جهش‌های احتمالی در فرد، کمک فراوان نماید (استراتژی غربالگری اولیه ناقلین). اما در کشورهایی که از تنوع نژادی برخوردارند، این حریه خیلی نمی‌تواند کارآمد باشد.

اگرچه نقص در ژن آلفا گلوبین اغلب به صورت حذف‌های تکی (α/α) و یا دو تایی (α/α) می‌باشد، ولی جهش‌های غیر حذفی شامل جابجایی تک نوکلئوتیدی و حذف، یا دخول یک یا چند نوکلئوتید کوچک نیز با فراوانی کمتر گزارش شده است (۲۱، ۲۳). این مطالعه و نیز

References :

- 1- Comprehensive instruction and educational materials of prevention programme on Major Beta-Thalassaemia (2004); Genetic Office, Ministry of Health and Medical Education of I.R.Iran, Health Deputy Cener for Disease Control.
- 2- Abolghasemi H, Amid A, Zeinali S, Radfar MH, Eshghi P, Rahiminejad MS, et al. Thalassemia in Iran: epidemiology, prevention, and management. *J Pediatr Hematol Oncol* 2007; 29(4): 233-8
- 3- Hadavi V, Jafroodi M, Hafezi-Nejad N, Moghadam S D, Eskandari F, Tarashohi S, et al. Alpha-thalassemia mutations in Gilan Province, North Iran. *Hemoglobin* 2009; 33(3): 235-41.
- 4- Hadavi V, Taromchi AH, Malekpour M, Gholami B, Law HY, Almadani N, et al. Elucidating the Spectrum of α -thalassemia Mutations in Iran. *Haematologica* 2007; 92(7): 992-3.
- 5- Tamaddoni A, Hadavi V, Hafezi Nejad N, Khosh-Ain A, Siami R, Aghai-Meibodi Jl, et al. alph-Thalassemia mutation analyses in Mazandaran province, North Iran. *Hemoglobin* 2009; 33 (2) : 115-23.
- 6- Zandian Kh, Nateghi Jl, Keikhaie B, Pedram M, Hafezi-Nejad N, Hadavi V, et al. alpha-thalassemia mutations in Khuzestan Province, Southwest Iran. *Hemoglobin* 2008; 32(6): 546-52.
- 7- Kiani-Shirazi R, Zainali S, Karimipoor M, Zarbakhsh B, Alibakhshi R. PCR Application In Recognition Of Prevalent Deletion of α Globin Gene In Alpha Thalassemia Carriers. *Tehran University Medical Journal* 2006; 64(2): 95-9. [Article in Farsi].
- 8- Neishabury M, Oberkanins C, Moheb LA, Pourfathollah AA, Kahrizi K, Keyhani E, et al. High prevalence of the -alpha3.7 deletion among thalassemia patients in Iran. *Hemoglobin* 2003; 27(1): 53-5.
- 9- Gohari LH, Petrou M, Felekitis X, Christopoulos G, Kleanthous M. Identification of alpha-thalassemia mutations in Iranian individuals with abnormal hematological indices and normal Hb A2. *Hemoglobin* 2003; 27(2): 129-32.
- 10- Garshasbi M, Oberkanins C, Law HY, Neishabury M, Kariminejad R, Najmabadi H. alpha-globin gene deletion and point mutation analysis among in Iranian patients with microcytic hypochromic anemia. *Haematologica* 2003; 88(10): 1196-7.
- 11- Harteveld CL, Yavarian M, Zorai A, Quakkelaar ED, Van Delft P, Giordano PC. Molecular spectrum of alpha-thalassemia in the Iranian population of Hormozgan: three novel point mutation defects. *Am J Hematol* 2003; 74(2): 99-103.
- 12- Higgs DR, Vickers AOM, Wilkie IM, Pretorius AP, Jarman AP, Weatherall DJ. A review of the molecular genetics of the human α -globin gene cluster. *Blood* 1989; 73(5): 1081-104.
- 13- Chui DH, Waye JS. Hydrops fetalis caused by α -thalassemia: an emerging health care problem. *Blood* 1998; 91(7): 2213-22.
- 14- Miller SA, Dykes DD, Polesky HF. A simple salting out procedure for extracting DNA from human nucleated cells. *Nucleic Acids Res* 1988; 16(3): 1215.
- 15- Chong SS, Boehm CD, Higgs DR, Cutting GR. Single-tube multiplex-PCR screen for common deletional determinants of alpha-thalassemia. *Blood* 2000; 95(1): 360-62.
- 16- Bleible SA, Leonard RJ, Jones-Crawford JL, Kutler A, Hendricks LK. Thalassemia Alpha. Wayne State University, St. John's Hospital and Medical Centers. Article last updated: Sep17, 2007 " [Http://emedicine.medscape.com/article/206397-overview](http://emedicine.medscape.com/article/206397-overview)"
- 17- Chui DH, Fucharoen S, Chan V. Hemoglobin H disease: not necessarily a benign disorder. *Blood* 2003; 101(3): 791-800.
- 18- Wang W, Kham SKY, Yeo GH, Quah TC, Chong SS. Multiplex minisequencing screen for common Southeast Asian and Indian beta-thalassemia mutations. *Clin Chem* 2003; 49(2): 209-18.
- 19- Jia SQ, Li J, Mo QH, Liao C, Li LY, Xu XM. Alpha0 thalassaemia as a result of a novel 11.1 kb deletion eliminating both of the duplicated alpha globin genes. *J Clin Pathol* 2004; 57(2): 164-7.
- 20- Angastiniotis MA, Hadjiminas MG. Prevention of thalassaemia in Cyprus. *Lancet* 1981; 1(8216): 369-71.
- 21- Fei YJ, Oner R, Bozkurt G, Gu LH, Altay C, Gurgey A, et al. Hb H disease caused by homozygosity for the AATAAA->AATAAG mutation in the polyadenylation site of the alpha 2-globin gene: hematological observations. *Acta Haematol* 1992; 88(2): 82-5.
- 22- Puehringer H, Najmabadi H, Law HY, Krugluger W, Viprakasit V, Pissard S, et al. Validation of a reverse-hybridization StripAssay for the simultaneous analysis of common alpha-thalassemia point mutations and deletions. *Clin Chem Lab Med* 2007; 45(5): 605-10.
- 23- Orkin SH, Goff SC, Hechtman RL. Mutation in an intervening sequence splice junction in man. *Proc Natl Acad Sci U S A* 1981; 78(8): 5041-5.

Original Article

Molecular study of alpha-thalassemia mutations in Iranian potential carriers

Zarbakhsh B.¹, Farshadi E.¹, Ariani Kashani A.¹, Karimipoor M.¹, Azarkeivan A.²,
Habibi Pourfatideh R.^{2,3}, Fallah M.S.⁴, Maryami F.¹, Kordafshari A.R.¹,
Kaeini Moghadam Z.¹, Bagherian H.⁴, Zeinali S.^{1,4}

¹Pasteur Institute, Tehran, Iran

²Research Center of Iranian Blood Transfusion Organization, Tehran, Iran

³Gilan Regional Blood Transfusion Center, Rasht, Iran

⁴Kawsar Human Genetic Research Center, Tehran, Iran

Abstract

Background and Objectives

There is a large number of couples who are considered potential carriers of alpha or beta-thalassemia. The exact determination of gene defect for thalassemia carriers is essential for premarital screening genetic counseling. In this study, we conducted a molecular study of those suspected of carrying alpha-thalassemia mutated genes in order to detect potential deletional and non-deletional mutations in the alpha globin gene cluster.

Materials and Methods

In this study, those suspected of having mutation in alpha-globin gene cluster with MCV < 80 fl, MCH < 27 pg, normal serum iron, and HbA₂ were selected from those referred to Pasteur Institute of Iran. Four common deletional mutations and non-deletional mutations were studied using multiplex gap-PCR, ARMS-PCR, and direct sequencing.

Results

One hundred and forty samples with above criteria entered the study with 126 (90%) cases showing at least one mutation. Study of 4 common deletional mutations using multiplex gap-PCR revealed at least one deletion in 99 (70.71%) cases. Non-deletional mutations were found using ARMS-PCR or direct sequencing in 27 (19.28%) cases. Nine different mutations were found in the samples with -α^{3.7} being the most common deletion in 100 (35.71%) alleles out of 280 studied chromosomes followed by -α^{5^{nt}} in 25 (8.93%) alleles as the next most common.

Conclusions

We used direct sequencing to characterize more suspected carriers of alpha thalassemia. However, using other methods like real-time PCR and multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA) for gene dosage study of alpha-globin gene cluster could help find other non-common deletions.

Key words: alpha-Thalassemia, mutation, PCR, Iran

Sci J Iran Blood Transfus Org 2010; 7(2): 70-77

Received: 29 July 2009

Accepted: 26 Apr 2010

Correspondence: Zeinali S., PhD of Human Genetics. Associate Professor of Pasteur Institute and Kawsar Human Genetic Research Center.

P.O.Box: 13185-1667, Tehran, Iran. Tel: (+9821)66480780; Fax : (+9821)66480780

E-mail: zeinali@kawsar.ir