

تأثیر عصاره بخش‌های هوایی گیاه اُرس (*Juniperus excelsa*) بر تکثیر و مرگ سلول‌های سرطانی لوسمی لنفوبلاستیک حاد رده‌های Reh و Nalm-6

مینا درویشی^۱، سمیه اسماعیلی^۲، نسرين دهقان نیری^۳، پرگل مشاتی^۱، احمد قره‌باغیان^۴

چکیده

سابقه و هدف

لوسمی لنفوبلاستیک حاد (ALL)، شایع‌ترین بدخیمی در کودکان است. به دلیل اثرات جانبی فراوان داروهای شیمی‌درمانی، استفاده از ترکیبات طبیعی مورد توجه قرار گرفته است. اُرس یک گیاه دارویی است که اثر مهار عصاره آن بر روی چندین رده سلولی سرطانی گزارش شده است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر کشندگی و آپوپتوتیک عصاره بخش‌های هوایی گیاه اُرس بر رده‌های سلولی ALL (Nalm-6 و Reh) بود.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه بنیادی سلول‌های Nalm-6 و Reh بعد از کشت سلولی با غلظت‌های مختلف عصاره تیمار شده و با آزمون MTT، درصد سلول‌های زنده بعد از ۴۸ و ۷۲ ساعت انکوباسیون بررسی شد. جهت درک مکانیسم مرگ سلولی از آزمون فلوسیتومتری Annexin V-FITC و سنجش فعالیت کاسپاز ۳ استفاده شد. آنالیز آماری داده‌ها با استفاده از آزمون one-way ANOVA و SPSS ۲۳ انجام گرفت.

یافته‌ها

نتایج حاصل از آزمون MTT نشان داد که غلظت‌های ۳، ۴ و ۵ میکروگرم بر میلی‌لیتر عصاره در هر دو رده سلولی، موجب کاهش معنادار درصد سلول‌های زنده می‌شود ($p < 0/001$). هم چنین نتایج حاصل از فلوسیتومتری حاکی از افزایش قابل توجه آپوپتوز در سلول‌های تیمار شده نسبت به گروه کنترل بود ($p < 0/001$). در آزمون سنجش فعالیت کاسپاز ۳ نیز افزایش قابل توجه فعالیت آن در سلول‌های تیمار شده نسبت به گروه کنترل مشاهده شد ($p < 0/05$).

نتیجه‌گیری

با توجه به نتایج، عصاره بخش‌های هوایی گیاه اُرس دارای اثرات کشندگی و آپوپتوتیک بر سلول‌های سرطانی رده Nalm-6 و Reh بودند.

کلمات کلیدی: لوسمی لنفوبلاستیک حاد، جونیپروس اکسلسا، اثر کشندگی، آپوپتوز

تاریخ دریافت: ۹۵/۷/۱۴

تاریخ پذیرش: ۹۵/۸/۱۹

- ۱- دانشجوی کارشناسی ارشد خوندشناسی آزمایشگاهی و بانک خون - دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران - ایران
- ۲- PhD فارماکولوژی - دانشیار مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی - دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران - ایران
- ۳- دانشجوی دکترای پروتئومیکس - دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران - ایران
- ۴- مؤلف مسئول: PhD ایمونوهما‌تولوژی بالینی - استاد دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - مرکز تحقیقات بیماری‌های مادرزادی خونی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - خیابان شریعتی - تهران - ایران - کد پستی: ۱۵۴۶۸-۱۵۵۱۴

مقدمه

لوسمی لنفوبلاستیک حاد (ALL)، با تکثیر و تجمع کلونال سلول‌های بلاست در مغز استخوان و خون محیطی همراه است. این لوسمی در کودکان ۲ الی ۵ سال شایع‌تر است. شیوع این لوسمی در بالغین (بالای ۱۵ سال)، یک سوم شیوع آن در کودکان می‌باشد. دومین شیوع بالای آن در بالغین بالای ۵۰ سال است که با افزایش سن، احتمال بروز آن افزایش می‌یابد (۱). مشتقات صناعی و نیمه صناعی حاصله از گیاهان، از منابع مهم داروهای ضد سرطان هستند (۲). تقریباً ۶۰٪ داروهایی که در بالین به عنوان ضد سرطان مصرف می‌شوند، از منابع طبیعی به دست آمده یا با آن مرتبط هستند. گیاهان مدت زمان زیادی است که در درمان سرطان استفاده می‌شوند (۳). جونیپروس اکسلسا (*Juniperus excelsa*)، یک درخت یا درختچه‌ای همیشه سبز از خانواده Cupressaceae می‌باشد که در کشورهای منطقه بالکان، ترکیه، سوریه، لبنان، گرجستان، ارمنستان، آذربایجان و قسمت شرقی ایران نزدیک ترکمنستان و هم چنین در نواحی شمال شرق سواحل دریای سیاه و دامنه قفقاز وجود دارند (۴). نام‌های محلی این گیاه اُرس، اردوج و آروس می‌باشد (۵). جونیپروس اکسلسا یک گیاه دارویی محسوب می‌شود که در گذشته برای درمان دیس منوره یا قاعدگی دردناک، سرفه، برونشیت و سرماخوردگی، یرقان، سل و تحریک قاعدگی مورد استفاده قرار می‌دادند (۶-۸). این گیاهان به طور سنتی در عربستان در درمان زردی و سل و در ترکیه برای درمان سرفه، برونشیت و هموروئید مورد استفاده قرار گرفته‌اند (۹). هم چنین توسط افراد بومی ایران به عنوان گیاهی با کاربردهای متنوع شناخته شده است و به طور سنتی در درمان بیماری‌های قلبی، عصبی، گوارشی و مجاری ادراری و... کاربرد دارد (۱۰). فعالیت ضد میکروبی ماده مؤثره میوه و برگ‌های این گیاه علیه چندین میکروب شامل باسیلوس سابتیلیس، کاندیدا آلیکنز، استافیلوکوک اورئوس و اشریشیاکلی مورد بررسی قرار گرفته است (۴). هم چنین در مطالعه‌ای نشان داده شده که اجزای این گیاه فعالیت آنتی‌لشمانیایی نیز دارد (۱۱). در فرآیند آپوپتوز کاسپازها نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. کاسپازها، سیستمین پروتئازهایی هستند که به شکل

پروآنزیم وجود دارند و در اثر شکسته شدن فعال می‌شوند (۱۲، ۱۳). دو مسیر جایگزین برای شروع فرآیند آپوپتوز وجود دارد: مسیر خارجی که وابسته به گیرنده‌های مرگ موجود بر سطح سلول است و مسیر داخلی که وابسته به میتوکندری می‌باشد. در هر دو مسیر کاسپازها فعال می‌شوند (۱۴). مسیر خارجی و داخلی به یک مسیر مشترک ختم می‌شوند که با شکستن کاسپاز ۳ آغاز شده و نهایتاً منجر به شکستن DNA، دژنره شدن پروتئین‌های اسکلت سلولی و پروتئین‌های هسته‌ای، شکل‌گیری اجسام آپوپتوتیک، بیان لیگاند برای گیرنده‌های سلول‌های فاگوسیت‌کننده و در آخر جذب توسط سلول‌های فاگوسیت‌کننده منتهی خواهد شد (۱۵). در این مرحله از آپوپتوز، فسفاتیدیل سرین (PS) به سطح خارجی غشای سلول می‌آید. فسفاتیدیل سرین‌ها به طور طبیعی در لایه داخلی یا سیتوپلاسمیک غشای سلول‌های زنده قرار گرفته‌اند (۱۶). انکسین V دارای جایگاه اتصال به فسفاتیدیل سرین است. اخیراً مشخص شده هر نوع سلول دارای مکانیسمی است که باعث ظاهر شدن فسفاتیدیل سرین در سطح سلول می‌شود، که این مکانیسم طی آپوپتوز فعال می‌شود. جهت درک مکانیسم مرگ سلولی از آزمون فلوسیتومتری Annexin V-FITC استفاده می‌شود (۱۷). هم چنین در این مطالعه، بررسی فعالیت کاسپاز ۳ به دلیل اهمیت آن در هر دو مسیر آپوپتوز صورت گرفت. تا به حال در مورد اثرات سایتوتوکسیک و آپوپتوتیک عصاره بخش‌های هوایی گیاه جونیپروس اکسلسا بر رده‌های سلولی لوسمی لنفوبلاستیک حاد گزارشی منتشر نشده است، لذا در این مطالعه بر آن شدیم تا اثر این عصاره را بر سلول‌های سرطانی لنفوبلاستیک حاد شامل Nalm-6 و Reh مورد بررسی قرار دهیم.

مواد و روش‌ها

در یک مطالعه بنیادی، این گیاه از استان کهگیلویه و بویراحمد در جنوب غربی ایران جمع‌آوری شده است. اندام مورد استفاده در عصاره‌گیری، اندام هوایی شامل سرشاخه‌های مخروطدار بوده که در مرحله زایشی جمع‌آوری گردید. ۱۰ گرم از پودر گیاه خشک شده توسط

۱۰۰ میلی لیتر متانل (به نسبت ۱ به ۱۰) با استفاده از روش خیساندن (maceration) به مدت ۲۴ ساعت عصاره گیری شد. عصاره های به دست آمده با استفاده از کاغذ صافی از پودر گیاه جدا شده و سپس با دستگاه روتاری در دمای کمتر از ۴۰ درجه سانتی گراد تغلیظ و در ویال ریخته شد. عصاره تغلیظ شده در زیر هود خشک و تا قبل از بررسی در دمای ۴ درجه سانتی گراد نگهداری شد. تمامی مراحل مربوط به عصاره گیری در مرکز تحقیقات طب سنتی و گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و زیر نظر متخصص فارماکونوزی انجام گرفت. برای آماده سازی عصاره و رساندن آن به غلظت مورد نظر، ابتدا میزان ۱۰۰ میلی گرم عصاره در میکروتیوب با ترازوی دیجیتال وزن شده و سپس در ۱ میلی لیتر DMSO استریل حل شدند (غلظت نهایی استوک اولیه عصاره ۱۰۰ mg/mL بود).

با توجه به رقیق نمودن استوک اولیه عصاره، جهت تهیه غلظت های مورد نیاز برای مطالعه، غلظت نهایی DMSO به کمتر از ۰/۰۱ رسیده و نیازی به کنترل DMSO نبوده است.

کشت سلولی و تیمار سلول ها با عصاره:

رده های سلولی Nalm-6 و Reh از بانک سلولی انستیتو پاستور ایران (تهران، ایران) تهیه شد. در یک مطالعه تجربی، به منظور کشت سلولی ابتدا سلول ها از تانک ازت خارج و یخ زدایی شدند، سپس در محیط کشت RPMI 1640 (جیبکو) حاوی ۱۰٪ FBS و ۱٪ پنی سیلین کشت داده شدند.

فلاسک های کشت در انکوباتور ۳۷ درجه سانتی گراد با ۵٪ CO₂ انکوبه شدند. بعد از این که سلول ها به قدر کافی رشد کردند، ۳ × ۱۰^۵ تا ۳ × ۱۰^۶ سلول در پلیت های ۹۶ خانه با غلظت های مختلف عصاره تیمار و در انکوباتور ۳۷ درجه سانتی گراد با ۵٪ CO₂ به مدت ۴۸ و ۷۲ ساعت انکوبه شدند. غلظت های مختلف عصاره با استفاده از محیط کشت استریل تهیه شدند. همه آزمایش ها به صورت شش تایی و در حداقل سه آزمایش جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند.

آزمون MTT به منظور سنجش فعالیت متابولیک:

پس از تیمار و اتمام زمان انکوباسیون، به هر چاهک ۲۰ میکرولیتر محلول MTT (4,5 dimethyl diphenyl tetrazolium bromid) اضافه نموده و مجدداً به مدت ۲ تا ۴ ساعت در انکوباتور دی اکسید کربن در ۳۷ درجه سانتی گراد قرار داده شدند. سپس پلیت ها با دور ۲۹۰۰ به مدت ۹ دقیقه سانتریفوژ شده و محیط کشت رویی دور ریخته شد. در طی زمان انکوباسیون، MTT توسط سیستم سوکسینات دهیدروناز که یکی از آنزیم های چرخه تنفسی میتوکندری ها است، احیا می شود. احیا و شکسته شدن این حلقه موجب تولید کریستال های آبی رنگ فورمازان می شود. میزان رنگ تولید شده با تعداد سلول هایی که از نظر متابولیک فعال هستند (سلول های زنده) رابطه مستقیم دارد. کریستال های فورمازان در آب غیر محلول بوده و بایستی قبل از رنگ سنجی توسط ماده حلالی نظیر دی متیل سولفوکساید (DMSO) به حالت محلول در آیند. بنابراین بعد از تخلیه محیط کشت، ۱۰۰ میکرولیتر DMSO به هر چاهک اضافه شد. در نهایت جذب نوری چاهک ها توسط دستگاه الیزا ریدر در طول موج ۵۷۰ نانومتر قرائت شده و درصد سلول های زنده با فرمول زیر محاسبه شدند.

$$\text{میانگین جذب نوری سلول های تیمار شده با عصاره در هر غلظت} \times 100 = \left(\frac{\text{میزان سلول های زنده}}{\text{میانگین جذب نوری خانه های حاوی سلول های کنترل}} \right) \times 100$$

آزمون فلوسیتومتری به منظور سنجش میزان آپوپتوز:


ابتدا سلول ها در محیط RPMI حاوی ۱۰٪ FBS در انکوباتور ۳۷ درجه سانتی گراد حاوی ۵٪ گاز CO₂ به منظور دسترسی به جمعیت مورد نظر کشت شدند. طبق دستور کیت (Annexin V Apoptosis Detection Kit FITC، بیوساینس)، برای هر آزمون به ۳ × ۱۰^۵ سلول نیاز است. سلول ها در پلیت ۹۶ خانه با غلظت های مختلف عصاره تیمار شده و به مدت ۴۸ ساعت انکوبه شدند. بعد از انکوباسیون، سلول ها به فالكون منتقل شده و سانتریفوژ شدند و مایع رویی آن دور ریخته شد. ۵۰۰ میکرولیتر از بافر باندکننده به سلول های تیمار شده اضافه شد، سپس به ویال مربوط به انجام فلوسیتومتری منتقل شدند. در نهایت

۰/۰۱ < p و ۰/۰۵ < p نشانگر کاهش معنادار نسبت به کنترل بودند.


یافته‌ها

نتایج آزمون MTT:

برای انجام آزمون MTT، سلول‌های Nalm-6 و Reh با غلظت‌های ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ میکروگرم بر میلی‌لیتر عصاره جونیپروس اکسل‌سا با روشی که قبلاً بیان شد، تیمار شدند. بعد از ۴۸ و ۷۲ ساعت انکوباسیون پلیت‌ها، جذب خانه‌های حاوی سلول‌های تیمار شده با جذب خانه‌های حاوی سلول‌های کنترل مقایسه شده و درصد سلول‌های زنده محاسبه گردید.



نمودار ۱: اثر کشندگی عصاره بخش‌های هوایی گیاه جونیپروس اکسل‌سا بر رده سلولی Nalm-6 با روش MTT



نمودار ۲: اثر کشندگی عصاره بخش‌های هوایی گیاه جونیپروس اکسل‌سا بر رده سلولی Reh با روش MTT


۵ میکرولیتر انکسین ۷ و ۱۶ میکرولیتر PI (Premium Iodide) به ویال اضافه و به مدت ۲۰ دقیقه در تاریکی و در دمای اتاق انکوبه شدند در نهایت ویال‌ها توسط دستگاه فلوسیتومتری خوانده شد.

آزمون بررسی فعالیت کاسپاز ۳ به منظور سنجش میزان آپوپتوز:

برای این آزمایش از کیت سنجش کلرومتریک فعالیت کاسپاز ۳ (آبکام، آمریکا، ab39301) استفاده شد. تعداد سلول مورد نیاز برای هر غلظت طبق دستورالعمل کیت، $10^5 \times 1-5$ می‌باشد. ابتدا سلول‌های کشت داده شده با دوزهای مختلف عصاره جونیپروس اکسل‌سا در پلیت‌های ۱۲ خانه، طبق روشی که قبلاً توضیح داده شد، تیمار شده و پلیت به مدت ۴۸ ساعت در انکوباتور CO_2 دار انکوبه شد. بعد از انکوباسیون، طبق دستورالعمل کیت پروتئین‌های سلول‌ها استخراج شده و به روش BCA protein assay، میزان پروتئین آن‌ها سنجیده شد. غلظت مناسب پروتئین برای هر آزمون در سنجش فعالیت کاسپاز ۳، ۵۰ الی ۲۰۰ میکروگرم به ازای هر ۵۰ میکرولیتر بافر لیز کننده می‌باشد. در ادامه آزمون، فعالیت کاسپاز ۳ همراه با تکرار به صورت دوتایی صورت گرفت. یک چاهک به عنوان background حاوی ۵۰ میکرولیتر Reaction Buffer و در سایر چاهک‌ها، به میزان ۵۰ میکرولیتر از نمونه‌ها اضافه شدند. سپس ۵۰ میکرولیتر از مخلوط 2X Reaction Buffer و DTT و سپس به میزان ۵ میکرولیتر از سویسترا (۴ میلی‌مول DEVD-p-NA) به هر چاهک اضافه کرده و پلیت به مدت ۲۴ ساعت در انکوباتور ۳۷ درجه سانتی‌گراد انکوبه شد. در نهایت جذب نوری چاهک‌ها در طول موج ۴۵۰-۴۰۰ nm خوانده شد.

آزمون‌های آماری:


آنالیز آماری داده‌ها با کمک نرم‌افزار SPSS ۲۳ صورت گرفت. از آزمون one-way ANOVA برای ارزیابی اختلاف آماری بین گروه‌های تیمار شده و کنترل استفاده شد و $p < 0/001$ از لحاظ آماری معنادار تلقی گردید و $p < 0/05$




شکل ۱: بررسی میزان آپوپتوز سلول‌های تیمار شده با عصاره بخش‌های هوایی گیاه جونپروس اکسلسا در رده‌های سلولی Nalm-6 و Reh به روش فلوسیتومتری. در این گراف‌ها ربع سمت چپ پایین- سلول‌های انکسین منفی (سلول‌های زنده)، ربع سمت چپ بالا- سلول‌های انکسین مثبت (آپوپتوز اولیه)، ربع سمت راست پایین- سلول‌های انکسین منفی (سلول‌های نکروتیک) و ربع سمت راست بالا- سلول‌های انکسین مثبت (آپوپتوز تاخیری) می‌باشند.

نتایج حاصل از آزمون MTT نشان داد که افزایش دوز عصاره جونپروس اکسلسا، باعث کاهش فعالیت متابولیکی ناشی از مرگ سلول‌های Nalm-6 و Reh می‌شود. فرآیند کاهش فعالیت متابولیک علاوه بر این که وابسته به غلظت عصاره است، وابسته به زمان نیز می‌باشد. به طوری که بعد از تیمار ۴۸ ساعته با غلظت ۴ µg/mL و در تیمار ۷۲ ساعته، در غلظت ۳ µg/mL، حدوداً ۵۰٪ از سلول‌ها (IC50) در هر دو رده سلولی کشته شدند. همان طور که در نمودارهای ۱ و ۲ نشان داده شده است، در تیمار ۴۸ ساعته، میانگین جذب نوری در غلظت‌های ۳، ۴ و ۵ میکروگرم بر میلی‌لیتر به میزان قابل توجهی با گروه کنترل متفاوت بوده ($p < 0.001$) و در تیمار ۷۲ ساعته علاوه بر غلظت‌های فوق، غلظت ۲ میکروگرم بر میلی‌لیتر نیز اختلاف قابل توجهی نسبت به گروه کنترل داشته است.

نتایج آزمون فلوسیتومتری: برای آزمون فلوسیتومتری، سلول‌های Nalm-6 و Reh با غلظت‌های ۲ و ۳ میکروگرم بر میلی‌لیتر عصاره جونپروس اکسلسا با روشی که قبلاً بیان شد، تیمار شدند. نتایج حاصل از آزمون فلوسیتومتری بعد از تیمار ۴۸ ساعته، نشان‌دهنده افزایش میزان آپوپتوز در سلول‌های تیمار شده با عصاره نسبت به گروه کنترل بود. همان طور که در شکل ۱ و نمودار ۳ نشان داده شده است، میزان آپوپتوز سلول‌ها وابسته به غلظت عصاره بوده و غلظت ۳ میکروگرم بر میلی‌لیتر عصاره در هر دو رده سلولی، باعث



نمودار ۳: نمودار نتایج حاصل از آزمون فلوسیتومتری در سلول Nalm-6 و Reh ($p < 0.01$) ***



نمودار ۴: نمودار فعالیت کاسپاز ۳ در سلول‌های Nalm-6 و Reh. نمودار فوق میزان فعالیت کاسپاز ۳ در سلول‌های Nalm-6 و Reh پس از تیمار ۴۸ ساعته با عصاره گیاه جونیپروس اکسلسا را نشان می‌دهد. بعد از استخراج پروتئین و انجام مراحل مرتبط با کیت فعالیت کاسپاز ۳، OD پلیت بعد از ۲۴ ساعت سنجیده شد ($p < 0.01$ و $p < 0.05$).

گرفت (شکل ۱). همان طور که در شکل ۱ نشان داده شده است، درصد سلول‌های نکروز شده در سلول‌های تیمار شده با عصاره نسبت به گروه‌های کنترل، در هر دو رده

افزایش چشمگیر و معنادار آپوپتوز نسبت به گروه کنترل می‌شود ($p < 0.001$). در این آزمایش هم چنین افتراق سلول‌های آپوپتوز شده از سلول‌های نکروتیک صورت

سلولی اختلاف معناداری نداشته است.

نتایج آزمون فعالیت کاسپاز ۳:

برای این آزمون، سلول‌های Nalm-6 و Reh با غلظت‌های ۲ و ۳ میکروگرم بر میلی‌لیتر عصاره جونیپروس اکسل‌با روشی که قبلاً بیان شد، تیمار شدند. نتایج حاصل از سنجش فعالیت کاسپاز ۳ نشان داد که در هر دو رده سلول Nalm-6 و Reh، تیمار با عصاره جونیپروس اکسل‌با، باعث افزایش فعالیت کاسپاز ۳ نسبت به گروه‌های کنترل می‌شود. در سلول‌های Nalm-6 میانگین جذب نوری در غلظت‌های ۲ و ۳ میکروگرم بر میلی‌لیتر عصاره به میزان زیادی با گروه کنترل متفاوت است ($p < 0.05$). در سلول‌های Reh نیز غلظت‌های ۲ و ۳ میکروگرم بر میلی‌لیتر عصاره دارای اختلاف قابل توجه نسبت به گروه کنترل می‌باشد ($p < 0.01$) (نمودار ۴). داده‌ها در نمودار ۴ به صورت $\text{mean} \pm \text{SD}$ ، حاصل از حداقل سه آزمون جداگانه گزارش شدند.

بحث

نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر اثر مهارى عصاره بخش‌های هوایی گیاه جونیپروس اکسل‌با بر رده‌های سلولی Nalm-6 و Reh می‌باشد. همان‌طور که در نتایج مربوط به آزمون MTT نشان داده شده است، در هر دو رده سلولی، عصاره گیاه جونیپروس اکسل‌با از غلظت ۲ میکروگرم بر میلی‌لیتر به بالا دارای اثر کشندگی قابل توجهی نسبت به گروه‌های کنترل بوده و بیشترین اثر مهارى در تیمار ۷۲ ساعت مشاهده شد. به‌طوری‌که کاهش در میزان سلول‌های زنده، به‌ویژه در غلظت‌های بالاتر مشهود است. در بررسی‌هایی که قبلاً صورت گرفت، اثر مهارى عصاره دانه و شاخه‌های گیاه جونیپروس اکسل‌با بر روی رده‌های سلولی دیگر از جمله HeLa، KB و MDA-MB-468 در غلظت‌های بیشتر از ۵ میکروگرم بر میلی‌لیتر عصاره‌ها نشان داده شده است (۱۸). این در حالی است که در مطالعه حاضر غلظت‌های کمتر از ۵ میکروگرم بر میلی‌لیتر بررسی و اثرات مهارکنندگی مشاهده شده است. هم‌چنین در مطالعه دیگری نیز اثر ضد توموری

عصاره دانه‌های گیاه جونیپروس اکسل‌با بررسی شد که مهار ۸۶ درصدی تومور در مقایسه با داروی کنترل وین کریستین را گزارش نمودند (۱۱). در مطالعه دیگری اثر مهارى ماده مؤثره گیاه جونیپروس اکسل‌با بر رده‌های سلولی CCRF-CEM و CEM-ADR5000 مورد بررسی قرار گرفته و IC_{50} معادل ۴۴-۴۱ میکروگرم بر میلی‌لیتر گزارش شده است (۱۹). در مطالعه اسماعیلی و همکاران، اثر کشندگی عصاره گیاه جونیپروس اکسل‌با بر دیگر سلول‌های سرطانی از جمله HepG-2، MCF-7 و A-549 بررسی و IC_{50} معادل $30 \mu\text{g/mL}$ > گزارش شده است (۲۰).

در مطالعه حاضر نتایج حاصل از آزمون فلوسیتومتری نیز نشان داد که غلظت $3 \mu\text{g/mL}$ عصاره بخش‌های هوایی گیاه جونیپروس اکسل‌با تأثیر بسیار قابل توجهی (۷ الی ۷/۵ برابر نسبت به گروه‌های کنترل) بر روی آپوپتوز هر دو رده سلولی گذاشته است، که این میزان آپوپتوز با کاهش معنادار درصد سلول‌های زنده در آزمون MTT مطابقت دارد. هم‌چنین در این مطالعه میزان فعالیت کاسپاز ۳ نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. افزایش فعالیت کاسپاز ۳ در سلول‌های تیمار شده با عصاره بخش‌های هوایی گیاه جونیپروس اکسل‌با، نسبت به گروه‌های کنترل نیز حاکی از افزایش القای فرآیند آپوپتوز در هر دو رده سلولی مورد مطالعه می‌باشد. همان‌طور که در نمودار ۴ نشان داده شده است، کاسپاز ۳ در سلول‌های تیمار شده با عصاره، فعالیت بیشتری نسبت به گروه‌های کنترل داشته است. به‌طوری‌که در هر دو رده سلولی، در غلظت ۲ میکروگرم بر میلی‌لیتر افزایش تقریباً ۲/۲ برابری و در غلظت ۳ میکروگرم بر میلی‌لیتر افزایش ۲/۶ برابری فعالیت کاسپاز نسبت به گروه کنترل مشاهده شد.

در مطالعه اُچ و همکاران، گونه‌های جونیپروس به عنوان منبعی جایگزین برای ترکیبات پودوفیلوتوکسین (PDP) و دثوکسی پودوفیلوتوکسین (do-PDP) در نظر گرفته شدند و اثر کشندگی PDP و عصاره اتانولی برگ‌های گونه‌های جونیپروس علیه چندین رده سلولی سرطانی هم‌چون CCRF-CEM، CEM-C1 و J45.01 ارزیابی شد. نتایج این مطالعه ارتباط احتمالی بین میزان

رده‌های سلولی لوسمی لنفوبلاستیک حاد نشان داده شده است. لذا می‌توان عصاره این گیاه را به عنوان ماده‌ای با اثرات کشندگی بر روی رده‌های Nalm-6 و Reh پیشنهاد کرد. لازم است تحقیقات بیشتری در زمینه شناخت مکانیسم سلولی و مولکولی این عصاره بر روی رده‌های سلولی فوق صورت پذیرد، هم چنین این عصاره می‌تواند به عنوان جایگزین بالقوه در مطالعه‌های مرتبط با یافتن داروهای جدید در درمان بیماری لوسمی لنفوبلاستیک حاد مورد استفاده قرار گیرد.

PDP و اثر کشندگی عصاره اتانولی برگ‌های جونیپروس را نشان داده است و محدوده IC50 نیز از ۰/۳ الی ۵/۴ میکروگرم بر میلی‌لیتر گزارش شده است (۲۱). عصاره الکلی بخش‌های هوایی گیاه جونیپروس اکسلسا نیز می‌تواند هم چون سایر گونه‌های جونیپروس به عنوان منبعی از PDP و dO-PDP بوده و اثرات کشندگی عصاره این گیاه ناشی از این ترکیبات باشد.

نتیجه‌گیری

در این مطالعه برای اولین بار اثر کشندگی و آپوپتوتیک عصاره بخش‌های هوایی گیاه جونیپروس اکسلسا بر روی

References:

- Harrison CJ. Acute lymphoblastic leukaemia. Best Practice & Research Clinical Haematology. 2001;14(3):593-607.
- de Mesquita ML, de Paula JE, Pessoa C, de Moraes MO, Costa-Lotufo LV, Grougnet R, et al. Cytotoxic activity of Brazilian Cerrado plants used in traditional medicine against cancer cell lines. Journal of ethnopharmacology. 2009;123(3):439-45.
- Cragg GM, Newman DJ. Antineoplastic agents from natural sources: achievements and future directions. Expert Opinion on Investigational Drugs. 2000;9(12):2783-2797.
- Asili J, Emami S, Rahimizadeh M, Fazly-Bazzaz B, Hassanzadeh M. Chemical and antimicrobial studies of *Juniperus excelsa* subsp. *excelsa* and *Juniperus excelsa* subsp. *polycarpus* essential oils. Journal of Essential Oil Bearing Plants. 2008;1(3):292-302.
- Mozaffarian V. A dictionary of Iranian plant names: Latin, English, Persian: Farhang Mo'aser; 1996.
- Fujita T, Sezik E, Tabata M, Yesilada E, Honda G, Takeda Y, et al. Traditional medicine in Turkey VII. Folk medicine in middle and west Black Sea regions. Economic Botany. 1995;49(4):406-22.
- Muhammad I, Mossa J, El- Feraly F. Antibacterial diterpenes from the leaves and seeds of *Juniperus excelsa* M. Bieb. Phytotherapy Research. 1992;6(5):261-4.
- Yeşilada E, Honda G, Sezik E, Tabata M, Fujita T, Tanaka T, et al. Traditional medicine in Turkey. V. Folk medicine in the inner Taurus Mountains. Journal of ethnopharmacology. 1995;46(3):133-52.
- Topçu G, Gören AC, Bilsel G, Bilsel M, Çakmak O, Schilling J, et al. Cytotoxic Activity and Essential Oil Composition of Leaves and Berries of *Juniperus excelsa*. Pharmaceutical biology. 2005;43(2):125-8.
- Pirani A, Moazzeni H, Mirinejad S, Naghibi F, Mosaddegh M. Ethnobotany of *Juniperus excelsa* M. Bieb.(Cupressaceae) in Iran. Ethnobotany Research and Applications. 2011;9:335-41.
- Nabi S, Ahmed N, Khan MJ, Bazai Z, Yasinza M, Al-Kahraman Y. In vitro antileishmanial, antitumor activities and phytochemical studies of methanolic extract and its fractions of *Juniperus excelsa* berries. World Applied Sciences Journal. 2012;19(10):1495-500.
- Martin SJ, Green DR. Protease activation during apoptosis: death by a thousand cuts? Cell. 1995;82(3):349-52.
- Thornberry NA, Lazebnik Y. Caspases: enemies within. Science. 1998;281(5381):1312-6.
- Igney FH, Krammer PH. Death and anti-death: tumour resistance to apoptosis. Nature Reviews Cancer. 2002;2(4):277-88.
- Martinvalet D, Zhu P, Lieberman J. Granzyme A induces caspase-independent mitochondrial damage, a required first step for apoptosis. Immunity. 2005;22(3):355-70.
- Arur S, Uche UE, Rezaul K, Fong M, Scranton V, Cowan AE, et al. Annexin I is an endogenous ligand that mediates apoptotic cell engulfment. Developmental cell. 2003;4(4):587-98.
- Zhang G, Gurtu V, Kain SR, Yan G. Early detection of apoptosis using a fluorescent conjugate of annexin V. Biotechniques. 1997;23(3):525-31.
- Sadeghi-aliabadi H, Emami A, Sadeghi B, Jafarian A. In vitro cytotoxicity of two subspecies of *Juniperus excelsa* on cancer cells. Iranian Journal of Basic Medical Sciences. 2009;11(4):250-3.
- Saab AM, Guerrini A, Sacchetti G, Maietti S, Zeino M, Arend J, et al. Phytochemical Analysis and Cytotoxicity Towards Multidrug-Resistant Leukemia Cells of Essential Oils De-rived from Lebanese Medicinal

- Plants12-20.
- 20- Esmaili S, Hamzeloo-Moghadam M, Ghaffari S, Mosaddegh M. Cytotoxic activity screening of some medicinal plants from south of Iran. *Research Journal of Pharmacognosy*. 2014;1(4):19-25.
- 21- Och M, Och A, Cieśła Ł, Kubrak T, Pecio Ł, Stochmal A, et al. Study of cytotoxic activity, podophyllotoxin, and deoxypodophyllotoxin content in selected *Juniperus* species cultivated in Poland. *Pharmaceutical biology*. 2015;53(6):831-7.

Original Article

The effect of extract from aerial parts of *Juniperus excelsa* plant on proliferation and apoptosis of acute lymphoblastic leukemia cell lines, Nalm-6 and Reh

Darvishi M.¹, Esmaeili S.², Dehghan-Nayeri N.¹, Mashati P.¹, Gharehbaghian A.^{1,3}

¹School of Allied Medical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

²Traditional Medicine and Materia Medica Research Center, School of traditional medicines, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

³Pediatric congenital hematologic disorders research center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Abstract

Background and Objectives

Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is the most common childhood malignancy. The side effects of chemotherapeutic drugs have primarily lead to the increased use of natural products for cancer treatment. *Juniperus excelsa*, a medicinal herb, was reported to show antiproliferative effects on various cancer cells. In this study, cytotoxic and apoptotic effects of extract from aerial parts of *Juniperus excelsa* plant were investigated on acute lymphoblastic leukemia cell lines, Nalm-6 and Reh.

Materials and Methods

In this basic research, Nalm-6 and Reh were cultured and then they were treated with various concentrations of *J. excelsa* extract for 48 and 72 h and then the cell viability was evaluated by using MTT assay. Apoptosis also was assessed by caspase 3 activity assay and flow cytometry following Annexin V and Propidium iodide staining. Statistical analysis was assessed by one-way ANOVA test and SPSS 23.

Results

MTT assay results show that *J. excelsa* extract concentrations of 3, 4 and 5 µg/ml significantly reduce percentage of alive cells ($p < 0.001$). Flow cytometry results also show that *J. excelsa* extract significantly increase percentage of apoptotic cells compared with control groups ($p < 0.001$). Caspase 3 activity assay results show that caspase 3 activity was significantly increased in treated cells ($p < 0.05$).

Conclusions

Our study shows that extract from aerial parts of *J. excelsa* has cytotoxic and apoptotic effects on Nalm-6 and Reh cells.

Key words: Acute lymphoblastic leukemia, *Juniperus excelsa*, cytotoxicity, Apoptosis

Received: 5 Oct 2016

Accepted: 9 Nov 2016

Correspondence: Gharehbaghian A., PhD in Clinical Immunohematology. School of Allied Medical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Pediatric congenital hematologic disorders research center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences.

P.O.Box: 15468-15514, Tehran, Iran. Tel: (+9821) 22721150; Fax: (+9821) 22731999

E-mail: gharehbaghian@sbmu.ac.ir