

تأثیر حساسیت‌زدایی پلاکت‌ها بر مقادیر باقیمانده تحریک‌پذیری در پلاکت‌های افراد مبتلا به دیابت ملیتوس نوع II

راضیه محمودیان^۱، مرتضی سلیمیان^۲، محسن حمیدپور^۳، احمد قره‌باغیان^۴

چکیده

سابقه و هدف

آترواسکلروزیس، از مهم‌ترین وقایع ترومبوتیک در دیابت ملیتوس نوع II است. هیپرگلیسمی مزمن یک فاکتور اصلی برای فعال شدن پلاکت‌ها در این بیماران می‌باشد. پدیده حساسیت‌زدایی در پلاکت‌ها، پروسه‌ای فیزیولوژیک است که نقش مهمی در خاموش کردن مسیرهای انتقال سیگنال در پاسخ به آگونیست دارد. در این پژوهش به بررسی این پدیده در پلاکت‌ها در دیابت پرداخته شد.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه بنیادی - کاربردی، ۴۰ بیمار دیابت ملیتوس نوع II و ۳۵ نفر از افراد داوطلب سالم به عنوان کنترل، انتخاب شدند. پس از جمع‌آوری نمونه‌های سیراته و جدا کردن PRP، حساسیت‌زدایی با دوز پایین ADP انجام شد. میزان بیان مارکر CD62P و میکروپارتیکل‌های CD41⁺-Annexin-V⁺ با استفاده از فلوسیتومتری ارزیابی شد. نتایج داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آنوا و t-test تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها

نتایج نشان داد پلاکت‌های دیابتیک در حالت Baseline نسبت به افراد سالم، CD62P بالاتری بیان می‌کنند. هم‌چنین در پلاکت‌هایی که حساسیت‌زدایی شدند، میزان بیان CD62P کمتر و میزان تشکیل میکروپارتیکل بیشتری داشتند ($p=0/003$). میزان شمارش میکروپارتیکل‌های پلاکتی در مورد پلاکت‌های دیابتی بالاتر بود ($p=0/004$ ، $SD: \pm 74/52$).

نتیجه‌گیری

پلاکت‌ها در شرایط تیمار خفیف آگونیستی، با وجود بیان CD62P بالا، تحریک‌پذیری پایینی به ADP دارند که ممکن است ناشی از پدیده حساسیت‌زدایی باشد که به پلاکت‌ها در سازگاری با محیط متابولیک خود کمک می‌کند. هم‌چنین پلاکت‌ها تحت تأثیر این پدیده مستعد تولید میکروپارتیکل‌های پلاکتی بیشتری می‌شوند که می‌تواند در عوارض ترومبوتیک دیابت نقش داشته باشد.

کلمات کلیدی: ADP، پلاکت‌ها، دیابت قندی

تاریخ دریافت: ۹۶/۳/۳۱

تاریخ پذیرش: ۹۶/۴/۱۳

۱- کارشناس ارشد هماتولوژی و بانک خون - دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران - ایران

۲- PhD هماتولوژی و بانک خون - دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان - کاشان - ایران

۳- مؤلف مسئول: PhD خون‌شناسی و بانک خون - دانشیار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - مرکز تحقیقات سلول‌های بنیادی خونساز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران - ایران - کد پستی: ۱۹۷۱۶۵۳۳۸۳

۴- PhD ایمونوهماولوژی بالینی - استاد دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - مرکز تحقیقات بیماری‌های مادرزادی خونی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران - ایران

مقدمه

دیابت، از گروه بیماری‌های متابولیک است که با هایپرگلیسمی شناخته می‌شود و ناشی از اختلال در ترشح انسولین، عملکرد انسولین یا هر دو می‌باشد (۱). نوع II دیابت قندی، عامل بیش از ۸۰٪ موارد دیابت ملیتوس است و در اثر تعامل بین فاکتورهای محیطی و وراثت شکل می‌گیرد (۲). افزایش خطر ابتلا به آترواسکلروزیس از مهم‌ترین وقایع ترومبوتیک در بیماران دیابت ملیتوس نوع II می‌باشد (۳). هایپرگلیسمی به تنهایی تعریف دیابت نیست اما به عنوان یک فاکتور مستقل و مهم در ایجاد حالت پروترومبوتیک در بیماران دیابت ملیتوس نوع II نقش دارد (۴، ۵). فاکتورهای متعددی در ایجاد شرایط پروترومبوتیک در این بیماران تاثیر دارند (۶، ۷). تولید میکروپارتیکل‌های پلاکتی در این شرایط بسیار حائز اهمیت است (۸). مکانیسم‌هایی که باعث ایجاد پلاکت‌های هایپراکتیو در این بیماران می‌شوند شامل: ۱- هایپرگلیسمی، ۲- کمبود انسولین و مقاومت به انسولین، ۳- شرایط متابولیک مرتبط با دیابت مانند چاقی، دیس لیپیدمیا و افزایش التهاب سیستمیک (۹). میکروپارتیکل‌های پلاکتی (PMPs)، قطعات ۱-۰/۱ میکرونی هستند که از غشای پلاکت‌های فعال شده یا تحت استرس یا پلاکت‌های در حال آپوپتوز با عمل ریزش (shedding) جدا می‌شوند. آن‌ها غشای پلاسمایی فسفولیپیدی دارند و انواع رسپتورهای عملکردی را از پلاکت‌ها به ارث می‌برند (۱۰). هم چنین می‌توانند همانند پلاکت در هموستاز خون، ترومبوز، سرطان و التهاب نقش ایفا کنند (۱۱). مسیر وابسته به TF و میکروپارتیکل‌ها به نظر نقش کلیدی در ترومبوفیلی دیابتی و عوارض قلبی - عروقی دارد (۱۲).

حساسیت‌زدایی در پلاکت‌ها پروسه‌ای پیچیده و حساس است که نقش مهمی در خاموش کردن مسیرهای انتقال سیگنال در پلاکت‌ها ایفا می‌کند و به سلول اجازه می‌دهد با تغییرات محیطی سازگار شود (۱۳). در پلاکت‌های هایپراکتیو، رها شدن مداوم و اتوکراین ADP از پلاکت‌های فعال شده، منجر به حساسیت‌زدایی و کاهش حساسیت پلاکت‌ها به آگونیست ADP می‌شود (۱۴). هم چنین ممکن است این پدیده، در اثر عوارض جانبی ناشی

از درمان طولانی مدت با داروهایی باشد که به عنوان آگونیست رسپتورها عمل می‌کنند (۱۶، ۱۵). آنتی‌ژن سطحی ATP/CD39 دی فسفوهیدرولاز سطح عروق سالم، مانع از فعال شدن پلاکت‌ها در شرایط طبیعی می‌شود و بنابراین در شرایط مختلف آسیب عروقی و اختلال در عملکرد عروق مانند بیماری دیابت، عملکرد این پروتئین مهار و سرکوب می‌شود و بنابراین فعال شدن پلاکت‌ها اتفاق می‌افتد (۱۷). ADP بیان دو دسته از رسپتورهای وابسته به G پروتئین‌ها را فعال می‌کند: P2Y1 و P2Y12. در پدیده حساسیت‌زدایی این دو رسپتور در پلاکت‌ها نقش دارند و در اثر تماس طولانی مدت پلاکت‌ها با ADP، حساسیت‌زدایی اتفاق می‌افتد. مکانیسم حساسیت‌زدایی مکانیسمی پیچیده است و شامل فسفریلاسیون رسپتور، جدا شدن از G پروتئین‌ها، داخل غشایی شدن (اینترنالیزه شدن) آن‌ها توسط مکانیسم‌های وابسته به کیناز و نهایتاً مهار داخل سلولی می‌شود (۱۸). در این مطالعه سعی شده با تیمار خفیف آگونیستی پلاکت‌ها، به بررسی این پدیده در پلاکت‌های بیماران دیابتی پرداخته شود. رفتار پلاکت‌ها در این مطالعه بر اساس بیان مارکر CD62P که مارکر فعال شدن پلاکت است، بررسی می‌شود. از آن جایی که میکروپارتیکل‌های پلاکتی در بروز عوارض دیابت نقش مهم و قابل توجهی دارند، در این مطالعه میزان تشکیل میکروپارتیکل‌های پلاکتی $CD41^{+}$ -Annexin- V^{+} نیز بررسی شده است.

مواد و روش‌ها

جامعه مورد نظر در این مطالعه بنیادی - کاربردی از ۴۰ نفر از بیماران دیابتی که به آزمایشگاه رفرانس دانشگاه علوم پزشکی کاشان مراجعه داشتند و ۳۵ نفر از افراد سالم داوطلب انتخاب شد. افراد کنترل از بین مراجعه‌کنندگان به آزمایشگاه انتخاب شدند و افراد غیر دیابتی، غیر سیگاری، بدون سابقه مصرف مزمن دارویی و بدون سابقه بیماری‌های ترومبوتیک بودند. شرط ورود به این مطالعه برای بیماران و افراد سالم ناشتا بودن و عدم مصرف داروهای آنتی پلاکتی بود که از افراد قبل از نمونه‌گیری سؤال پرسیده شد. هم چنین به منظور رعایت قوانین اخلاق

از تمام شرکت کنندگان در پژوهش رضایت نامه کتبی گرفته شد. هم چنین نامه و مجوز کد اخلاق پزشکی به شماره IR.SBMU.RETECH.REC.1395.257 از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دریافت شد.

جمع آوری نمونه ها و آماده سازی PRP:

نمونه ها شامل ۵ میلی لیتر از خون کامل در ضد انعقاد سیترات سدیم بود. پس از نمونه گیری، PRP توسط سانتریفیوژ با دور آهسته (RCT ۲/۰) و به مدت ۱۰ دقیقه جدا شد. سپس PRP با پارافرمالدئید (PFA) ۴٪ فیکس شد.

تیمار پلاکت ها با دوز پایین و بالای ADP (Mild Agonist Stimulation Protocol):

تیمار خفیف آگونیستی با دوز پایین ADP انجام شد. به منظور القای تیمار خفیف آگونیستی در پلاکت های موجود در نمونه های PRP، PRP با غلظت پایین ADP (۱ میکرومولار) و به مدت یک ساعت تیمار شد. تیمار پلاکت ها با اضافه کردن پارافرمالدئید (PFA) با غلظت نهایی ۱٪ متوقف گردید. پس از گذشت یک ساعت و تحریک پلاکت ها با دوز پایین ADP، پلاکت ها در معرض ADP با غلظت بالا (۱۰ میکرومولار) و به مدت ۱۰ دقیقه تیمار شدند. این پروسه منجر به حساسیت زدایی پلاکت ها به ADP گردید که با بررسی های فلوسیتومتری تایید شد. به منظور بررسی اثر هر کدام از غلظت های ADP بر پلاکت ها و مقایسه پلاکت های دو گروه، برای هر نمونه PRP، ۴ لوله فلوسیتومتری در نظر گرفته شد.

بررسی های فلوسیتومتری:

آنالیز نمونه ها با استفاده از دستگاه فلوسیتومتری مدل (پارتنر - آلمان، CyFlow®Space) انجام شد. برای هر نمونه PRP، ۴ لوله در نظر گرفته شد. لوله اول حاوی پلاکت های در حال استراحت (Baseline) و بدون اضافه کردن ADP بود. لوله دوم شامل پلاکت های تیمار شده تنها با غلظت پایین ADP (Low) به مدت انکوباسیون یک ساعت بود و لوله سوم حاوی پلاکت های تیمار شده با ابتدا

دوز پایین ADP و انکوباسیون یک ساعته و سپس تیمار شده با دوز بالای ADP (Low +High ADP) و انکوباسیون ۱۰ دقیقه بود. لوله چهارم حاوی پلاکت هایی بود که تنها در معرض غلظت بالای ADP (High ADP) به مدت ۱۰ دقیقه قرار گرفته بودند. سنجش فلوسیتومتری برای هر مرحله در دو لوله مجزا یکی برای انکوباسیون با آنتی بادی اختصاصی CD62P که با RPI کونژوگه (انگلیس، ABCAM) شده بود و لوله دیگر حاوی آنتی بادی اختصاصی CD41 کونژوگه شده با RPI (آلمان، داکو) و آنتی بادی اختصاصی Annexin-V کونژوگه شده با FITC (ترویزن، آمریکا) انجام شد. انکوباسیون نمونه ها با آنتی بادی ها به مدت یک ساعت و در دمای محیط با شیکینگ ملایم صورت گرفت. میزان بیان CD62P و مقدار میکروپارتیکل های CD41⁺-Annexin-V⁺ در هر لوله سنجش شد. میزان بیان CD62P پس از گیت بندی پلاکت ها در نمودار FSC در برابر SCC، به صورت نمودار هیستوگرام در کانال FL2 (آنتی بادی علیه CD62P) بررسی شد. در هر ران فلوسیتومتری از ایزوتایپ کنترل استفاده شد. به منظور گیت بندی میکروپارتیکل های پلاکتی، در مرحله اول در نمودار FSC در برابر SCC، میکروپارتیکل ها به صورت ذرات کمتر از یک میکرون گیت بندی شد و سپس با توجه به کانال FL1 (آنتی بادی علیه Annexin-V) و FL2 (آنتی بادی علیه CD41)، میکروپارتیکل ها مشخص شدند. میزان بیان CD62P به صورت درصد و میزان شمارش میکروپارتیکل های پلاکتی به صورت تعداد در میکرولیتر گزارش شد. داده های حاصل از بررسی های فلوسایتومتری توسط نرم افزار فلو جو (FlowJo 7.6.2، Engine 2.97000. OS version: Windows 7) تجزیه و تحلیل شدند.

آنالیزهای آماری:

به منظور مقایسه نتایج حاصل از فلوسایتومتری در هر دو گروه کنترل و بیمار از روش های آماری One-way ANOVA و t test استفاده شد. هم چنین نمودارها با استفاده از نرم افزار SPSS ۱۶ رسم، مقدار p value برای میزان بین CD62P مساوی ۰/۰۰۳ و میزان شمارش


میکروپارتیکل‌های پلاکتی مساوی ۰/۰۰۴ محاسبه گردید.

یافته‌ها

بررسی‌های فلوسایتومتری نشان داد پلاکت‌های بیماران دیابتی در مرحله Baseline بیان بالاتری از CD62P را دارا هستند و این پلاکت‌ها حتی بدون حضور آگونیست ADP، سطح بالاتری از CD62P را بیان می‌کنند (شکل ۱). در لوله‌های دوم تا چهارم مربوط به PRP، این افزایش بیان CD62P در بیماران دیابتی نسبت به افراد سالم دیده شد که به علت پره اکتیو بودن پلاکت‌ها در مرحله Baseline این تفاوت وجود داشت (نمودار ۱). هم‌چنین از مقایسه لوله‌های High Dose با لوله‌های High+Low Dose می‌توان نتیجه گرفت تیمار خفیف آگونیستی منجر به کاهش Induction CD62P و کاهش Reactivity پلاکت‌ها می‌شود که این کاهش بیان CD62P ممکن است ناشی از پدیده Desensitization باشد که در اثر تیمار خفیف آگونیستی اتفاق افتاده است (نمودار ۱). این پدیده نقش مهمی در خاموش کردن مسیرهای انتقال سیگنال در پلاکت‌ها ایفا می‌کند. این کاهش تحریک‌پذیری پلاکت‌ها در برابر تیمار


خفیف آگونیستی در هر دو گروه پلاکت‌های دیابتی و کنترل دیده شد اما در مورد پلاکت‌های دیابتی میزان کاهش بیان CD62P بیشتر بود. هم‌چنین میزان حساسیت و تحریک‌پذیری پلاکت‌ها نسبت به ADP محاسبه و به صورت افزایش یافته (Fold) گزارش گردید. این میزان حساسیت به ADP از طریق تقسیم میزان بیان CD62P در هر مرحله به میزان بیان CD62P در مرحله Baseline محاسبه شد و نمودار رسم گردید (نمودار ۲). حساسیت و تحریک‌پذیری پلاکت‌ها به ADP در نمونه‌های دیابتی کمتر و در نمونه‌های طبیعی بیشتر است. این بدین معنی است که هر چه پلاکت در فاز استراحت باشد، تحریک‌پذیری بیشتری با ADP دارد. از طرف دیگر تیمار خفیف آگونیستی پلاکت‌ها که ممکن است موجب Desensitization پلاکت‌ها گردد، منجر به کاهش تحریک‌پذیری پلاکت‌ها به ADP شد.

پس از بررسی میزان بیان CD62P در هر لوله، شمارش میکروپارتیکل‌های پلاکتی $CD41^+$ - Annexin-V نیز جداگانه در هر لوله انجام گرفت (نمودار ۳ و شکل ۲).




شکل ۱: میزان بیان CD62P در نمودارهای هیستوگرام در مراحل مختلف تیمار آگونیستی در نمونه PRP افراد سالم و دیابتی. نمودار A و D مربوط به ایزوتایپ کنترل هستند. نمودار B مربوط به مرحله Low+High ADP در نمونه کنترل و نمودار C مربوط به مرحله High ADP در نمونه کنترل. نمودار E مربوط به مرحله Low+High ADP در نمونه دیابتی و نمودار F مربوط به مرحله High ADP در نمونه دیابتی.

درصد بیان CD62P



نمودار ۱: میزان بروز CD62P در مرحله Baseline و سایر مراحل تیمار آگونیستی
 $p = 0.004^{***}$ نشان‌دهنده وجود تغییرات معنادار در مقایسه با گروه غیر دیابتی است.

حساسیت به ADP (Fold)



نمودار ۲: میزان حساسیت پلاکت‌های دیابتی و طبیعی به آگونیست ADP در لوله‌های مختلف
 $p = 0.003^{***}$ نشان‌دهنده وجود تغییرات معنادار در مقایسه با گروه غیر دیابتی است.


پلاکت‌ها در طول فرآیند نمونه‌گیری و مراحل آماده‌سازی است. اما یافته قابل توجه در مورد میکروپارتیکل‌ها این بود که بیشترین میزان تشکیل میکروپارتیکل‌های پلاکتی در لوله Low ADP + High بود و نه High ADP. بر خلاف انتظار، پلاکت‌هایی که با دوز پایین ADP، تیمار

میزان شمارش میکروپارتیکل‌های پلاکتی در هر چهار لوله در مورد پلاکت‌های دیابتی بالاتر بود و تشکیل میکروپارتیکل‌ها در این بیماران نسبت به افراد سالم افزایش بیشتری نشان داد. در نمونه پلاکت‌های Baseline نیز، میکروپارتیکل‌ها تشکیل شدند که ناشی از فعال شدن


در معرض تیمار خفیف آگونیستی قرار گرفته بودند و سپس با دوز بالای ADP تیمار شدند، علی‌رغم این که CD62P Induction پایین‌تری داشتند اما مستعد تولید میکروپارتیکل‌های پلاکتی بیشتری بودند.

شدند و پس از آن در معرض دوز بالای ADP قرار گرفتند، میزان تشکیل میکروپارتیکل بیشتری نسبت به پلاکت‌هایی داشتند که در معرض فقط تیمار با غلظت بالای ADP قرار گرفتند. بنابراین پلاکت‌هایی که در ابتدا

شمارش میکروپارتیکل‌ها mL



نمودار ۳: میزان شمارش میکروپارتیکل‌های پلاکتی در مراحل مختلف تیمار آگونیستی
 *** $p = 0.004$ نشان‌دهنده وجود تغییرات معنادار در مقایسه با گروه غیر دیابتی است.



شکل ۲: مراحل گیت‌بندی میکروپارتیکل‌های پلاکتی. در مرحله اول در نمودار FSC در برابر SSC، میکروپارتیکل‌ها به صورت Event های کمتر از یک میکرون گیت‌بندی می‌شوند (سمت چپ). سپس با توجه با کانال FL1 (آنتی‌بادی علیه Annexin-V) و FL2 (آنتی‌بادی علیه CD41) میکروپارتیکل‌ها مشخص می‌شوند.

بحث

با توجه به داده‌های حاصل از فلوسایتومتری می‌توان گفت پلاکت‌ها در مرحله Baseline و بدون تیمار با آگونیست در بیماران دیابتی، میزان CD62P بالاتری را بیان می‌کنند و از همان ابتدا پره اکتیو هستند که این وضعیت پلاکت‌ها به محیط متابولیکی موجود در بیماران دیابتی مربوط است. پلاکت‌ها به تغییرات محیطی بسیار حساسند و پاسخ می‌دهند. میزان غلظت گلوکز درون پلاکت‌ها بیانگر مقدار غلظت گلوکز خارج سلولی است، چرا که گلوکز برای ورود به پلاکت وابسته به انسولین نیست (۱۹-۲۱). هایپرگلیسمی مزمن و طولانی مدت امروزه به صورت مشخص یک فاکتور اصلی برای فعال شدن پلاکت‌ها و ایجاد پلاکت‌های هایپراکتیو در بیماران دیابتی شناخته شده است (۲۲-۲۴). تیمار پلاکت‌ها با مقادیر خفیف آگونیست ADP در این مطالعه، منجر به کاهش القای بیان CD62P و کاهش Reactivity در پلاکت‌های دیابتی و کنترل می‌شود و ممکن است ناشی از پدیده Desensitization باشد. میزان بیان CD62P در لوله‌ای که تحت تیمار خفیف آگونیستی و سپس دوز بالای ADP قرار می‌گیرد نسبت به لوله تیمار شده، تنها با غلظت بالای ADP کمتر است و می‌توان نتیجه گرفت پلاکت‌ها تحت اثر پدیده Desensitization دچار کاهش پاسخ به آگونیست می‌شوند و این پدیده می‌تواند به پلاکت‌هایی که در محیط متابولیک دیابت، دائماً در معرض آگونیست قرار می‌گیرند کمک کند (۲۵). این پدیده در پلاکت‌های دیابتیک بیشتر است و منجر به کاهش بیشتر بیان CD62P می‌شود. پلاکت‌ها در محیط متابولیک دیابت دائماً در معرض ADP تولید شده توسط پلاکت‌هایی هستند که در این محیط و تحت هایپرگلیسمی فعال شده‌اند. بنابراین بر اساس یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت این پدیده در کاهش فعال شدن پلاکت‌ها در پاسخ به ADP مؤثر است. پلاکت‌ها در بیماران دیابتیک پره اکتیو هستند و تحریک‌پذیری کمتری هم نسبت به ADP چه در دوز پایین و چه در دوز بالا نشان می‌دهند. این کاهش حساسیت و تحریک‌پذیری پلاکت‌های دیابتیک ممکن است به این علت باشد که Desensitization پلاکت‌های دیابتی در

عروق دیابتی در تحریک مداوم با ADP اتفاق افتاده و منجر به کاهش پاسخ پلاکت‌ها به ADP می‌شود. این در حالی است که در تمام مراحل تیمار آگونیستی، میزان حساسیت و تحریک‌پذیری پلاکت‌های افراد غیر دیابتیک به ADP بیشتر است و میزان CD62P بالاتری را بیان می‌کنند. هم چنین تیمار خفیف آگونیستی در پلاکت‌ها (در هر دو گروه) منجر به کاهش تحریک‌پذیری پلاکت‌ها به ADP می‌شود. در مورد میکروپارتیکل‌های پلاکتی یافته‌ها نشان می‌دهد چنانچه پلاکت‌هایی که در معرض تیمار خفیف آگونیستی در شرایط عروقی دیابتیک Desensitized شدند، اگر در معرض دوز بالای ADP مثلاً تشکیل یک لخته ترومبوتیک قرار بگیرند میزان میکروپارتیکل بیشتری تولید می‌کنند. تولید زیاد و سیستماتیک میکروپارتیکل‌های پلاکتی، یک مدیاتور پیش التهابی و فاکتور پاتولوژیکی محسوب می‌شود (۲۶). هایپرگلیسمی مزمن و پلاکت‌های هایپراکتیو با بیان بالای CD62P در بیماران دیابتی، فرد را مستعد آترواسکلروزیس می‌کند و امروزه آترواسکلروزیس، یکی از عوارض مطرح و مهم در این بیماران است. امروزه شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد نقش پلاکت‌ها در آترواسکلروزیس با واسطه تولید میکروپارتیکل‌های پلاکتی میانجی‌گری می‌شود و این میکروپارتیکل‌ها می‌توانند به عنوان یک مارکر پیش‌آگهی‌دهنده در بیماری‌های عروقی آترواسکلروتیک مانند دیابت به کار روند (۲۸، ۲۷). هم چنین پاسخ پلاکت‌ها در این بیماران به مواد آنتی‌اگرگاسیون طبیعی در بدن مثل PGI2 و NO کاهش می‌یابد. تمام موارد در پاتوژنز آترواسکلروزیس در این بیماری نقش دارد. بر اساس داده‌های حاصل از این پژوهش، در این بیماران پاسخ پلاکت‌ها و تحریک‌پذیری آن‌ها نسبت به ADP نیز کاهش نشان می‌دهد و این کاهش حساسیت به ADP ممکن است در کنار کاهش پاسخ به PGI2 و NO، به نفع وقوع آترواسکلروزیس در این بیماران باشد (۲۹). تولید لوکال میکروپارتیکل‌های پلاکتی به دلیل ویژگی‌های ساختاری و اندازه، آن‌ها را به عنوان ابزاری قدرتمند در ارتباطات سلولی-پلاکتی، در انتقال مولکول‌های بیواکتیو با منشاء پلاکت مانند فاکتورهای رشد و سایر مولکول‌های سیگنالینگ و miRNA ها تبدیل کرده

باعث کاهش Reactivity پلاکت‌ها می‌شود، ممکن است خود عاملی باشد که به این دیر بهبود یافتن زخم‌های دیابتی کمک کند (۳۱، ۳۲).

نتیجه‌گیری

پلاکت‌ها در شرایط تیمار خفیف آگونیستی، با وجود بیان CD62P بالا، میزان تحریک‌پذیری پایینی به آگونیست ADP دارند که ممکن است ناشی از پدیده Desensitization باشد که به پلاکت‌ها در سازگاری با محیط متابولیک خود کمک می‌کند. بنابراین این کاهش Reactivity پلاکت‌ها نسبت به ADP میتواند در کنار کاهش حساسیت به PG-I2 و NO در افزایش بروز آترواسکلوئوزیس در بیماران دیابت نقش داشته باشد. از طرف دیگر پلاکت‌ها تحت تاثیر این پدیده مستعد تولید میکروپارتیکل‌های پلاکتی بیشتری می‌شوند که می‌تواند در عوارض ترومبوتیک دیابت نقش داشته باشد. هم‌چنین کاهش Reactivity پلاکت‌ها نسبت به ADP در بیماران دیابتیک ممکن است خود عاملی باشد که به دیر بهبود یافتن زخم‌های دیابتی کمک کند.

است. این در حالی است که در تولید سیستمیک و فراوان آن‌ها در موقعیت‌های پاتولوژیکی مختلف به عنوان یک مدیاتور پیش التهابی و فاکتور پاتولوژیکی عمل می‌کنند و باعث پیشبرد آترواسکلوئوزیس و عوارض ترومبوتیک می‌شوند (۳۰). بنابراین بر اساس داده‌های این پژوهش پلاکت‌هایی که دچار کاهش Reactivity می‌شوند، در عوض میکروپارتیکل‌های بیشتری تولید می‌کنند و این میکروپارتیکل‌ها در تولید سیستمیک، عوارض ترومبوتیک را به همراه می‌آورند و این پدیده ممکن است در عوارض دیابت نقش داشته باشد. زخم‌های دیابتی یکی از شایع‌ترین و جدی‌ترین عوارض دیابت محسوب می‌شود. بهبود زخم یک پروسه دینامیک و بیولوژیک پیچیده است که شامل ۴ فاز هموستاز، التهاب، پرولیفراتو و ری‌مادلینگ می‌شود. این پروسه‌ها شامل انواع سلول‌ها، ترکیبات خارج سلولار، فاکتورهای رشد و سایتوکین‌ها می‌شود که تمام این موارد در بیماری دیابت ملیتوس نوع II تحت تاثیر قرار می‌گیرد و منجر به تاخیر در بهبود زخم‌ها در دیابت می‌شود. تیمار خفیف پلاکت‌ها و ایجاد Desensitization، از آن جایی که

References:

- 1- American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 2010; 36(Suppl 1): S62-S69.
- 2- Tripathy D, Carlsson M, Almgren P, Isomaa B, Taskinen MR, Tuomi T, *et al.* Insulin secretion and insulin sensitivity in relation to glucose tolerance: Lessons from the Botnia study. Diabetes 2000; 49(6): 975-80.
- 3- Ferreira JL, Gómez-Hospital JA, Angiolillo DJ. Platelet abnormalities in diabetes mellitus. Diab Vasc Dis Res 2010; 7(4): 251-9.
- 4- Schneider DJ. Factors contributing to increased platelet reactivity in people with diabetes. Diabetes Care 2009; 32(4): 525-7.
- 5- Lemkes BA, Hermanides J, Devries JH, Holleman F, Meijers JC, Hoekstra JB. Hyperglycaemia: a prothrombotic factor? J Thromb Haemost 2010; 8(8): 1663-9.
- 6- Creager MA, Lüscher TF, Cosentino F, Beckman JA. Diabetes and vascular disease: pathophysiology, clinical consequences, and medical therapy: Part I. Circulation 2003; 108(12): 1527-32.
- 7- Osende JI, Badimon JJ, Fuster V, Herson P, Rabito P, Vidhun R, *et al.* Blood thrombogenicity in type 2 diabetes mellitus patients is associated with glycemic control. J Am Coll Cardiol 2001; 38(5): 1307-12.
- 8- Shantsila E, Kamphuisen PW, Lip GY. Circulating microparticles in cardiovascular disease: implications for atherogenesis and atherothrombosis. J Thromb Haemost 2010; 8(11): 2358-68.
- 9- Ferreira JL, Angiolillo DJ. Diabetes and anti-platelet therapy in acute coronary syndrome. Circulation 2011; 123(7): 798-813.
- 10- Morel O, Jesel L, Freyssinet JM, Toti F. Cellular mechanisms underlying the formation of circulating microparticles. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2011; 31(1): 15-26.
- 11- Buzas EI, György B, Nagy G, Falus A, Gay S. Emerging role of extracellular vesicles in inflammatory diseases. Nat Rev Rheumatol 2014; 10(6): 356-64.
- 12- Morel O, Jesel L, Abbas M, Morel N. Prothrombotic Changes in Diabetes Mellitus. Semin Thromb Hemost 2013; 39(5): 477-88.
- 13- Baurand A, Eckly A, Bari N, Léon C, Hechler B, Cazenave JP, *et al.* Desensitization of the Platelet Aggregation Response to ADP: Differential Down-regulation of the P2Y1 and P2cyc Receptors. Thromb Haemost 2000; 84(3): 489-91.

- 14- Siljander PR, Munnix IC, Smethurst PA, Deckmyn H, Lindhout T, Ouwehand WH, *et al.* Platelet receptor interplay regulates collagen-induced thrombus formation in flowing human blood. *Blood* 2004; 103(4): 1333-41.
- 15- Bünnemann M, Lee KB, Pals-Rylaarsdam R, Roseberry AG, Hosey MM. Desensitization of G-protein-coupled receptors in the cardiovascular system. *Annu Rev Physiol* 1999; 61: 169-92.
- 16- Holme S, Holmsen H. ADP-induced refractory state of platelets *in vitro*. I. Methodological studies on aggregation in platelet rich plasma. *Scand J Haematol* 1975; 15(2): 96-103.
- 17- Zimmermann H. Nucleotides and cd39: principal modulatory players in hemostasis and thrombosis. *Nat Med* 1999; 5(9): 987-8.
- 18- Mundell SJ, Barton JF, Mayo-Martin MB, Hardy AR, Poole AW. Rapid resensitization of purinergic receptor function in human platelets. *J Thromb Haemost* 2008; 6(8): 1393-404.
- 19- Vinik AI, Erbas T, Park TS, Nolan R, Pittenger GL. Platelet dysfunction in type 2 diabetes. *Diabetes Care* 2001; 24(8): 1476-85.
- 20- Ni H. The platelet "sugar high" in diabetes. *Blood* 2012; 119(25): 5949-51.
- 21- Ferroni P, Basili S, Falco A, Davi G. Platelet activation in type 2 diabetes mellitus. *J Thromb Haemost* 2004; 2(8): 1282-91.
- 22- Davi G, Ciabattini G, Consoli A, Mezzetti A, Falco A, Santarone S, *et al.* *In vivo* formation of 8-iso-prostaglandin F2alpha and platelet activation in diabetes mellitus: effects of improved metabolic control and vitamin E supplementation. *Circulation* 1999; 99(2): 224-9.
- 23- Nomura S, Shouzu A, Omoto S, Nishikawa M, Fukuhara S. Significance of chemokines and activated platelets in patients with diabetes. *Clin Exp Immunol* 2000; 121(3): 437-43.
- 24- Yngen M. Platelet function in diabetes mellitus Relationships to hyperglycaemia, antidiabetic treatment and microangiopathy. Solna: Karolinska University Press; 2005; p. 91.
- 25- Kakouros N, Rade JJ, Kourliouros A, Resar JR. Platelet Function in Patients with Diabetes Mellitus: From a Theoretical to a Practical Perspective. *Int J Endocrinol* 2011; 2011: 742719.
- 26- Martinez MC, Tual-Chalot S, Leonetti D, Andriantsitohaina R. Microparticles: targets and tools in cardiovascular disease. *Trends in Pharmacological Sciences* 2011; 32(11): 659-65.
- 27- Tan KT, Lip GY. The potential role of platelet microparticles in atherosclerosis. *Thromb Haemost* 2005; 94(3): 488-92.
- 28- Vajen T, Benedikter BJ, Heinzmann ACA, Vasina EM, Henskens Y, Parsons M, *et al.* Platelet extracellular vesicles induce a pro-inflammatory smooth muscle cell phenotype. *J Extracell Vesicles* 2017; 6(1): 1322454.
- 29- Vinik AI, Erbas T, Park TS, Nolan R, Pittenger GL. Platelet dysfunction in type 2 diabetes. *Diabetes Care* 2001; 24(8): 1476-85.
- 30- Alexandru N, Badila E, Weiss E, Cochior D, Stępień E, Georgescu A. Vascular complications in diabetes: Microparticles and microparticle associated microRNAs as active players. *Biochem Biophys Res Commun* 2016; 472(1): 1-10.
- 31- Pierce GF. Inflammation in nonhealing diabetic wounds: the space-time continuum does matter. *Am J Pathol* 2001; 159(2): 399-403.
- 32- Icli B, Nabzdyk CS, Lujan-Hernandez J, Cahill M, Auster ME, Wara AK, *et al.* Regulation of impaired angiogenesis in diabetic dermal wound healing by microRNA-26a. *J Mol Cell Cardiol* 2016; 91: 151-9.

Original Article

The effect of Platelets desensitization on the levels of residual platelets reactivity in the diabetes mellitus type 2 patients

Mahmoodian R.¹, Salimian M.², Hamidpour M.^{1,3}, Gharehbaghian A.^{1,4}

¹School of Allied Medical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

²Faculty of Paramedicine, Kashan University of Medical Sciences and Health Services, Kashan, Iran

³Hemopoietic Stem cell Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

⁴Pediatric Congenital Hematologic Disorders Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Abstract

Background and Objectives

Patients with diabetes mellitus type 2 have accelerated atherosclerosis. Hyperactive platelets and platelets micro particles play an important role in this prothrombotic state. Desensitization is a physiological process which plays an important role in turning off receptor mediated signal transduction pathways. In this study, we described and compared this process in diabetes mellitus type 2 patients and healthy individuals.

Materials and Methods

In this fundamental-applied study, 40 diabetes mellitus type 2 patients and 35 healthy individuals participated in the study. After centrifuging at 200 g, PRP was prepared. Desensitization was induced with mild agonist stimulation and low dose of ADP (1 μ M). Expression of platelets CD62P and CD41+- Annexin-v+ micro particles were evaluated by Flow cytometry. Data were analyzed by Anova and t-test.

Results

In comparison with healthy individuals, the diabetic group showed a significant increase in expression of CD62P in baseline. Desensitized platelets had less expression of CD62Pb but these platelets produced more micro particles in this state. Diabetic group showed a significant increase in production of platelet micro particles in all of states with ADP treatment. ($p \leq 0.004$)

Conclusions

The flow cytometric data show that platelets in patients with diabetes mellitus type 2 patients are hyperactive that it associated to metabolic conditions. Induction of desensitization state helps platelets to reduce platelets activation and platelets sensitivity to ADP in diabetic environment. Also the production of platelets microparticles is high in these patients and desensitized platelets are more susceptible to microparticle shedding.

Key words: ADP, Platelets, Diabetes Mellitus

Received: 21 Jun 2017

Accepted: 4 Jul 2017

Correspondence: Hamidpour M., PhD of Hematology & Blood Banking. Associate Professor of Faculty of Paramedical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences.

Postal Code: 1971653383, Tehran, Iran. Tel: (+9821) 22717504; Fax: (+9821) 22717504

E-mail: mohsenhp@sbmu.ac.ir