خون
فصلنامه پژوهشی
دوره ۳ شماره ۴ زمستان ۸۵(۲۹۸-۲۹۱)

تعیین ناقلین هموفیلی A در خراسان جنوبی با استفاده از سه مارکر پلی مورفیسمBclI، HindIII وAlwNI

دکتر محمدرضا عباس‌زادگان[۱]، دکتر مسعود ضیایی[۲]، دکتر فرهاد خدیوی زند[۳]، دکتر زهرا بدیعی[۴]، دکتر بهرام خزاعی[۵]
زهره واحدیان[۶]، فهیمه مهرابیان[۷]، عزت دادخواه[۸]

چکیده

سابقه و هدف

هموفیلی A شایع‌ترین اختلال انعقادی وابسته به X است. میزان شیوع این بیماری در جوامع مختلف حدود ۱ تا ۲ در هر ۱۰۰۰۰ نوزاد پسر می‌باشد. شیوع این بیماری در خراسان جنوبی بسیار بالاست که علت آن را شاید بتوان ایزوله بودن جمعیت آن و وجود ازدواج‌های فامیلی بسیار زیاد در این منطقه دانست. این مطالعه جهت تعیین ناقلین هموفیلی A در دو روستای کوشکک و توتکری و راه‌اندازی روش تشخیص پیش از تولد این بیماری انجام گرفت.

مواد وروش‌ها

مطالعه انجام شده از نوع توصیفی بود. در این تحقیق از ۵۱ نفر(۹ خانواده) شامل ۳۴ بیمار هموفیل و خویشاوندان نزدیک آن‌ها در دو روستای بیرجند واقع در خراسان جنوبی نمونه‌گیری به عمل آمد و DNA آنان از خون محیطی استخراج گردید. سه مارکر پلی‌مورفیسم داخل ژنی در ژن فاکتور VIII(HindIII، BclI و AlwNI) برای تعیین ناقلین مورد استفاده قرار گرفت.

یافته‌ها

از بین ۹ خانواده دارای فرزند مبتلا از ۷ مادر خون‌گیری به عمل آمد. پس از استخراج DNA ، آزمایش‌های PCR-RFLP برای آنان انجام گرفت. بررسی‌های انجام شده نشان داد که ۳ مادر از نظر HindIII، ۲ نفر از نظر BclI و یک نفر از نظر AlwNI هتروزیگوت هستند و امکان ردیابی آلل معیوب در این خانواده‌ها وجود دارد. AlwNI فقط در یکی از ۷ مادر مورد مطالعه آگاهی دهنده بود که بر اساس شجره‌نامه، این خانم از اهالی آن روستا نبوده و هیچ نسبتی با دیگر ساکنین روستا نداشت. در نهایت ۴ خواهر ناقل در خانواده‌های دارای پسر مبتلا شناسایی شد و می‌توان از نتایج به دست آمده جهت تشخیص پیش از تولد ناقلان شناسایی شده استفاده کرد.

نتیجه گیری

مارکرهای پلی‌مورفیسم HindIII و BclI می‌توانند مارکرهای مناسبی برای تشخیص پیش از تولد هموفیلی در این دو روستا باشند.

کلمات کلیدی: هموفیلی A، RFLP، PCR

تاریخ دریافت: ۸۵/۵/ ۳
تاریخ پذیرش: ۸۵/ ۹/۱۳

۱- مؤلف مسؤول: PhD ژنتیک انسانی ـ دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد ـ پژوهشکده بوعلی ـ میدان فردوسی ـ میدان بوعلی ـ مرکز تحقیقات ایمونولوژی ـ کد پستی: ۹۱۹۶۷۷۳۱۱۷
۲- متخصص بیماری‌های عفونی ـ استادیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
۳- متخصص اطفال ـ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ـ ـ پژوهشکده بوعلی ـ مرکز تحقیقات ایمونولوژی
۴- فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی اطفال ـ استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۵- پزشک عمومی ـ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ـ ـ پژوهشکده بوعلی ـ مرکز تحقیقات ایمونولوژی
۶- کارشناس بیولوژی ـ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ـ ـ پژوهشکده بوعلی ـ مرکز تحقیقات ایمونولوژی
۷- کارشناس پرستاری ـ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ـ ـ پژوهشکده بوعلی ـ مرکز تحقیقات ایمونولوژی
۸- کارشناس سلولی مولکولی ـ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ـ ـ پژوهشکده بوعلی ـ مرکز تحقیقات ایمونولوژی

[Downloaded from bloodjournal.ir on 2026-10-16]

مقدمه

هموفیلی A یک بیماری خونریزی دهنده ارثی ناشی از کمبود فاکتور VIII انعقادی می‌باشد که به صورت وابسته به X مغلوب انتقال می‌یابد. شیوع این بیماری حدود ۱ تا ۲ در ۱۰۰۰۰ نوزاد پسر تخمین زده می‌شود. مردان به علت داشتن یک کروموزوم X با دریافت یک ژن معیوب به هموفیلی مبتلا می‌شوند، در حالی‌که زنان با دریافت یک ژن معیوب از یکی از والدین به بیماری مبتلا نشده و صرفاً ناقل خواهند بود. البته در موارد استثنایی مانند ابتلا به سندرم ترنر(XO)، برخی اختلالات کروموزومی نظیر غیر فعال شدن بیش از اندازه کروموزوم X(پدیده لیونیزاسیون) یا توارث هم زمان فاکتور معیوب و فون ویلبراند، ممکن است علایم بالینی در زنان هتروزیگوت مشاهده شود(۳-۱). افراد مذکر مبتلا دارای علایم بالینی نظیر خونریزی در مفاصل، عضلات و کبود شدگی هستند. شدت علایم با سطح فعالیت فاکتور VIII در خون مبتلایان ارتباط مستقیم دارد. بسته به سطح فاکتور VIII در پلاسما بیماری به اشکال حاد، متوسط و خفیف طبقه‌بندی می‌گردد(۴). ژن سازنده فاکتور VIII در انتهای بازوی بلند کروموزومX در ناحیه Xq28 واقع شده است. این ژن ۱۸۶kb طول داشته و دارای ۲۶ اگزون به طول‌های ۶۲bp تا ۳۱۰۶bp و ۲۵ اینترون می‌باشد(۵، ۱). انتظار می‌رود بیشتر طول ژن را اینترون‌ها تشکیل دهند، به نحوی که در مقایسه با ۱۸۶ کیلو باز طول ژن، طول mRNA حدود ۹ کیلو باز است(۷، ۶).

خوشبختانه به علت این که ژن فاکتور VIII کلون و تعیین ترادف شده است، پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در استفاده از ژنتیک مولکولی برای شناسایی ناقلین و تشخیص پیش از تولد هموفیلی صورت گرفته است(۸). هم‌چنین اکتشاف Couple Linked polymorphism با روش PCR، تشخیص زودرس کاملی را با اطمینان و دقت بالا در اغلب موارد فراهم می‌نماید. تعیین ناقلین و تشخیص پیش از تولد در خانواده‌های مبتلا می‌تواند در کاهش شیوع بیماری بسیار سودمند باشد.

از آن‌جا که شناسایی مستقیم جهش‌ها با مشکلات بسیاری همراه است، در نتیجه استفاده از شاخص‌های ژنتیکی که بتوان به طور غیر مستقیم جهش‌ها را ارزیابی کرد، اهمیت خاصی دارد. یکی از این روش‌ها که امروزه در اکثر آزمایشگاه‌ها برای آنالیز ژنتیکی در خانواده‌های مبتلایان به هموفیلی A انجام می‌گیرد، روش آنالیز پیوستگی(Linkage Analysis) با استفاده از الگوی برش DNA توسط آنزیم‌های محدودالاثرRFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) می‌باشد. قطعات RFLP به صورت هم بارز و طبق الگوی توارث مندلی از همدیگر جدا می‌شوند و می‌توان آن‌ها را با آغازگرهای مناسب به روش PCR تکثیر کرد. تاکنون پلی‌مورفیسم‌های (Polymorphism) گوناگونی از این ژن گزارش شده است که در شناسایی ناقلین هموفیلی و در تشخیص پیش از تولد بسیار مفید بوده است(۱۰-۸).

برای تعیین افرد ناقل در خانواده‌های دارای فرزند هموفیل، باید حداقل یکی از مارکرها آگاهی دهنده(Informative) باشد. مارکر پلی‌مورفیسم در صورتی آگاهی دهنده است که مادر از نظر برش آنزیمی هتروزیگوت و پسر مبتلا هموزیگوت(برش خورده یا برش نخورده) باشد. در این حالت با توجه به توارث وابسته به X هموفیلی A، می‌توان نتیجه گرفت آلل مشترک بین مادر و پسر مبتلا، آلل معیوب بوده و هر کدام از خواهران که این آلل را دارا باشند ناقل محسوب می‌شوند. خواهرانی که از نظر فنوتیپی سالم هستند ولی آلل معیوب را دارا می‌باشند ناقل هموفیلی محسوب می‌شوند و امکان تشخیص پیش از تولد برای چنین خواهرانی وجود دارد.

به علت شیوع بالای هموفیلی در دو روستای کوشکک و توتکری، از روستاهای شهرستان بیرجند، بر آن شدیم تا با استفاده از مارکرهای مولکولی به شناسایی ناقلین پرداخته و با انجام آزمایش‌هایی در دوران بارداری از تولد نوزادان هموفیل و شیوع بیشتر بیماری جلوگیری به عمل آوریم. این مطالعه با هدف بررسی کارآیی مارکرهای پلی‌مورفیسم درون ژنی فاکتور VIII در نمونه‌های به دست آمده از ۵۱ نفر از اعضای خانواده افراد هموفیل در کانون هموفیلی خراسان جنوبی به منظور ارایه مشاوره ژنتیکی و راه‌اندازی روش تشخیص پیش از تولد مناسب در بیماران این منطقه انجام گرفت.

[Downloaded from bloodjournal.ir on 2026-10-16]

مواد و روش ها

مطالعه انجام شده از نوع توصیفی بود.

نمونه‌گیری و استخراج DNA:

با مراجعه به منزل بیماران روستاهای کوشکک و توتکری پرسش‌نامه‌هایی کامل گردید که شامل اطلاعات شخصی و بالینی بیمار بود. دستورالعمل‌های این طرح تحقیقاتی و فرم‌های نمونه‌گیری بیماران در کمیته اخلاقی معاونت پژوهشی مورد تایید قرار گرفت. شجره نامه‌های هر خانواده تا ۳ نسل پیشین تهیه گردید. پس از کسب رضایت از افراد، ۵ سی‌سی خون در لوله‌های فالکون درپیچ‌دار استریل حاوی EDTA تهیه شد. لوله‌ها در مجاورت یخ بلافاصله به آزمایشگاه منتقل گردید. استخراج DNA به روش استاندارد نمکی اشباع(Salting out) انجام شد. برای بررسی کیفیت و کمیت DNA از روش‌های الکتروفورز بر روی ژل آگارز ۱٪ و اسپکتروفتومتری استفاده شد.

تکثیر قطعات:

سه ناحیه پلی‌مورفیسم درون ژنی برای آنالیز پیوستگی DNA انتخاب شدند. پلی‌مورفیسم HindIII در اینترون ۱۹، پلی‌مورفیسم BclI در اینترون ۱۸ و پلی‌مورفیسم AlwNI در اینترون ۷ توالی‌های هدف بودند. ترادف آغازگرهای مورد نیاز برای تکثیر این قطعات طبق مقاله‌های معتبر تهیه شد(۱۱، ۱۰، ۶).

واکنش PCR در حجم نهایی ۲۰ میکرولیتر شامل بافر PCR 1X (سیناژن)، ۱/۵ میلی‌مولار $MgCl_2$، ۲۰۰ میکرومولار dNTP، ۵۰۰ نانومولار از هر آغازگر، ۱ واحد در ۲۰ میکرولیتر Taq DNA Polymerase، ۵۰ نانو گرم DNA هدف انجام گرفت. شرایط واکنش عبارت بود از یک سیکل ۹۵°C به مدت ۵ دقیقه، ۳۵ سیکل ۹۵°C به مدت ۳۰ ثانیه، دمای اتصال(Annealing Temperature) هر آغازگر به مدت ۳۰ ثانیه و ۷۲°C به مدت ۳۰ ثانیه و یک سیکل نهایی ۷۲°C به مدت ۵ دقیقه. دمای اتصال برای آغازگرهای HindIII ۶۴°C، برای آغازگرهای BclI ۵۶°C و برای آغازگرهای AlwNI ۵۰°C تنظیم شد. واکنش‌ها در دستگاه ترموسایکلر Techgene انجام شد. جهت کنترل کیفیت محصولات PCR ، الکتروفورز ۵µl از محصول PCR بر روی ژل آگارز ۱/۵٪ انجام شد. سپس ژل با اتیدیوم برماید ۰/۵µg/ml رنگ‌آمیزی شد.

هضم آنزیمی:

محصولات PCR به طور جداگانه تحت اثر آنزیم‌های اندونوکلئاز HindIII، BclI و AlwNI (فرمنتاز) قرار گرفت. ۵µl محصول PCR برای هر واکنش هضم آنزیمی مورد استفاده قرار گرفت. مقدار آنزیم محدودالاثر و بافر آن طبق دستورالعمل هر آنزیم استفاده شد و نمونه‌ها به مدت ۱۶-۱۲ ساعت در ۳۷°C قرار داده شد. بررسی نتایج حاصل بر روی ژل آکریل آمید ۱۵٪ انجام گرفت.

یافته ها

پس از ترکیب شجره‌نامه‌های تهیه شده از خانواده‌های دارای بیمار هموفیل در دو روستای کوشکک و توتکری، در مجموع ۹ خانواده دارای پسر هموفیل شناسایی شدند(شجره نامه‌های ۱ و ۲). از ۵۱ نفر اعضای این ۹ خانواده، شامل بیمار، ناقل اجباری(فردی که ممکن است علایم بالینی بیماری را بروز ندهد ولی با توجه به شجره‌نامه قطعاً حامل آلل معیوب است)، ناقل احتمالی و سالم نمونه‌گیری به عمل آمده بود. ۳۴ بیمار هموفیل در ۹ خانواده وجود داشت که از بین آن‌ها فقط نمونه ۲۷ نفر بیمار و ۷ مادر وجود داشت که بررسی وضعیت ناقلی برای این ۷ خانواده انجام گرفت. ۳ نفر از مادران از نظر HindIII، ۲ نفر از نظر BclI و یک نفر از نظر AlwNI هتروزیگوت بودند(جدول ۱)، که توانستیم ردیابی آلل معیوب را در این خانواده‌ها انجام دهیم. یکی از مادران از نظر هیچ کدام از این مارکرها آگاهی دهنده نبود و امکان ردیابی آلل معیوب در دختران او وجود نداشت. بالاترین ضریب هتروزیگوتی و آگاهی دهندگی مارکرهای RFLP در این جمعیت متعلق به HindIII بود(۴۲/۸۵٪)(جدول ۲). AlwNI فقط در یکی از ۷ مادر مورد مطالعه آگاهی دهنده بود که بر اساس شجره‌نامه، این خانم از اهالی آن روستا نبوده و هیچ نسبتی با دیگر ساکنین روستا نداشته

[Downloaded from bloodjournal.ir on 2026-10-16]

جدول ۱: نتایج حاصل از برش محصولات تکثیر یافته توسط آغازگرهای HindIII، BclI و AlwNI با اندونوکلئازهای مناسب

مارکر پلی‌مورفیسم	مکان ژنی در فاکتور	طول قطعه حاصل از PCR	طول قطعات حاصل از هضم آنزیمی (هتروزیگوت)	طول قطعات حاصل از هضم آنزیمی (هموزیگوت)
HindIII	Intron 19	۷۱۷bp	۴۶۹،۲۴۸،۱۶۷،۸۱bp	۴۶۹،۲۴۸bp
BclI	Intron 18	۱۴۲bp	۱۴۲،۹۹،۴۳bp	۹۹،۴۳bp
AlwNI	Intron 7	۲۶۰bp	۲۶۰،۲۱۰،۵۰bp	۲۱۰،۵۰bp

جدول ۲: آگاهی دهندگی ۳ مارکر چند شکلی درون ژنی در دو روستا در جنوب بیرجند

چند شکلی	مکان ژنی در فاکتور VIII	روش تشخیص	آنزیم محدود کننده	تعداد مادران هتروزیگوت	تعداد مادر بررسی شده	هتروزیگوتی	آگاهی دهندگی
HindIII	Intron19	PCR-RFLP	HindIII	۳	۷	٪۴۲/۸۵	٪۴۲/۸۵
BclI	Intron18	PCR-RFLP	BclI	۲	۷	٪۲۸/۵۷	٪۱۴/۲
AlwNI	Intron7	PCR-RFLP	AlwNI	۱	۷	٪۱۴/۲	٪۱۴/۲



شکل ۱: بررسی پلی‌مورفیسم BclI

۱) کنترل منفی PCR
۲) برش نخورده
۳) هتروزیگوت(مادر)
۴) هموزیگوت(پسر بیمار)
۵) هتروزیگوت(خواهر ناقل)
۶) برش نخورده
۷) سایز مارکر استاندارد(۵۰bp)

در این پلی‌مورفیسم باند ۱۴۲ bp به دو باند ۹۹ bp و ۴۳ bp تقسیم می‌شود.



شکل ۲: بررسی پلی‌مورفیسم AlwNI

۱) سایز مارکر استاندارد(۵۰bp)
۲) برش نخورده
۳) هموزیگوت(پسر بیمار)
۴) هتروزیگوت(مادر)
۵) هموزیگوت(خواهر ناقل)
۶) کنترل منفی PCR

در این پلی‌مورفیسم باند ۲۶۰ bp به دو باند ۲۱۰ bp و ۵۰ bp تقسیم می‌شود.



شکل ۳: بررسی پلی‌مورفیسم HindIII

۱) سایز مارکر استاندارد(۱۰۰bp)
۲) هموزیگوت(پسر بیمار)(۲۴۸،۴۶۹)
۳) هتروزیگوت(مادر)
(۴۶۹bp، ۲۴۸bp، ۱۶۷bp، ۸۱bp)
۴) هموزیگوت(خواهر ناقل)
۵) برش نخورده(۷۱۷bp)

در این پلی‌مورفیسم باند ۷۱۷ bp به باندهای ۴۶۹،۲۴۸،۱۶۷،۸۱ bp تقسیم می‌شود.

[Downloaded from bloodjournal.ir on 2026-10-16]



شجره نامه ۱: شجره نامه خانواده مبتلایان به هموفیلی A در روستای کوشکک



شجره نامه ۲: شجره‌نامه خانواده مبتلایان به هموفیلی A در روستای توتکری

است. در نهایت، ما توانستیم ۴ خواهر ناقل در خانواده‌های دارای پسر مبتلا تشخیص دهیم که می‌توان از نتایج به دست آمده جهت تشخیص پیش از تولد برای آنان استفاده کرد. بخشی از نتایج به دست آمده از آزمایش‌های پلی‌مورفیسم ۳ مارکر فوق در شکل‌های ۱، ۲ و ۳ آورده شده است.

بحث

آنالیز پیوستگی، روشی است که اغلب برای تعیین وضعیت ناقلی در خانم‌ها در خانواده‌های دارای افراد مبتلا به هموفیلی A مورد استفاده قرار می‌گیرد(۱۱). امروزه در اغلب کشورهای توسعه یافته از تشخیص ناقلی و تشخیص پیش از تولد برای کاهش متولدین هموفیل استفاده می‌گردد. در کشور ما نیز از چند سال قبل، این مهم در حال انجام می‌باشد.

گرچه تعیین مستقیم نواقص مولکولی در هموفیلی بهترین روش کمک کننده مشاوره ژنتیکی، تعیین ناقلین و تشخیص پیش از تولد می‌باشد، ولی این روش به علت موتاسیون‌های زیاد، طول زیاد و ساختمان پیچیده ژن فاکتور VIII اغلب مشکل بوده و آزمایشگاه‌های محدودی قادرند غربالگری جهش‌ها را در بیماران مبتلا به هموفیلی A و ناقلین انجام دهند. آنالیز پیوستگی با استفاده از روش PCR-RFLP روشی ساده است که محدودیت‌های ذکر شده را ندارد. این روش در آزمایشگاه‌ها به راحتی قابل انجام است و اغلب برای تعیین وضعیت ناقلی خانم‌ها در خانواده‌های دارای افراد مبتلا به هموفیلی A مورد استفاده قرار می‌گیرد. در هموفیلی A، خانم هتروزیگوت بدون علامت است و آزمایش‌های انعقاد به علت غیر فعال شدن تصادفی X یا لیونیزاسیون، مبهم است و دامنه وسیعی از سطح فاکتور VIII را تولید می‌کند. از طرف دیگر، تعیین ناقلین با استفاده از مارکرهای DNA، مستقل از غیر فعال شدن X است و تشخیص پیش از تولد در اوایل بارداری می‌تواند انجام گیرد.

[Downloaded from bloodjournal.ir on 2026-10-16]

از این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که درصد ضریب هتروزیگوتی این سه مارکر چند شکلی در دو روستای جنوب خراسان عبارت است از: (۴۲/۸۵٪)HindIII، (۲۸/۵۷٪)BclI، (۱۴/۲٪)AlwNI . هم‌زمان با این تحقیق بررسی هموفیلی A در افراد هموفیل مرکز و شمال خراسان نیز با در نظر گرفتن الگوی ارثی و فامیلی انجام گرفت(موارد مشکوک به موتاسیون جدید بررسی نشدند). درصد هتروزیگوتی در خانواده‌های مشهد بدین ترتیب گزارش شده است: ۵۴/۵۴٪ HindIII، ۳۶/۳۶٪ BclI، ۳۶/۳۶٪ AlwNI که مانند بیرجند بالاترین درصد هتروزیگوتی مربوط به HindIII است(منتشر نشده است).

در تحقیقی که در سال ۲۰۰۰ در کره توسط یانگ و همکاران انجام شده، درصد هتروزیگوتی برای BclI، ۲۱٪ گزارش شده است(۱۲). در تحقیقی که در ژاپن در سال ۲۰۰۲ انجام گرفته، هتروزیگوتی HindIII ۳۰٪ و BclI ۲۷/۹٪ گزارش شده است(۱۳).

شتی و همکارانش در سال ۱۹۹۷ درصد هتروزیگوتی در جمعیت هند را برای HindIII، ۳۰٪ و برای BclI ۴۷٪ گزارش دادند(۱۴). هم چنین چادهاری و همکاران نیز در تحقیقاتی که در جمعیت آسیایی هند انجام دادند درصد هتروزیگوتی HindIII را ۵۷٪ و BclI را ۳۹٪ گزارش دادند(۱۵). درصد هتروزیگوتی در شمال هند در سال ۲۰۰۲ برای HindIII، ۶۳٪ و برای BclI، ۶۰٪ گزارش شده است و درصد آگاهی دهنده بودن این مارکرها نیز برای HindIII ۶۶/۶٪ و برای BclI ۵۰٪ اعلام شده است(۱۶). همان طور که ملاحظه می‌شود در اکثر جمعیت‌های دیگر نیز درصد هتروزیگوتی برای مارکر HindIII از BclI بیشتر بوده است.

استفاده از مارکرهای آگاهی دهنده دیگر برای آنالیز پیوستگی DNA می‌تواند در حد قابل توجهی دقت تشخیص را بالا ببرد. در حال حاضر ما دو مارکر تکرار ماهواره‌ای(Microsatellite Repeat) را در اینترون ۱۳ و ۲۲ ژن فاکتور VIII در این خانواده‌ها بررسی می‌کنیم که این مارکر مخصوصاً برای بیمارانی که این سه مارکر در خانواده‌های آنان آگاهی دهنده نبوده است، سودمند است.

نتیجه‌گیری

با توجه به محدودیت‌های روش‌های تعیین مستقیم نواقص مولکولی در بیماران هموفیل و امکانات آزمایشگاه‌های ژنتیک سطح کشور استفاده از روش PCR-RFLP به صرفه و عملی می‌باشد و استفاده از مارکرهای چند شکلی HindIII و BclI برای بررسی احتمال ناقلی در خانواده‌های هموفیل این منطقه با روش PCR-RFLP توصیه می‌شود.

تشکر و قدردانی

در انتها از همکاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و بنیاد سرور مشهد که پشتیبانی مالی این طرح را به عهده داشتند نهایت تقدیر و تشکر را به عمل می‌آوریم. از کانون هموفیلی خراسان به خاطر همکاری صمیمانه در زمینه اجرای این طرح قدردانی می‌نماییم. از تمامی پرسنل آزمایشگاه ژنتیک انسانی پژوهشکده بوعلی که در انجام این تحقیق همکاری نموده‌اند صمیمانه سپاسگزاریم.

[Downloaded from bloodjournal.ir on 2026-10-16]

References :

1- Gitschier JEA. Characterization of the human factor VIII gene. Nature 1984; 312: 326-330.
2- Bernardi FEA. A recurrent missence mutation (Arg-Gln) and a partial deletion in factor VIII gene causing severe haemophilia A. B J Heamatol 1989; 71: 271-276.
3- Goodeve A. Laboratory methods for the genetic diagnosis of bleeding disorders. Clin Lab Haem 1998: 203-19.
٤- عمرانی م، صالح گرگری ث، اباذرزاده ک. تعیین ناقلین بیماری هموفیلی A ناشی از جهش در اینترون‌های ۱۸ و ۱۹ ژن هموفیلی به روش RFLP/PCR در استان آذربایجان غربی. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ۱۳۸۳، شماره ۳، پیاپی ۵۷، ص ۲۰۹-۲۰۶.
5- Mchusick VA. Mendelian inheritance in man. Boston, John Hopkins University Press; 1992: 332-43.
6- Tuddleman EGD. Inherited bleeding disorder. In: Hoffbrand AV and Lewis SM, editors. Postgraduate haematology. Oxford: Heinmann Medical Books; 1989:446.
7- Jarjanazi H, Timur AA, El-Maarri O, Caglayan SH. Analysis of two microsatellite repeat polymorphism s of the factor VIII gene in the Turkish population. Br J Haematol 1998; 100: 589-593.
8- Soares RP, Magnanelli AC, Bravo-Osorio LM, Chamone DA, Bydlowski SP. Rapid and non-isotopic detection of intron 18 polymorphism of the factor VIII gene. Clinica Chimica Acta 1999; 287: 157-161.
9- Lollaz MRA. Schwaab R, McVey JH, Michaelides K, Tuddenham EG. Hemophilia A diagnosis by simultaneous analysis of two variable dinucleotide tandem repeats within the factor VIII gene. Br J Haematol 1994; 86: 804-9.
10- Peake IR, Lilicrap DP, Boulyjenkor V, Brief E, Chan V, Ginter EK, *et al.* Hemophilia: Strategies for carrier detection and prenatal diagnosis. Bull World Health Org 1993; 71: 429-58.
11- Goodeve A. Draft best practice guidelines for molecular analysis of haemophilia A. Clinical Molecular Genetics Society 2001.
12- Choi YM, Hwang D, Choe J, Jun JK, Kim EL, Moon SY, *et al.* Carrier detection and prenatal diagnosis of hemophilia A in a korean population by PCR-based analysis of the Bc1I/intron 18 and St 14 VNTR polymorphisms. J Hum Genet 2000; 45: 218-223.
13- Sawada A, Sumita C, Higasa S, Ueda M, Suehiro A, Kakishita E. Suitability of four polymorphic DNA markers for indirect genetic diagnosis of haemophilia A in Japanese subject. Thrombosis Research 2002; 105: 271-276.
14- Shetty S, Ghosh K, Pathare A, Colah R, Badakare S, Mohanty D. Factor VIII and FXI gene polymorphisms and carrier analysis in Indian population. Am J Hematol 1997; 54: 271-275.
15- Chowdhury MR, Herrrmann FH, Schroder W, Lambert CT, Lalloz MR, Layton M, *et al.* Factor VIII gene polymorphisms in the Asian Indian population. Haemophilia 2000; 6: 625-630.
16- Pandey GS, Phadke SR, Mittal B. Carrier analysis and orenatal diagnosis of haemophilia A in North India. International Journal of Molecular Medicine 2002; 10: 661-664.

[Downloaded from bloodjournal.ir on 2026-10-16]

Carrier detection of hemophilia A in southern Khorasan using the 3 polymorphic sites of BclI, HindIII, and AlwNI

Abbaszadegan M.R.[1](PhD), Ziaee M.[2](MD), Khadivi-zand F.[1](MD), Badiee Z.[3](MD), Khazaei B.[1](MD), Vahedian Z.[1](BS), Mehrabian F.[1](BS), Dadkhah E.[1](BS)

[1]Division of Human Genetics, Immunology Research Center, Bu-Ali Research Institute, Mashhad University of Medical Sciences (MUMS)
[2]Birjand University of Medical Sciences
[3]Mashhad University of Medical Sciences (MUMS)

Abstract

Background and Objectives

Hemophilia A is the most common X-linked blood coagulation disorder. The prevalence rate of this disease in various communities is about 1-2/10000 males. The prevalence of hemophilia A is very high in southern Khorasan population, perhaps due to their isolation and high rate of consanguinity. The aim of this research was to detect hemophilia A carriers in two villages of southern Khorasan and set a prenatal diagnosis program for these families.

Materials and Methods

Blood samples of 34 patients with hemophilia A out of 51 family members (9 families) from two villages were collected. We were also able to collect samples from 7 mothers out of 9 families. Intragenic polymorphic sites in factor VIII gene including HindIII, Bc1I and AlwNI were used for carrier detection. DNA extraction and PCR-RELP were also performed.

Results

The results revealed 3 heterozygote mothers for HindIII, 2 for Bc1I and 1 for AlwNI. We utilized these polymorphic sites for carrier analysis in these families. Ultimately, 4 carrier sisters of affected boys in this population were found; it was then possible to perform prenatal diagnosis procedure for their families.

Conclusions

HindIII and Bc1I polymorphisms can be suitable markers for hemophilia prenatal diagnosis in these two villages.

Key words: Hemophilia A, RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism), Carrier detection
SJIBTO 2007; 3(4):291-298

Received: 25 Jul 2006
Accepted: 4 Dec 2006

Correspondence: Abbaszadegan M.R., MT (ASCP), PhD of Human Genetics. Division of Human Genetics, Bu-Ali Research Institute, Mashhad University of Medical Sciences. Bu-Ali Square, Mashhad, Iran. Postal code: 9196773117. Tel: (+98511) 7112611-6; Fax: (+98511) 7112343
E-mail: *abbaszadegan@ams.ac.ir*

[Downloaded from bloodjournal.ir on 2026-10-16]