



# Design and In-Silico Evaluation of Specific Primers for the *HBZ* Gene of HTLV-1 to Establish a Semi-Nested PCR Method

Mehdi Zandi<sup>1</sup>, Zohreh Sharifi<sup>1</sup> , Mahdi Ajorloo<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Biological Products and Blood Safety Research Center, High Institute for Research and Education in Transfusion Medicine, Tehran, Iran

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="150 712 239 840"> </div> <div data-bbox="279 712 478 766"> Received: 2025/01/08<br/>Accepted: 2025/03/09 </div> <div data-bbox="137 840 502 873"> <a href="https://doi.org/10.18502/avr.v34i2.18052">https://doi.org/10.18502/avr.v34i2.18052</a> </div> <div data-bbox="145 1028 234 1057"> <b>Citation:</b> </div> <div data-bbox="143 1057 504 1223"> Zandi M, Sharifi Z, Ajorloo M. Design and In-Silico Evaluation of Specific Primers for the <i>HBZ</i> Gene of HTLV-1 to Establish a Semi-Nested PCR Method. J Iran Blood Transfus. 2025; 22 (1) : 19-29. </div> <div data-bbox="143 1344 504 1545"> <b>Correspondence:</b> Sharifi Z, Associate professor of Biological Products and Blood Safety Research Center, High Institute for Research and Education in Transfusion Medicine.<br/>P.O.Box: 14665-1157, Tehran, Iran.<br/>Tel: (+9821) 82052152<br/><b>E-mail:</b> z.sharifi@tmi.ac.ir </div> | <div data-bbox="521 694 766 732"> <h2>ABSTRACT</h2> </div> <div data-bbox="521 730 837 766"> <h3>Background and Objectives</h3> </div> <div data-bbox="521 761 1369 922"> Human T-cell lymphotropic virus type 1 (HTLV-1) is the only human oncogenic retrovirus associated with adult T-cell leukemia/lymphoma and tropical spastic paralysis. Common serological methods for detecting this virus are ELISA and Western blot. The <i>HBZ</i> gene, encoded by the negative strand of the HTLV-1 provirus, does not undergo continuous mutations, unlike other viral genes. In this study, the <i>HBZ</i> gene of HTLV-1 was used to design specific primers and develop a semi-nested PCR assay. </div> <div data-bbox="521 918 788 949"> <h3>Materials and Methods</h3> </div> <div data-bbox="521 947 1369 1211"> In a cross-sectional study, <i>HBZ</i> gene sequences from various virus isolates were extracted from the NCBI database and aligned using MEGA6 software. Using Gene Runner software, the primer design was performed from the conserved region common to all strains. To evaluate the primers, parameters such as GC content, melting temperature, hairpin, and dimer structures were used calculated by OligoAnalyzer software. To examine the exact binding site of the primers, SnapGene software was used to simulate the PCR reaction and electrophoresis. Primers were screened and synthesized using the BLASTN tool in NCBI. In the laboratory stage, genomic DNA was extracted from blood samples of HTLV-1 positive and healthy individuals and electrophoresed for Semi-nested PCR reaction and evaluation of PCR products. </div> <div data-bbox="521 1209 612 1238"> <h3>Results</h3> </div> <div data-bbox="521 1238 1369 1476"> First, the <i>HBZ</i> protein coding sequences from 43 viral isolates with different geographical origins were aligned, and then primers were designed from the most similar conserved regions. The primers lacked hairpin and dimer structures. The GC percentage was between 45%-60%, and the melting temperature was between 64-67°C. BLAST results showed that the designed primers were 100% capable of identifying the target gene (<i>HBZ</i>), and no overlap with the genomic sequences of other viruses or humans was observed. After genomic DNA extraction and PCR, the length of the desired fragment was 493 bp in the first stage and 106 bp in the second stage, which was consistent with the predicted bioinformatics results. </div> <div data-bbox="521 1473 670 1505"> <h3>Conclusions</h3> </div> <div data-bbox="521 1503 1369 1612"> The design of <i>HBZ</i> gene primers utilizing bioinformatics software and the successful development of a Semi-nested PCR assay were achieved. The laboratory results confirmed the bioinformatics predictions and demonstrated the effectiveness of this method for the accurate and rapid detection of the virus. </div> <div data-bbox="521 1608 968 1639"> <b>Key words:</b> HTLV-1, Nested PCR, Leukemia </div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Copyright © 2025 Journal of Iranian Blood Transfusion, Published by Blood Transfusion Research Center.  
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International license.



## طراحی و ارزیابی این سلیکو آغازگرهای اختصاصی ژن HBZ ویروس HTLV-1 جهت راه اندازی روش Semi-Nested PCR

مهدی زندی<sup>۱</sup>، زهره شریفی<sup>۲</sup> ID، مهدی آجورلو<sup>۳</sup> ID

۱- کارشناس ارشد زیست فناوری - مرکز تحقیقات فرآورده های بیولوژیک و سلامت خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون - تهران - ایران  
۲- PhD ویروس شناسی - استاد مرکز تحقیقات فرآورده های بیولوژیک و سلامت خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون - تهران - ایران  
۳- PhD ویروس شناسی - استادیار مرکز تحقیقات فرآورده های بیولوژیک و سلامت خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون - تهران - ایران

### چکیده

#### سابقه و هدف

ویروس لنفوتروپیک سلول T انسانی نوع ۱ (HTLV-1)، تنها رتروویروس سرطان زای انسانی است که با بیماری های لوسمی/لنفوم سلول T بالغین و فلج اسپاستیک گرمسیری مرتبط می باشد. روش های سرولوژیکی رایج برای تشخیص این ویروس، الایزا و وسترن بلات می باشد. ژن HBZ، که توسط رشته منفی پروویروس HTLV-1 کد می شود، برخلاف سایر ژن های ویروسی، دچار جهش های مداوم نمی شود. در این مطالعه، ژن HBZ ویروس HTLV-1 برای طراحی آغازگرهای اختصاصی و توسعه آزمایش Semi-nested PCR مورد استفاده قرار گرفت.

#### مواد و روش ها

در یک مطالعه مقطعی، توالی ژن HBZ از ایزوله های گوناگون ویروس از پایگاه داده NCBI استخراج شد و با نرم افزار MEGA6 هم ردیف گردید. طراحی آغازگر از ناحیه محافظت شده مشترک بین تمامی سویه ها با استفاده از نرم افزار Gene Runner انجام شد. جهت ارزیابی آغازگرها، پارامترهایی از قبیل درصد GC، دمای ذوب، ساختارهای سنجاق سری و دایمر از نرم افزارهای OligoAnalyzer و SnapGene استفاده شد. برای بررسی محل دقیق اتصال آغازگرها، جهت شبیه سازی واکنش PCR و الکتروفورز، از نرم افزار SnapGene استفاده شد. آغازگرها با استفاده از ابزار BLASTN در NCBI بررسی و سنتز شدند. در مرحله آزمایشگاهی، DNA ژنومی استخراج شده از نمونه های خون افراد HTLV-1 مثبت و سالم جهت واکنش Semi-Nested PCR و ارزیابی محصولات PCR، الکتروفورز شد.

#### یافته ها

ابتدا توالی های کدکننده پروتئین HBZ از ۴۳ ایزوله ویروسی با منشا جغرافیایی مختلف با همدیگر هم ردیف شدند، سپس آغازگرها از نواحی محافظت شده با بیشترین شباهت طراحی شدند. آغازگرها فاقد ساختارهای سنجاق سری و دایمر بودند. درصد GC بین ۴۵-۶۰٪ و دمای ذوب بین ۶۷-۶۴ درجه سانتی گراد بود. نتایج BLAST نشان داد که آغازگرهای طراحی شده، ۱۰۰٪ قادر به شناسایی ژن هدف (HBZ) بوده و هم پوشانی با توالی های ژنومی سایر ویروس ها یا انسان ها مشاهده نشد. پس از استخراج DNA ژنومی و انجام PCR، طول قطعه مورد نظر در مرحله اول، ۴۹۳ و در مرحله دوم، ۱۰۶ جفت باز بود و با نتایج پیش بینی شده بیوانفورماتیکی مطابقت داشت.

#### نتیجه گیری

طراحی آغازگرهای ژن HBZ با استفاده از نرم افزارهای بیوانفورماتیکی و توسعه آزمایش Semi-Nested PCR با موفقیت انجام شد. نتایج آزمایشگاهی، پیش بینی های بیوانفورماتیکی را تایید کرده و کارایی این روش را برای تشخیص دقیق و سریع ویروس نشان داد.

**کلمات کلیدی:** HTLV-1، Nested PCR، لوسمی



تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۱۰/۱۹

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۲/۱۹

<https://doi.org/10.18502/avr.v34i2.18052>

### Citation:

Zandi M, Sharifi Z, Ajorloo M. Design and In-Silico Evaluation of Specific Primers for the HBZ Gene of HTLV-1 to Establish a Semi-Nested PCR Method. J Iran Blood Transfus. 2025; 22 (1): 19-29.

### نویسنده مسئول:

دکتر زهره شریفی. استاد مرکز تحقیقات فرآورده های بیولوژیک و سلامت خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون - تهران - ایران

صندوق پستی: ۱۴۶۶۵-۱۱۵۷

E-mail: z.sharifi@tmi.ac.ir

### کد اخلاق:

IR.TMI.REC.1402.017

## مقدمه

ویروس لنفوتروپیک سلول T انسانی نوع ۱ (HTLV-1) به خانواده رتروویروس‌ها تعلق دارد و نخستین بار در دهه ۱۹۸۰ توسط پوئز کشف شد (۱). این ویروس با ادغام ژنوم خود در DNA میزبان، موجب عفونت‌های مزمن می‌گردد و ارتباط مستقیمی با بیماری‌های خطرناکی مانند لوسمی/لنفوم سلول T بالغین (ATL)، میلوپاتی مرتبط با HTLV-1 (HAM/TSP) و التهاب لایه میانی چشم دارد (۲). تخمین زده می‌شود ۲۵ میلیون نفر در سراسر جهان به HTLV آلوده هستند. میزان شیوع آن به‌طور ویژه در مناطق بومی مانند جنوب ژاپن، بخش‌هایی از آفریقا، آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی و خاورمیانه بالاست (۲). شهرهای مشهد، نیشابور و سبزوار در شمال شرقی ایران از جمله مناطق اندمیک ویروس به‌شمار می‌آیند (۳). انتقال ویروس از طریق راه‌های مختلفی مانند تماس جنسی، استفاده از سرنگ مشترک، انتقال خون و از مادر به نوزاد (معمولاً از طریق شیردهی) انجام می‌شود (۴). تشخیص زود هنگام و دقیق عفونت HTLV-1 برای مدیریت مؤثر بیماران و پیشگیری از گسترش آن اهمیت حیاتی دارد (۵). با این حال، روش‌های تشخیصی کنونی مانند الایزا و وسترن بلات، دارای محدودیت‌هایی از نظر حساسیت و اختصاصیت هستند. همچنین این روش‌ها در دوره کمون ویروس و در مراحل اولیه ابتلا، زمانی که تیتراژ آنتی‌بادی ضد آنتی‌ژن‌های ویروسی قابل اندازه‌گیری نیست، کارآمد نمی‌باشند (۵). مطالعه‌های گذشته نشان داده‌اند در بسیاری از موارد، با وجود مثبت بودن نتایج الایزا، نتایج آزمایش وسترن بلات که به عنوان آزمایش تأییدی استفاده می‌شود، نامشخص گزارش شده است. این موارد نشان‌دهنده نیاز به توسعه روش‌های دقیق‌تر و حساس‌تر است (۶). روش‌های مولکولی به دلیل توانایی تشخیص مستقیم مواد ژنتیکی ویروس در ژنوم میزبان، جایگاه ویژه‌ای در تشخیص عفونت‌های ویروسی پیدا کرده‌اند. PCR، یک روش مولکولی بسیار حساس و دقیق است که با استفاده از چرخه‌های دمایی، امکان تکثیر نواحی خاصی از DNA را فراهم می‌آورد (۶). آغازگرها در این فرآیند نقش کلیدی داشته و به عنوان نقطه شروع برای ساخت DNA عمل می‌کنند. آغازگرها به‌طور خاص از سمت ۳' انتهای DNA نوکلئوتیدها را اضافه می‌کنند، این ویژگی بیوشیمیایی باعث می‌شود فرآیند تکثیر به صورت دقیق و قابل کنترل انجام

شود. جهت طراحی آغازگرها، انتخاب نواحی محافظت شده در ژنوم و تنظیم دقیق توالی‌ها به منظور افزایش اختصاصیت و حساسیت، از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشند. روش Nested PCR به عنوان یکی از روش‌های پیشرفته با دو مجموعه آغازگر خارجی و داخلی، توانسته است دقت و حساسیت بیشتری را در مقایسه با روش‌های معمولی PCR ارائه دهد (۷). در مطالعه‌های مختلف، آغازگرها غالباً برای ژن Tax ویروس طراحی شده‌اند، اما در برخی موارد به ویژه در موارد ابتلای جدید، با وجود مثبت بودن نتایج سرولوژیک، ژن Tax با استفاده از PCR شناسایی نشده است که می‌تواند به علت رخداد جهش‌های متعدد در این ژن باشد (۸). این امر نشان می‌دهد که بررسی چندین ناحیه از ژنوم ویروس برای افزایش دقت و اطمینان از تشخیص ضروری است.

در این مطالعه، طراحی و بهینه‌سازی آغازگرها با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای پیشرفته بیوانفورماتیکی انجام شده است که امکان شناسایی و هدف‌گیری دقیق نواحی ژنی را فراهم کرده است. پروتئین HBZ از یک ناحیه بسیار محافظت شده رشته منفی پروویروس HTLV-1 کد می‌شود، که افزایش بیان آن با افزایش بار پروویروسی همراه می‌باشد. انتخاب ژن HBZ به دلیل نقش مهم آن در پاتوژنز و بیان آن در تمامی موارد ابتلا به لوسمی/لنفوم سلول T بالغین (ATL) و سایر بیماری‌های مرتبط با HTLV-1 انجام شده است. علاوه بر این، بیان ژن HBZ در حامل‌های آلوده به HTLV-1 نیز قابل تشخیص است. با توجه به اهمیت ژن HBZ، در این مطالعه با استفاده از روش‌های In Silico آغازگرهای اختصاصی برای ناحیه محافظت شده ژن HBZ ویروس HTLV-1 طراحی گردید. جهت ارزیابی روش semi-nested PCR، از نرم‌افزار SnapGene برای شبیه‌سازی عملکرد آغازگرها در شرایط آزمایشگاهی استفاده شد و در نهایت تشخیص ویروس HTLV-1 با استفاده از آغازگرهای اختصاصی طراحی شده برای ناحیه محافظت شده ژن HBZ ویروس HTLV-1 در آزمایشگاه انجام گردید.

## مواد و روش‌ها

### ۱- طراحی اینسلیکو آغازگر:

نرم‌افزارهای مختلفی جهت طراحی آغازگرهای مورد استفاده در انواع واکنش‌های زنجیره‌ای پلیمرز (PCR) وجود دارد. این نرم‌افزارها کاربردهای بسیاری از جمله

تجزیه و تحلیل کامل DNA و پروتئین، پیش‌بینی ساختار ثانویه پروتئین، طراحی آغازگر، مدل‌سازی مولکولی، توسعه استراتژی‌های شبیه‌سازی و تجزیه و تحلیل آنزیم‌های محدود کننده اندونوکلاز دارند.

#### شناسایی توالی هدف:

جهت طراحی آغازگرهای اختصاصی، توالی‌های ژن HBZ از پایگاه داده NCBI GenBank استخراج شد. NCBI (National Center for Biotechnology Information) یکی از بزرگ‌ترین منابع اطلاعات بیولوژیکی است که دسترسی به توالی‌های ژنتیکی، داده‌های بیولوژیکی و ابزارهای تحلیل آن‌ها را فراهم می‌کند. این پایگاه داده شامل بانک گسترده‌ای می‌باشد که توالی‌های ژنی انواع ارگانیسم‌ها را ذخیره و به اشتراک می‌گذارد. علاوه بر این، این پایگاه داده به طور منظم اطلاعات خود را هر ۲۴ ساعت با دیگر پایگاه‌های داده معتبر از جمله EMBL (European Molecular Biology Laboratory) و DDBJ (DNA Data Bank of Japan) به اشتراک می‌گذارد تا داده‌ها و منابع به‌روز و جامع‌تر باشند. در این مطالعه، ۴۳ فایل توالی کامل ژن HBZ استخراج گردید که شامل توالی‌های مربوط به تمامی گونه‌های ویروس HTLV-1 از سراسر جهان، به ویژه گونه‌های ایرانی، برزیلی و آفریقایی بودند.

#### هم‌ردیفی توالی‌ها:

هم‌ردیفی توالی‌ها به منظور شناسایی نواحی محافظت شده و متغیر در ژنوم ویروس HTLV-1 انجام شد. این فرآیند به شناسایی سویه‌های مختلف ویروس و طراحی آغازگرهای دقیق‌تر برای آزمایش تشخیصی semi-nested PCR کمک می‌کند. در این مطالعه، با استفاده از نسخه ۶/۰ نرم‌افزار MEGA و به کمک الگوریتم ClustalW، توالی‌های کدکننده پروتئین HBZ از ۴۳ فایل مختلف با منشأهای جغرافیایی مختلف هم‌ردیف شدند، تا نواحی محافظت شده در این توالی‌ها شناسایی شوند. این نرم‌افزار به کمک الگوریتم‌های مختلف هم‌ردیف‌سازی مانند ClustalW و Clustal Omega، امکان هم‌ردیف‌سازی دقیق توالی‌های DNA را فراهم می‌آورد. ClustalW یک الگوریتم مشهور برای هم‌ردیف‌سازی چند تایی توالی‌ها است که از روشی مبتنی بر مقایسه جفتی استفاده می‌کند. این الگوریتم به طور خودکار توالی‌های DNA، RNA و پروتئین را با یکدیگر

مقایسه و هم‌ردیف می‌کند تا تفاوت‌های بین آن‌ها مشخص شوند. در ClustalW، ابتدا جفت‌های توالی با استفاده از ماتریس‌های مشابهت مقایسه می‌شوند، سپس نتیجه این مقایسه‌ها به صورت ماتریس‌های فاصله برای تمام توالی‌ها نمایش داده می‌شود. در نهایت، بر اساس این ماتریس‌ها، بهترین ترتیب هم‌ردیفی انتخاب شده که کمترین فاصله را بین توالی‌ها ایجاد کند، با استفاده از هم‌ردیفی ۴۳ توالی استخراج شده، نواحی محافظت شده و مشترک بین تمامی سویه‌ها مشخص گردید که هدف اصلی طراحی آغازگر قرار گرفت.

#### طراحی آغازگرها:

پس از مشخص کردن توالی‌های مشترک حاصل از هم‌ردیفی مرحله قبل، طراحی آغازگر برای semi-nested PCR انجام شد. در روش Nested PCR دو مجموعه آغازگر استفاده می‌شود. یک جفت آغازگر خارجی که در واکنش اول مورد استفاده قرار می‌گیرد و محصول این مرحله، جهت افزایش اختصاصیت، توسط یک جفت آغازگر داخلی که قسمت‌های درونی‌تر ژن هدف را تکثیر می‌کنند در مرحله دوم PCR می‌شوند. در روش semi-nested PCR یک آغازگر در بین هر دو مرحله به طور مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای این مطالعه یک آغازگر پیشرو خارجی، یک آغازگر پیشرو داخلی و یک آغازگر پیرو که به طور مشترک در هر دو مرحله مورد استفاده قرار می‌گیرد، طراحی گردید. تمامی آغازگرها با استفاده از نرم‌افزار Gene Runner نسخه ۵۰.۳۳ طراحی شدند. این نرم‌افزار قابلیت‌های متنوعی برای طراحی تجزیه و تحلیل و ویرایش توالی‌های DNA دارد. از جمله ویژگی‌های برجسته آن می‌توان به طراحی آغازگر با توجه به معیارهای مختلف مانند طول، درصد GC و دمای ذوب (Tm) اشاره کرد. نرم‌افزار Gene Runner با پیش‌بینی ساختار ثانویه (مانند ساختارهای حلقه‌ای) تأثیر زیادی در طراحی آغازگر دارد. اگر ساختارهای ثانویه به درستی پیش‌بینی شوند، می‌توان از تشکیل دایمرهای آغازگر یا تعاملات جانبی که ممکن است کارایی یا دقت واکنش PCR را کاهش دهند، جلوگیری کرد. این قابلیت پیش‌بینی ساختاری به ویژه در طراحی آغازگرها برای نواحی پیچیده ژنی اهمیت زیادی دارد. جدول زیر آغازگرهای طراحی شده برای ژن HBZ جهت راه‌اندازی آزمایش semi-nested

PCR را نشان می‌دهد (جدول ۱).

جدول ۲: خصوصیات آغازگرهای طراحی شده برای ژن HBZ ویروس HTLV-1

| آغازگر      | طول قطعه | دمای ذوب | GC%    |
|-------------|----------|----------|--------|
| پیشرو خارجی | ۲۲ bp    | ۶۶/۴     | ٪ ۴۵/۵ |
| پیشرو داخلی | ۲۱ bp    | ۶۴/۹     | ٪ ۶۰   |
| پیرو مشترک  | ۲۱ bp    | ۶۷/۸     | ٪ ۴۷/۶ |

## ۲- بررسی در آزمایشگاه:

ساخت و ذخیره‌سازی آغازگرها:

برای اطمینان از صحت آغازگرها، اطلاعات مربوط به توالی آن‌ها پیش از ساخت دوباره مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، آغازگرهای طراحی شده، ساخته شدند (شرکت ندای فن، تهران، ایران). پس از ساخت، آغازگرها با غلظت مشخصی (۱۰۰ میکرومولار) در دمای ۲۰- درجه سانتی‌گراد ذخیره شدند تا از تخریب و کاهش کارایی آن‌ها در فرایندهای بعدی جلوگیری شود.

استخراج DNA از نمونه‌ها:

در این مطالعه، از ۵ نمونه خون اهداکننده HTLV-1 منفی، ۵ نمونه خون اهداکننده HTLV-1 مثبت که غربالگری اولیه برای شناسایی ویروس HTLV-1 با استفاده از آزمایش ELISA انجام شده بود و نتایج این آزمایش توسط روش وسترن بلات با کیت دیانگنوستیکا MP تأیید گردیده بود و ۴ نمونه مربوط به افراد مبتلا به سایر ویروس‌های انسانی (HIV، HCV، HBV و HSV)، استفاده شد. DNA ژنومی از باقی‌کوت نمونه خون افراد در لوله‌های حاوی EDTA با استفاده از کیت DNJia plus (Blood and Cell kit (LOT: 506923112710040) شرکت روزه تکنولوژی استخراج شد. غلظت DNA استخراج شده با دستگاه اسپکتروفتومتر نانو دراپ اندازه‌گیری گردید.

انجام واکنش PCR:

واکنش PCR با استفاده از مستر میکس آماده از شرکت آمپلیکون (دانمارک) و به وسیله آغازگرهای طراحی و سنتز شده انجام شد. مقدار DNA الگو در هر واکنش به صورت دقیق تنظیم گردید. برای بهینه‌سازی دمای اتصال آغازگرها و جلوگیری از اتصال غیر اختصاصی، از تنظیمات ترموسایکلر با گرادیان شیب غلظتی و

جدول ۱: توالی آغازگرهای طراحی شده برای ژن HBZ ویروس HTLV-1

| توالی آغازگرهای طراحی شده                   | طول قطعه تکثیر شونده |
|---------------------------------------------|----------------------|
| پیشرو خارجی<br>5'-GCTTGACGGTTTGCTATCCTTA-3' | ۴۹۴ bp               |
| پیشرو داخلی<br>5'-GGAGTCCTTGGAGGCTGAAC-3'   | ۱۰۶ bp               |
| پیرو مشترک<br>5'-TTATTGCAACCACATCGCCTC-3'   | -                    |

ارزیابی آغازگرها:

آغازگرها با استفاده از نرم‌افزار OligoAnalyzer تحلیل شدند. این نرم‌افزار به بررسی پارامترهای مهمی مانند دمای ذوب (Tm)، تشکیل ساختارهای سنجاق سری (Hairpin)، و ایجاد دایمر (Self-dimerization) پرداخت. عدم تطابق در توالی آغازگر (Mismatch) و هدف یکی از عوامل مهم کاهش کارایی واکنش PCR است، به ویژه در ناحیه ۳' آغازگر که برای اتصال و عملکرد صحیح پلیمرز ضروری است. در این مطالعه، آغازگرهای طراحی شده به منظور ارزیابی عدم تطابق با استفاده از ابزار OligoAnalyzer بررسی شدند. این ابزار امکان شناسایی هرگونه اتصال غیر اختصاصی، ساختارهای ثانویه، و ناسازگاری‌های احتمالی را فراهم کرد. همچنین در این مطالعه، به منظور بررسی اختصاصیت آغازگرهای طراحی شده، از ابزار تحت وب NCBI- blastn استفاده گردید (جدول ۲).

توالی‌های آغازگرهای طراحی شده وارد این ابزار شدند و در برابر بانک داده‌های ژنومی موجود در NCBI بررسی شدند. هدف از این تجزیه و تحلیل، اطمینان از هم‌ردیفی آغازگرها با ژن هدف (HBZ) و شناسایی نواحی غیر اختصاصی احتمالی بود.

در نهایت، از نرم‌افزار SnapGene نسخه ۷.۲.۱ برای شبیه‌سازی عملکرد آغازگرها در شرایط آزمایشگاهی استفاده شد. قابلیت شبیه‌سازی ژل الکتروفورز این نرم‌افزار، برای بررسی طول قطعات تکثیر شده با آغازگر به کار رفت. این ویژگی امکان پیش‌بینی دقیق محصول PCR و مقایسه آن با نتایج واقعی آزمایشگاهی را فراهم کرد.

روش Touchdown PCR استفاده شد. این روش به صورت مرحله‌ای دما را کاهش داد. در ابتدا دمای بالا را برای افزایش اختصاصیت آغازگرها به کار گرفته و در نهایت دما بهینه تثبیت گردید.

مراحل دمایی برای هر دو مرحله از واکنش semi-nested PCR مشابه بود و شامل واسرشت اولیه، چرخه‌های تکراری واسرشت، اتصال و گسترش و در نهایت گسترش نهایی بود. برای دستیابی به نتایج دقیق و قابل اعتماد، تنظیمات دمایی و غلظت‌ها بر اساس آزمایش‌های متعدد اولیه، تعیین و بهینه‌سازی گردید (جدول ۳ و ۴).

جدول ۳: حجم مواد مورد نیاز در هر دو مرحله آزمایش semi-nested PCR

| مواد                            | حجم           |
|---------------------------------|---------------|
| مستر میکس آمپلیکون ۲x           | ۱۰ میکرولیتر  |
| آغازگر جلوبرنده (۱۰ میکرومولار) | ۰/۵ میکرولیتر |
| آغازگر معکوس (۱۰ میکرومولار)    | ۰/۵ میکرولیتر |
| آب مقطر استریل                  | ۷ میکرولیتر   |
| DNA الگو (۱۰۰-۱۰ نانوگرم)       | ۲ میکرولیتر   |
| حجم نهایی                       | ۲۰ میکرولیتر  |

جدول ۴: برنامه دمایی دستگاه ترموسایکلر برای هر دو مرحله آزمایش semi-nested PCR

| مرحله             | دما                | زمان     | تعداد چرخه |
|-------------------|--------------------|----------|------------|
| دناتوراسیون اولیه | ۹۵ درجه سانتی‌گراد | ۵ دقیقه  | ۱          |
| دناتوراسیون       | ۹۵ درجه سانتی‌گراد | ۴۵ ثانیه | ۴۰         |
| آنیلینگ           | ۶۲ درجه سانتی‌گراد | ۴۵ ثانیه |            |
| گسترش             | ۷۲ درجه سانتی‌گراد | ۴۵ ثانیه |            |
| گسترش نهایی       | ۷۲ درجه سانتی‌گراد | ۵ دقیقه  | ۱          |

#### تحلیل محصول PCR:

محصولات PCR جهت بررسی صحت و کیفیت، تحت تحلیل ژل الکتروفورز با ژل آگارز ۱/۵٪ قرار گرفتند. برای جداسازی قطعات، از ولتاژ ۱۰۰ ولت به مدت ۴۵ دقیقه استفاده شد. در مرحله اول semi-nested PCR، که طول

قطعه مورد نظر ۴۹۳ جفت باز بود، محصولات با استفاده از نشانگر ۱۰۰ bp الکتروفورز شدند. در مرحله دوم، به دلیل کوتاه‌تر بودن قطعه (۱۰۶ جفت باز)، نشانگر ۵۰ bp برای ارزیابی به کار رفت. جهت آشکارسازی، از رنگ Green Viewer استفاده شد که در مرحله آماده‌سازی ژل به آن افزوده شده بود. بررسی نهایی نتایج با دستگاه ژل داک و نرم‌افزار مربوطه انجام شد.

#### یافته‌ها

##### ۱- نتایج بیوانفورماتیکی:

برای بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های توالی‌ها، از ابزار هم ردیفی چندتایی MEGA6 استفاده شد. نتایج هم‌ردیفی نشان داد که ناحیه مورد نظر برای طراحی آغازگرها در ژن HBZ پس از هم ردیفی بیشترین شباهت را در میان ۴۳ توالی مختلف داشت. این ناحیه به دلیل حفظ ویژگی‌های بیولوژیکی در گونه‌های مختلف ویروس، به عنوان توالی هدف انتخاب شد (شکل ۱). پس از انتخاب ناحیه هدف، طراحی آغازگرها با استفاده از نرم‌افزار Gene Runner (ver.5.0.33) انجام شد و ویژگی‌های آن‌ها شامل دمای ذوب (Tm)، طول آغازگر، غلظت GC و ساختار ثانویه بررسی گردید. به منظور ارزیابی بیشتر آغازگرهای طراحی شده، آغازگرها با استفاده از ابزار blastn در پایگاه داده NCBI بررسی شدند. نتایج BLAST نشان داد که این آغازگرها هم‌پوشانی قابل توجهی با توالی‌های ژنومی سایر ویروس‌ها یا انسان‌ها ندارند. به ویژه در مقایسه با ویروس‌های هم‌خانواده یا مشابه، تطابق با توالی‌های غیر هدف پیدا نشد.

این نتیجه نشان‌دهنده دقت بالا و خاصیت انتخابی آغازگرها برای شناسایی دقیق ویروس HTLV-1 جهت پیش‌بینی عملکرد PCR، از نرم‌افزار SnapGene استفاده شد. در این مرحله، نقشه PCR برای هر دو مرحله semi-nested PCR طراحی گردید. برای مرحله اول که طول قطعه هدف ۴۹۳ نوکلئوتید بود، پیش‌بینی نرم افزار نشان داد که محصول PCR در شرایط آزمایشگاهی به درستی تکثیر خواهد شد. هم‌چنین مرحله دوم، که هدف ۱۰۶ نوکلئوتید بود، به دقت شبیه‌سازی شد (شکل ۳).

##### ۲- نتایج آزمایشگاهی:

نتایج آزمایشگاهی تأیید کرد که باندهای مورد نظر در ژل الکتروفورز برای نمونه‌های مثبت در هر دو مرحله

نمونه‌های منفی که شامل نمونه‌های اهداکنندگان سالم که از نظر ویروس HTLV-1 منفی بودند هم‌چنین نمونه‌های افراد مبتلا به سایر ویروس‌های انسانی (HIV، HCV، HBV و HSV) نتایج تمامی موارد منفی گزارش شد، که نشان‌دهنده ویژگی بالای آزمایش و عدم تقاطع با ویروس‌های دیگر بود.


PCR قابل شناسایی‌اند. در مرحله اول، باند مربوط به قطعه ۴۹۳ جفت بازی و در مرحله دوم، باند مربوط به قطعه ۱۰۶ جفت بازی به وضوح شناسایی شدند (شکل ۴). نمونه مثبت به طور صحیح در هر دو مرحله PCR مثبت تشخیص داده شدند و این امر صحت و دقت بالای روش طراحی شده را تأیید کرد. هم‌چنین، در آزمایش بر روی




شکل ۱: نتایج هم‌ردیفی ژن *HBZ* با استفاده از نرم‌افزار MEGA6. بر اساس هم‌ردیفی توالی‌های حفاظت شده در تمام ایزوله‌ها برای طراحی آغازگر انتخاب شدند.

|                                     | Description                                                                            | Scientific Name     | Max Score | Total Score | Query Cover | E value | Per. Ident | Acc. Len | Accession                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|----------|----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Human T-cell leukemia virus type I isolate IR(50) bZIP factor (HBZ) gene, complete cds | Human T-cell leu... | 811       | 811         | 82%         | 0.0     | 99.33%     | 621      | <a href="#">MN453097.1</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Human T-cell leukemia virus type I isolate IR(65) bZIP factor (HBZ) gene, complete cds | Human T-cell leu... | 811       | 811         | 82%         | 0.0     | 99.33%     | 621      | <a href="#">MN453132.1</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Human T-cell leukemia virus type I isolate MhD ATL3, complete genome                   | Human T-cell leu... | 811       | 811         | 82%         | 0.0     | 99.33%     | 9035     | <a href="#">MH399767.1</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Human T-cell leukemia virus type I isolate IR(39) bZIP factor (HBZ) gene, complete cds | Human T-cell leu... | 811       | 811         | 82%         | 0.0     | 99.33%     | 621      | <a href="#">MN453098.1</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Human T-cell leukemia virus type I isolate ATL MhD1, complete genome                   | Human T-cell leu... | 811       | 811         | 82%         | 0.0     | 99.33%     | 9035     | <a href="#">MH392265.1</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Human T-cell leukemia virus type I isolate IR(2) bZIP factor (HBZ) gene, complete cds  | Human T-cell leu... | 811       | 811         | 82%         | 0.0     | 99.33%     | 621      | <a href="#">MN453143.1</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Human T-cell leukemia virus type I isolate IR(37) bZIP factor (HBZ) gene, complete cds | Human T-cell leu... | 811       | 811         | 82%         | 0.0     | 99.33%     | 621      | <a href="#">MN453140.1</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Human T-cell leukemia virus type I isolate IR(5) bZIP factor (HBZ) gene, complete cds  | Human T-cell leu... | 811       | 811         | 82%         | 0.0     | 99.33%     | 621      | <a href="#">MN453103.1</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Human T-cell leukemia virus type I isolate IR(77) bZIP factor (HBZ) gene, complete cds | Human T-cell leu... | 811       | 811         | 82%         | 0.0     | 99.33%     | 621      | <a href="#">MN453126.1</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Human T-cell leukemia virus type I isolate IR(87) bZIP factor (HBZ) gene, complete cds | Human T-cell leu... | 811       | 811         | 82%         | 0.0     | 99.33%     | 621      | <a href="#">MN453122.1</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Human T-cell leukemia virus type I isolate MhD ATL5, complete genome                   | Human T-cell leu... | 811       | 811         | 82%         | 0.0     | 99.33%     | 9035     | <a href="#">MH399769.1</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Human T-cell leukemia virus type I isolate IR(45) bZIP factor (HBZ) gene, complete cds | Human T-cell leu... | 811       | 811         | 82%         | 0.0     | 99.33%     | 621      | <a href="#">MN453128.1</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Human T-cell leukemia virus type I isolate IR(16) bZIP factor (HBZ) gene, complete cds | Human T-cell leu... | 811       | 811         | 82%         | 0.0     | 99.33%     | 621      | <a href="#">MN453099.1</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Human T-cell leukemia virus type I isolate MhD ATL2, complete genome                   | Human T-cell leu... | 811       | 811         | 82%         | 0.0     | 99.33%     | 9035     | <a href="#">MH395864.1</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Human T-cell leukemia virus type I isolate IR(92) bZIP factor (HBZ) gene, complete cds | Human T-cell leu... | 809       | 809         | 80%         | 0.0     | 99.77%     | 621      | <a href="#">MN453137.1</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Human T-cell leukemia virus type I isolate IR(88) bZIP factor (HBZ) gene, complete cds | Human T-cell leu... | 806       | 806         | 82%         | 0.0     | 99.11%     | 621      | <a href="#">MN453121.1</a> |

شکل ۲: نتایج بلاست آغازگرهای طراحی شده برای ژن *HBZ* توسط نرم‌افزار آنلاین NCBI-BLAST. همان طور که در شکل مشاهده می‌شود، آغازگرهای طراحی شده با بیش از ۹۹٪ موارد ژن *HBZ* ویروس HTLV-1 تشابه داشتند.



شکل ۳: تصویر ارائه شده توسط نرم افزار SnapGene ، شبیه ساز ژل الکتروفورز محصول هر دو مرحله آزمایش semi-nested PCR با آغازگرهای طراحی شده در کنار نشانگر ۵۰ bp ، ستون ۱ مربوط به قطعه ۴۹۳ جفت بازی مرحله اول و ستون ۲ مربوط به قطعه ۱۰۶ جفت بازی مرحله دوم آزمایش semi-nested PCR.



شکل ۴: تصویر ژل الکتروفورز محصول هر دو مرحله آزمایش semi-nested PCR با آغازگرهای طراحی شده از چپ به راست ستون اول مربوط به نشانگر ۵۰ bp ، ستون دوم مربوط به قطعه ۴۹۳ جفت بازی مرحله اول و ستون سوم مربوط به قطعه ۱۰۶ جفت بازی مرحله دوم آزمایش semi-nested PCR

## بحث

این مطالعه پتانسیل استفاده از ژن *HBZ* را به عنوان یک هدف کارآمد جهت تشخیص ویروس *HTLV-1* نشان داد و می‌تواند در طراحی آزمایش‌های *PCR* کمی و کیفی به کار رود. همچنین، این مطالعه استفاده از روش *semi-nested PCR* راه‌اندازی شده را به عنوان یک ابزار تشخیصی حساس و اختصاصی جهت بررسی پروویروس *HTLV-1* پیشنهاد می‌کند. در هر دو مرحله آزمایش *PCR*، محصول تولیدی در اندازه‌های پیش‌بینی شده (۴۹۳ و ۱۰۶ جفت باز) در تمام نمونه‌های مثبت مشاهده شدند، در حالی که در تمامی نمونه‌های منفی و نمونه‌های حاوی سایر ویروس‌های شایع انسانی هیچ واکنش مثبتی دیده نشد. در بسیاری از مطالعه‌ها، طراحی آغازگرها به عنوان ابزاری مهم برای تشخیص دقیق عفونت‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. از آغازگرها در شناسایی ویروس‌ها و باکتری‌ها از طریق روش‌های مبتنی بر *PCR* استفاده می‌شوند. در مطالعه‌ای که توسط بیگوم و همکاران منتشر شده است، به طراحی آغازگرهای ویژه برای شناسایی انواع مختلف ویروس دلتا *SARS-CoV-2* پرداخته‌اند. در این مطالعه با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیکی توالی‌های محافظت‌شده ژنوم ویروس را شناسایی کرده و به طراحی آغازگرهای مناسب برای تشخیص سریع‌تر این ویروس پرداخته‌اند. همچنین از داده‌های بیوانفورماتیکی برای بهینه‌سازی انتخاب آغازگرها استفاده کردند تا دقت و حساسیت آزمون *PCR* بهبود یابد (۹).

این مطالعه از نظر استفاده از روش‌های بیوانفورماتیکی و طراحی آغازگرهای هدفمند، مشابه مطالعه کنونی بود و در هر دو مطالعه، هدف ارتقاء دقت تشخیص از طریق طراحی آغازگر برای نواحی محافظت‌شده ژنوم ویروس بود. اما تفاوت اصلی هدف این دو مطالعه در این است که بیگوم و همکاران، بیشتر بر روی انتخاب آغازگرهایی برای شناسایی و تمیز دادن انواع مختلف ویروس دلتا *SARS-CoV-2* تمرکز کرده‌اند، در حالی که در مطالعه ما، هدف طراحی آغازگر برای ناحیه ژنومی *HBZ* ویروس *HTLV-1* بود، که در طول زمان کم‌تر در معرض جهش قرار می‌گیرند و شناسایی دقیق آن می‌تواند چالش‌های مرتبط با تشخیص قطعی ویروس *HTLV-1* را برطرف کند.

در مطالعه‌ای که توسط ساندر گالگو و همکاران انجام شد، از ژن‌های *tax/rex* برای شناسایی پروویروس‌های

*HTLV-1* و *HTLV-2* در سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی استفاده شد. این مطالعه نشان داد که آزمایش *Nested PCR* دقت و حساسیت بالاتری در شناسایی این ویروس‌ها نسبت به روش‌های دیگر *PCR* دارد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که استفاده از آزمایش *Nested PCR* می‌تواند به ویژه برای تشخیص *HTLV* در مناطق غیر اندمیک با بار ویروسی پایین و در بیماران با علائم خفیف یا مراحل اولیه عفونت بسیار مفید باشد. همچنین، این روش در مقایسه با *PCR* تک مرحله‌ای توانایی تشخیص دقیق‌تر پروویروس را در نمونه‌هایی با غلظت کم *DNA* و حتی نمونه‌هایی با جواب‌های وسترن بلات نامشخص فراهم می‌کند (۱۰).

در مطالعه‌ای که توسط کاترینو دو اروجو و همکاران انجام شد، در ۶۹ نمونه خون ژن‌های *LTR*، *env* و *TAX* ویروس *HTLV* با آزمایش *PCR* ارزیابی گردید. نتیجه این مطالعه نشان داد در برخی از موارد در نمونه‌هایی که جواب وسترن بلات نامشخص دارند، ژن *TAX* قابل شناسایی نبوده و می‌تواند علت ایجاد جواب منفی کاذب و یا نامشخص باشد، در حالی که سایر ژن‌های ویروسی به طور حفاظت‌شده وجود دارند و در نتیجه برای تشخیص ویروس *HTLV* نیاز است که بیش از یک بخش از ناحیه ژنی ویروس را جستجو کرد (۸).

بیشتر روش‌های مولکولی تشخیصی *HTLV-1* بر اساس شناسایی ژن‌هایی هم‌چون *TAX* و *LTR* طراحی شده‌اند که به دلیل نقش اساسی این ژن‌ها در تکثیر و پاتوژنز ویروس، در شناسایی ویروس بسیار مفید هستند. با این حال، استفاده از این ژن‌ها در تشخیص *HTLV-1* محدودیت‌هایی دارد که می‌تواند بر دقت و حساسیت نتایج تأثیر بگذارد. انتخاب ژن‌های *LTR* و *env* به عنوان مناطقی جهت طراحی آغازگر ممکن است اختصاصیت لازم را نداشته باشد و استفاده از این نواحی با احتمال ایجاد واکنش متقاطع با سایر رتروویروس‌ها همانند *HIV-1* همراه می‌باشد که می‌تواند دقت نتایج را کاهش دهد. همچنین در مواردی با بارویروسی پایین ممکن است عملکرد ضعیفی داشته باشد. در حال حاضر آزمایش‌های تشخیصی *PCR* کمی و کیفی اکثراً بر پایه تشخیص و تکثیر ژن *TAX* ویروس *HTLV-1*، طراحی شده‌اند. اگر چه این ژن مختص ویروس *HTLV* بوده و انتظار می‌رود که ژنوم ویروس با اختصاصیت بالا تکثیر شود، مطالعه‌های قبلی

از منفی کارآمد است. هم‌چنین آزمون semi-nested PCR طراحی شده در این مطالعه می‌تواند به عنوان یک روش مؤثر برای شناسایی عفونت ویروس HTLV مورد استفاده قرار بگیرد.

### حمایت مالی

این پروژه توسط مرکز تحقیقات انتقال خون، مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون تأمین مالی شده است.

### ملاحظات اخلاقی

این مطالعه به تأیید کمیته اخلاق مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون رسیده است (کد اخلاق: IR.TMI.REC.1402.017).

### عدم تعارض منافع

هیچ‌گونه تعارض منافع در مطالعه حاضر وجود نداشته است.

### نقش نویسندگان

مهدی زندی: نگارش اولیه مقاله و تجزیه و تحلیل اطلاعات

دکتر زهره شریفی: طراحی مطالعه، نظارت بر اجرای طرح و نگارش نهایی مقاله

دکتر مهدی آجورلو: نظارت بر اجرای طرح پژوهشی و نگارش مقاله

### تشکر و قدردانی

این تحقیق حاصل پایان‌نامه کارشناسی ارشد زیست فناوری مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی انتقال خون ایران است. بدین وسیله از این مؤسسه به خاطر حمایت‌های مالی آن تشکر می‌شود.

نشان داده‌اند که در مواردی ژن TAX توسط روش‌های مولکولی قابل شناسایی نیست که می‌تواند منجر به تولید نتایج منفی کاذب یا نامشخص گردد (۸، ۱۱).

با توجه به این مشکلات، استفاده از ژن‌های دیگری که در برابر جهش‌های توالی مقاوم‌تر هستند و کمتر تحت تأثیر تغییرات قرار می‌گیرند، می‌تواند در افزایش دقت و حساسیت روش‌های تشخیصی مؤثر باشد. یکی از این ژن‌ها، HBZ می‌باشد. پروتئین HBZ از روی رشته منفی پروویروس کد می‌شود و به طور ثابت در طول عفونت ویروسی بیان می‌گردد. این خصوصیات باعث شده‌اند که ژن HBZ به عنوان یک هدف مناسب برای طراحی آغازگرها در تشخیص HTLV-1 مورد توجه قرار گیرد. در این مطالعه، به منظور بهبود دقت تشخیص و رفع مشکلات مربوط به جهش‌ها و میس‌مچ‌های موجود در آغازگرهای طراحی شده برای ژن‌های TAX و LTR، از ژن HBZ به عنوان هدف اصلی برای طراحی آغازگرهای اختصاصی استفاده شد. پیشنهاد می‌شود در مطالعه‌های آینده، بررسی آغازگرهای طراحی شده، در مقیاس‌های بالینی و در جمعیت‌های بزرگ‌تر انجام شود. هم‌چنین، بررسی پرووایرال لود و بیان ژن HBZ در نمونه‌های افراد مبتلا می‌تواند در درک بهتر دلایل ایجاد جواب‌های نامشخص آزمایش وسترن بلات مفید باشد.

### نتیجه‌گیری

استفاده از ژن HBZ برای تشخیص عفونت ویروس HTLV، به دلیل نقش آن در پاتوژنز ویروس و خصوصیات منحصر به فرد آن، به عنوان نقطه تمایز این مطالعه با تحقیقات پیشین که سایر بخش‌های ژنوم ویروس را بررسی کرده‌اند، است. نتایج به دست آمده در هر دو مرحله بررسی اینسلیکو و بررسی در محیط آزمایشگاه نشان می‌دهد که آغازگرهای طراحی شده برای ژن HBZ قادر به شناسایی ژن هدف بوده و در تمایز نمونه‌های مثبت

### References:

- Poiesz BJ, Ruscetti FW, Gazdar AF, Bunn PA, Minna JD, Gallo RC. Detection and isolation of type C retrovirus particles from fresh and cultured lymphocytes of a patient with cutaneous T-cell lymphoma. Proc Natl Acad Sci U S A 1980;77(12):7415-9. [DOI:10.1073/pnas.77.12.7415] [PMID]
- Baratella M, Forlani G, Raval GU, Tedeschi A, Gout O, Gessain A, et al. Cytoplasmic Localization of HTLV-1 HBZ Protein: A Biomarker of HTLV-1-Associated Myelopathy/Tropical Spastic Paraparesis (HAM/TSP). PLoS egl Trop Dis 2017;11(1):e0005285. [DOI:10.1371/journal.pntd.0005285] [PMID]

- 3- Hedayati-Moghaddam MR. A Systematic Review for Estimation of HTLV-I Infection in the Blood Donors of Iran. *Iran J Basic Med Sci.* 2013;16(3):196-201.
- 4- Proietti FA, Carneiro-Proietti AB, Catalan-Soares BC, Murphy EL. Global epidemiology of HTLV-I infection and associated diseases. *Oncogene.* 2005;24(39):6058-68. [DOI:10.1038/sj.onc.1208968] [PMID]
- 5- Kia V, Forouzandeh Moghadam M, Paryan M, Raz A, Mirab cation of HBV and HTLV-I viruses by Melting curve Samiee S. Simultaneous detection and identi analysis ofmultiplex Real-time PCR. *Molecular and Biochemical Diagnosis Journal* 2014;1(1):51-8.
- 6- Cánepa C, Salido J, Ruggieri M, Fraile S, Pataccini G, Berini C, *et al.* Low Proviral Load is Associated with Indeterminate Western Blot Patterns in Human T-Cell Lymphotropic Virus Type 1 Infected Individuals: Could Punctual Mutations be Related? *Viruses* 2015;7(11):5643-58. [DOI:10.3390/v7112897] [PMID]
- 7- Green MR, Sambrook J. Nested Polymerase Chain Reaction (PCR). *Cold Spring Harb Protoc.* 2019 Feb 1;2019(2). [DOI:10.1101/pdb.prot095182] [PMID]
- 8- Caterino-de-Araujo A, Campos KR. Defective particles of human T-lymphotropic virus and negative results in molecular assays. *Infect Genet Evol* 2021;96:105141. [DOI:10.1016/j.meegid.2021.105141] [PMID]
- 9- Begum KT, Wnaiza J, Absar N, Az S. In Silico Primer Design for Accurate Detection of SARS-CoV-2 Delta Variants. *JBCG* 2022;5:104. [DOI:10.17303/jbcg.2022.5.104]
- 10- Gallego S, Mangano A, Gastaldello R, Sen L, Medeot S. Usefulness of a Nested-polymerase chain reaction for molecular diagnosis of human T-cell lymphotropic virus type I/II. *Mem Inst Oswaldo Cruz.* 2004 Jun;99(4):377-80. [DOI:10.1590/S0074-02762004000400006] [PMID]
- 11- Blanco S, Frutos MC, Balangero MC, Gallego SV. Human T-Lymphotropic virus type 1 infection in absence of tax gene: A challenge for molecular diagnosis. *Infect Genet Evol* 2021;90:104765. [DOI:10.1016/j.meegid.2021.104765] [PMID]