

بیان ژن نوکلئوستمین در لوسمی حاد پرومیلوسیتیک در ارتباط با داروی ارسنیک تری اکسید و تمایز سلولی

دکتر فاطمه نادعلی^۱، دکتر کامران علی مقدم^۲، شهربانو رستمی^۳، دکتر اردشیر قوامزاده^۴

چکیده

سابقه و هدف

لوسمی حاد پرومیلوسیتیک (APL)، یک لوسمی حاد میلوئیدی تمایزپذیر است. سابقاً این تمایز توسط داروی ATRA امکان پذیر بوده، اما اخیراً داروی ارسنیک تری اکسید به این روش درمانی اضافه شده است. مکانیسم های سلولی تمایز در اثر این دارو هنوز به خوبی مشخص نگردیده است. در این مطالعه رابطه تمایز سلولی داروی ارسنیک با میزان بیان ژن نوکلئوستمین به عنوان یک عامل تکثیر سلولی، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.

مواد و روش ها

مطالعه انجام شده از نوع تحلیلی بود. در این مطالعه از سلول NB4 که یک رده لوسمی حاد پرومیلوسیتیک است استفاده شد و داروی ارسنیک با غلظت ۰/۵، ۱ و ۲ میکرومول بر روی آن اثر داده شد و پس از ۵ روز تاثیر دارو، از نقطه نظر تمایز سلولی با استفاده از مارکر تمایزی CD11b و از نقطه نظر مولکولی با استفاده از بررسی بیان ژن نوکلئوستمین با استفاده از Real Time - PCR مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آن با استفاده از آزمون من ویتنی بررسی و تحلیل شد.

یافته ها

بر اساس نتایج به دست آمده، غلظت ۰/۵ میکرومول از داروی ارسنیک نه تنها باعث ایجاد تمایز سلولی نشده بلکه باعث افزایش تکثیر سلولی در ده روز اول کشت گردید ولی غلظت یک میکرومول دارو پس از ۵ روز باعث افزایش درصد مارکر تمایزی CD11b از ۵/۲ به ۱۳/۶ درصد شد که این تفاوت معنی دار می باشد. هم چنین غلظت یک میکرومول داروی ارسنیک باعث کاهش بیان ژن نوکلئوستمین به صورت قابل توجه گردید و تعداد کپی ژن از ۱۳۰ به ۷۰ رسید که اختلاف آن معنی دار می باشد.

نتیجه گیری

بر اساس نتایج به دست آمده، غلظت یک میکرومول از داروی ارسنیک در مدت ۵ روز توانسته است افزایش جزئی در درصد CD11b ایجاد کند و در واقع باعث یک تمایز جزئی شده و در صورت افزایش مدت تماس دارو با سلول، ممکن است درصد بیان افزایش یابد. هم چنین افزایش درصد بیان CD11b و ایجاد تمایز سلولی همراه با کاهش بیان ژن نوکلئوستمین که یک عامل تکثیر سلولی می باشد همراه بوده است.

کلمات کلیدی: لوسمی حاد پرومیلوسیتیک، ارسنیک تری اکسید، RT-PCR

تاریخ دریافت: ۱۷/۵/۲۲

تاریخ پذیرش: ۱۸/۳/۴

- ۱- مؤلف مسئول: PhD هماتولوژی و بانک خون - استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - خیابان هزار جریب - کدپستی ۸۱۷۴۴-۱۷۶
- ۲- فوق تخصص خون و انکولوژی - دانشیار مرکز تحقیقات خون، انکولوژی و پیوند سلول های بنیادی بیمارستان دکتر شریعتی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
- ۳- دانشجوی PhD هماتولوژی و بانک خون - مرکز تحقیقات خون، انکولوژی و پیوند سلول های بنیادی بیمارستان دکتر شریعتی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
- ۴- فوق تخصص خون و انکولوژی - استاد مرکز تحقیقات خون، انکولوژی و پیوند سلول های بنیادی بیمارستان دکتر شریعتی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقدمه

لوسمی حاد پرومیلوسیتیک (APL)، یک زیر گروه لوسمی میلو بلاستیک است که با (۱۷؛ ۱۵) مشخص می شود و به درمان های تمایز دهنده از جمله (ATRA) ALL Trans Retinoic Acid پاسخ می دهد. اخیراً از داروی ارسنیک تری اکسید که قبلاً به عنوان کارسینوژن شناخته شده بود در درمان آن استفاده می شود (۱). در مطالعه های مختلف دیده شده که ATRA باعث تمایز انتهایی و توقف رشد سلولی در رده های مختلف سلولی لوسمی حاد پرومیلوسیتیک از جمله HL60، NB4 با مکانیسم مشخص می شود و این در حالی است که مکانیسم پاسخ سلولی نسبت به ارسنیک کاملاً مشخص نیست (۲-۴). مطالعه ها بر روی رده سلولی NB4 نشان داده که در غلظت بالای ارسنیک (۵-۲ میکرومول)، آپوپتوز و در غلظت کم آن (۵/۰-۱/۰ میکرومول)، تمایز انتهایی ایجاد می شود (۵). این تمایز انتهایی در سلول HL60 به صورت جزئی بوده و به ژن C-MYC نسبت داده شده است. در سلول های گرانولوسیتی تمایز شده، بیان مارکر CD11b افزایش داشته و این افزایش کمتر از ده درصد بوده است (۶).

با گسترش دامنه تحقیقات، دانش پزشکی در مورد ژن های دخیل در تکثیر و تمایز سلول های سرطانی افزایش چشمگیری داشته است. اخیراً پروتئین های هسته ای را یک عامل کنترل کننده رشد و تکثیر سلولی می دانند و یکی از این پروتئین ها به نام نوکلئوستمین می باشد. پروتئین نوکلئوستمین در سلول های بنیادی جنینی، بالغین و چندین رده سلولی دیده شده است و در طی تمایز سلولی از میزان آن کاسته می شود (۷).

پروتئین نوکلئوستمین در هستک سلول متمرکز است و ژن آن بر روی کروموزوم شماره ۳ قرار دارد. از نوکلئوستمین به عنوان عامل تکثیر سلول های استرومایی مغز استخوان افراد بالغ و موش نام برده شده است (۸، ۹). بیان ژن نوکلئوستمین در بافت طبیعی و غیر بدخیم کلیه و هم چنین انواع سرطان های کلیه و لنفوسیت های T طبیعی و فیرو بلاست ها مشاهده شده است (۱۰). بیان ژن نوکلئوستمین در جفت به دلیل وجود سلول های بنیادی دیده شده و با استفاده از SiRNA بر علیه نوکلئوستمین

توانسته اند قدرت تکثیر سلول Hela را کاهش دهند (۱۱). در بافت های سرطان معده و کبد و بافت های خوش خیم هیپر پلاستیک، بیان ژن نوکلئوستمین بالا بوده و در بافت های غددی پستانداران که در فاز نهایی تمایز بوده اند میزان آن کاهش داشته است (۱۲). از مطالعه هایی که تاکنون انجام شده مشخص می شود که نوکلئوستمین عامل دخیل در تکثیر سلولی اعم از تکثیر خوش خیم و بدخیم می باشد و با تمایز آن کاهش پیدا می کند. از آن جایی که در مورد نوکلئوستمین در سلول های هماتوپیتیک در منابع علمی گزارشی وجود نداشت، لذا بر آن شدیم که بیان آن را در لوسمی حاد پرومیلوسیتیک که یک لوسمی تمایز پذیر است، با استفاده از رده سلولی NB4 و داروی تمایز دهنده ارسنیک بررسی نماییم. بدین منظور داروی ارسنیک بر روی رده سلولی NB4 در محیط کشت اثر داده شد و اثر آن در سطح سلولی به وسیله فلوسیتومتری و در سطح مولکولی به وسیله Real Time-PCR مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش ها

مطالعه انجام شده از نوع تحلیلی بود.

کشت سلول:

رده سلولی لوسمی حاد پرومیلوسیتیک به نام NB4 از انستیتو پاستور ایران خریداری شد و در محیط کشت سلولی RPMI 1640 (جیبکو، انگلستان) با ۱۰٪ FBS کشت داده شده و در انکوباتور ۳۷°C قرار گرفت.

آماده سازی داروی ارسنیک تری اکسید و ATRA:

آمپول ۱۰ میلی گرمی ارسنیک تری اکسید (آلمان، مرک) تهیه شده و از آن رقت های مختلف در آب مقطر به دست آمد. هم چنین کپسول ۱۰ میلی گرم (آمریکا، رُوش) ATRA تهیه و به نسبت ۱/۵ با اتانول و DMSO به صورت محلول در آمد و سپس فیلتر گردید.

ایجاد تمایز سلولی:

سلول NB4 در فاز لگاریتمی رشد سلولی، در پلیت های ۶ خانه در حجم ۳ میلی لیتر به تعداد 5×10^5

واریانت به دست آمد و سپس توسط شرکت فرایند دانش (تهران - ایران) برای آن آغازگر طراحی شد و توسط کمپانی MWG آلمان سنتز شد. از ژن GAPDH به عنوان کنترل داخلی استفاده شد.

ابتدا با استفاده از محلول تریزول، از سلول‌ها RNA استخراج و از نظر کمی و کیفی بررسی شد و سپس با استفاده از آنزیم MMLV و راندوم هگزامر از روی RNA، سنتز cDNA صورت گرفت. سپس بخشی از ژن نوکلئوستمین به طول ۲۹۸ bp و بخش از ژن GAPDH به طول ۲۲۶ bp توسط PCR تکثیر شد و با استفاده از روش کلونینگ T/A، ژن‌های مورد نظر کلون شدند. سپس با رسم منحنی استاندارد برای این دو ژن، Real Time-PCR در مورد سلول‌های درمان شده با داروی ارسنیک و ATRA انجام شد، تعداد کپی ژن نوکلئوستمین قبل و بعد از درمان به دست آمد و در ارتباط با تمایز سلولی مورد بررسی قرار گرفت (نمودارهای ۲ و ۳). توالی آغازگرها و پروب‌های مورد استفاده عبارتند از:

GAPDH Forward 5-AAGGTGAAGGTCGGATCAA-3
GAPDH Reverse 5-GAAGATGGTGATGGGATTTTC-3
GAPDH Probe 5-CAAGCTTCCCGTTCTCAGCC-3
NS Forward 5-AGTTCCCAAAcAGTGCTCCC-3
NS Reverse 5-AAAGCCCCAACTCCTTTCC-3
NS Probe 5-CTA AAA CAG CAG CAG AAA CTT
GAC AGG C-3'

پروب‌ها در انتهای ۵' به وسیله FAM (6-carboxy-fluorescein phosphoramidite) و در انتهای ۳' به وسیله TAMRA (5-carboxytetramethyl-rhodamine) نشاندار شدند. واکنش Real Time-PCR با استفاده از دستگاه Lightcycler در حجم ۲۵ میکرولیتر و با دمای آنیلینگ برابر با ۵۸°C و ۳۵ سیکل انجام شد. واکنش‌ها به صورت دوتایی انجام شد و اگر میزان NS/GAPDH در دو واکنش بیش از ۲ برابر اختلاف داشت، آزمایش تکرار می‌شد. برای اندازه‌گیری حساسیت، سریال رقتی از رده سلولی NB4 تهیه شد و زمانی که cDNA از ۱ میکروگرم RNA تهیه شد تا رقت ۱۰^{-۵} قابل شناسایی بود.

نتیجه نهایی در این روش به صورت اندازه‌گیری کمی مطلق (Absolute Quantitative)، از طریق محاسبه تعداد کپی در نمونه به دست آمد.

سلول در هر میلی‌لیتر از محیط کشت، کشت داده شد. سپس غلظت‌های ۰/۵، ۱ و ۲ میکرومول از ارسنیک تری اکسید و غلظت یک میکرومول از ATRA بر روی سلول‌ها اثر داده شد. سلول‌ها به فاصله یک روز در میان پاساژ داده شد. تعویض محیط انجام شد و توسط لام هموسیئومتر نتوبار، تعداد آن‌ها شمارش و توسط رنگ‌آمیزی تریپان بلو درصد زنده بودن آن‌ها تعیین شد. جهت بررسی اثر داروها و ایجاد تمایز سلولی، بررسی CD11b توسط فلوسیتومتری انجام شد. هم چنین بیان ژن نوکلئوستمین قبل و بعد از درمان با دارو توسط Real Time-PCR مورد بررسی قرار گرفت. برای هر غلظت از دارو، آزمایش حداقل ۳ بار تکرار شد و میانگین اعداد به دست آمد.

فلوسیتومتری:

پس از ۱۵ روز تاثیر دادن سلول‌ها با داروی ارسنیک و ۵ روز داروی ATRA، سلول‌ها به روش زیر مورد فلوسیتومتری قرار گرفتند. ابتدا 2×10^5 سلول در حجم ۱۰۰ میکرو لیتر از PBS (آمریکا، سیگما) با ۵ میکرو لیتر از آنتی‌بادی موشی ضد CD11b انسانی (دانمارک، داکو) که با رنگ قرمز RPE نشان داده شده بود، مجاور و مدت نیم ساعت در حرارت یخچال و تاریکی قرار داده شد. هم چنین در لوله ایزوتیپ کنترل (کنترل منفی) از آنتی‌بادی موشی (دانمارک، داکو)، IgG1 که با فلوروکروم RPE نشان داده شده بود استفاده شد و لوله‌ها در حرارت ۴°C و در تاریکی به مدت نیم ساعت قرار داده شدند. سپس سلول‌ها با PBS به مدت ۱۰ دقیقه با دور ۱۰۰۰ rpm دو بار شسته و سانتریفوژ شدند و نتایج با استفاده از کولتر کانتر مدل Epics ساخت آمریکا به دست آمد.

Real Time-PCR:

سلول‌های NB4 که تحت تاثیر داروهای ارسنیک تری اکسید و ATRA قرار گرفته بودند، از نظر تعداد کپی نوکلئوستمین مورد بررسی قرار گرفتند. برای نوکلئوستمین در منابع، سه واریانت از cDNA با شماره‌های شناسایی ۲۰۶۸۲۶ و ۲۰۶۸۲۵ و ۵۱۴۳۶۶ وجود داشت که ابتدا توسط نرم‌افزار Aligment، مناطق مشترک بین این سه

به منظور کمی‌سازی، نوکلئوستمین در مقابل GAPDH نرمالیزه شد. برای آنالیز اطلاعات در دستگاه Light Cycler، از برنامه نرم‌افزاری دستگاه به نام Second Derivative Maximum Method استفاده شد. در این روش به طور خودکار تعداد سیکل Cross Point هر نمونه مشخص گردید. (Cross point هر نمونه نقطه‌ای است که در آن سیکل وارد فاز لگاریتمی شده و اندازه‌گیری کمی نهایی در این نقطه با مقایسه با Cross point های نمونه‌ها نسبت به منحنی استاندارد به دست می‌آید). نتایج به صورت تعداد کپی گزارش شد. تحلیل یافته‌ها توسط آزمون من‌ویتنی انجام شد.

یافته‌ها

سلول NB4 به مدت ۱۵ روز تحت تاثیر ۰/۵ میکرومول داروی ارسنیک قرار گرفت که در طول ۱۰ روز اول تعداد سلول‌ها افزایش داشته و ارسنیک باعث تکثیر سلولی گردید (جدول ۱). ولی از روز دهم تکثیر سلولی متوقف شد و آثار تمایز از جمله افزایش بسیار جزئی CD11b دیده شد و از طرف دیگر غلظت یک میکرومول ارسنیک توانست به مدت ۵ روز تمایز معنی‌داری را ایجاد کند و بیان ژن نوکلئوستمین نیز کاهش داشت. هم چنین سلول NB4 به مدت ۵ روز تحت تاثیر داروی ATRA قرار گرفت و آثاری از تکثیر سلولی مشاهده نشد در عوض افزایش قابل توجه مارکر CD11b و کاهش بیان ژن نوکلئوستمین مشاهده شد (جدول ۲).

لازم به توضیح است که در غلظت ۲ میکرومول ارسنیک در روز چهارم، فقط ۱۰٪ سلول‌ها زنده و بقیه

جدول ۱: افزایش تعداد سلول NB4 در غلظت ۰/۵ میکرومول ارسنیک تری اکسید

روز کشت	تعداد سلول در ۳ میلی‌لیتر	درصد زنده بودن سلول‌ها
روز اول	15×10^5	٪۹۹
روز سوم	84×10^5	٪۹۸
روز پنجم	164×10^5	٪۹۵
روز هفتم	180×10^5	٪۹۷
روز نهم	154×10^5	٪۹۹
روز یازدهم	72×10^5	٪۹۴

مرده بودند و باعث مرگ سلولی شده بود. هم چنین یک میکرومول از داروی ATRA باعث تکثیر سلولی و یا مرگ سلولی نگردید بلکه باعث تمایز سلولی شد.

جدول ۲: نتایج فلوسیتومتری CD11b ناشی از اثر ارسنیک تری اکسید و ATRA بر روی سلول NB4


نوع دارو	ایزوتیپ کنترل (٪)	آزمایش (٪)
NB4 بدون دارو	۲/۴	۵/۲
NB4 همراه با ۰/۵ میکرومول ارسنیک	۲/۵	۸/۴
NB4 همراه با یک میکرومول ارسنیک	۲	۱۳/۶
NB4 همراه با یک میکرومول ATRA	۲	۵۰/۹

غلظت ۰/۵ میکرومول داروی ارسنیک اختلاف معنی‌داری در درصد CD11b ایجاد نکرده ولی این اختلاف در غلظت یک میکرومول با $p < 0/001$ معنی‌دار بوده است و در غلظت یک میکرومول داروی ATRA، مارکر CD11b بر روی ۵۰/۹ درصد سلول‌ها بیان شده و اختلاف آن با $p < 0/001$ معنی‌دار می‌باشد (جدول ۲ و شکل ۱).

جدول ۳: نتایج اثر داروی ارسنیک و ATRA بر روی سلول NB4 به روش Real Time-PCR


نوع سلول و داروی مورد استفاده	تعداد کپی نوکلئوستمین
سلول NB4 بدون اثر دارو	۱۳۰
سلول NB4 + ۰/۵ میکرومول ارسنیک	۱۹۰
سلول NB4 + ۱ میکرومول ارسنیک	۷۰
سلول NB4 + ۱ میکرومول ATRA	۱۰
سلول NB4 + ۰/۵ میکرومول ارسنیک + یک میکرومول ATRA	۲۰

غلظت ۰/۵ میکرومول داروی ارسنیک باعث تمایز نشده ولی در غلظت یک میکرومول، یک تمایز جزئی با افزایش CD11b دیده می‌شود در حالی که در دوز یک میکرومول داروی ATRA به مدت ۵ روز، تمایز قابل




شکل ۱: درصد بیان CD11b در دوزهای مختلف داروها

A: ایزوتیپ کنترل NB4 B: تست NB4 C: ایزوتیپ کنترل غلظت ۰/۵ میکرومول ارسنیک D: آزمایش ۰/۵ میکرومول ارسنیک E: ایزوتیپ کنترل یک میکرومول ارسنیک F: آزمایش یک میکرومول ارسنیک G: ایزوتیپ کنترل یک میکرومول ATRA H: آزمایش یک میکرومول ATRA



نمودار ۲: منحنی استاندارد ژن GAPDH



نمودار ۳: منحنی استاندارد ژن نوکلئوستمین

و این در حالی است که بیان مارکر CD11b در این دوز داروی ATRA بیش از مصرف داروی ارسنیک بوده است (جدول ۲ و ۳).

بحث

لوسمی حاد پرومیلوسیتیک (APL)، یک زیر گروه از لوسمی‌هاست که به درمان‌های تمایز دهنده از جمله ATRA پاسخ می‌دهد و اخیراً از داروی ارسنیک تری اکسید که قبلاً به عنوان کارسینوژن شناخته شده بود در

توجهی با افزایش بیان CD11b دیده می‌شود (جدول ۲ و شکل ۱).

تعداد کمی نوکلئوستمین پس از ۵ روز درمان با غلظت ۰/۵ میکرومول از داروی ارسنیک تری اکسید نه تنها کم نشده بلکه مقداری نیز افزایش داشته و این در شرایطی است که تکثیر سلولی نیز افزایش داشته است (جدول ۳). در غلظت یک میکرومول ارسنیک، تعداد کمی ژن نوکلئوستمین کاهش واضح را نشان داده و بیشترین کاهش در استفاده از یک میکرومول داروی ATRA دیده می‌شود

که توسط گویانگ چن انجام شده، در یک سوم بیماران در هفته دوم تا سوم از شروع درمان، هیپرلوکوسیتوز مشاهده شده است (۱۳).

این یافته همانند مطالعه حاضر بر روی رده سلولی NB4 می باشد که در دوز نیم میکرومول، در ۱۰ روز اول افزایش تکثیر دیده شد. در این مطالعه رابطه بین تمایز سلولی و بیان ژن نوکلئوستمین در سلول NB4 مورد بررسی قرار گرفته است و همان گونه که در جدول ۳ نشان داده شده غلظت ۰/۵ میکرومول داروی ارسنیک نه تنها باعث کاهش بیان این ژن نشده بلکه افزایش نیز داشته است. شاید علت آن تکثیر سلولی در ده روز اول بوده و بیشترین میزان کاهش در بیان ژن نوکلئوستمین در غلظت یک میکرومول ارسنیک، ایجاد شده که این کاهش بیان، همراه با افزایش مارکر تمایزی CD11b بوده است. هم چنین در مقایسه با ارسنیک، داروی ATRA باعث بیان کاهش یافته ژن نوکلئوستمین به طور قابل توجهی شده که این مساله هم زمان با افزایش قابل توجه CD11b بر روی سلول ها بوده است. همان گونه که از نتایج بر می آید، قدرت تمایز دهندگی ATRA بیش از ارسنیک می باشد، ولی به علت مقاومت دارویی نسبت به ATRA، بیمار باید از داروهای دیگر استفاده کند که ارسنیک در زمره این داروهاست. نتایج مطالعه حاضر با مطالعه های دیگران از جمله لیوسی مبنی بر این که بیان ژن نوکلئوستمین در بافت های دارای هیپرپلازی خوش خیم و هم چنین سرطان معده و کبد بالاست و با تمایز سلولی کاهش پیدا می کند مطابقت دارد (۱۲). هم چنین با نتایج حاصل از مطالعه سی جین که توسط SiRNA توانسته خاصیت تکثیر سلولی Hela را مهار کند و بیان ژن کاهش پیدا کند مطابقت دارد و در کاهش تکثیر سلول بیان ژن تاثیر داشته است (۱۱).

در مطالعه حاضر ارسنیک توانسته است سلول ها را به سمت تمایز سلولی هدایت کند و از میزان بیان ژن نوکلئوستمین که یک عامل تکثیر سلولی است بکاهد.

نتیجه گیری

داروی ارسنیک توانسته است در غلظت یک میکرومول، باعث کاهش تکثیر سلولی و ایجاد تمایز جزئی پس از ۵ روز درمان با این دارو در سلول NB4 شود و این تمایز

درمان آن استفاده شده است (۱). بر اساس مطالعه های مختلف، مشخص شده که ATRA باعث تمایز انتهایی و توقف رشد سلولی در رده های مختلف سلولی لوسمی حاد پرومیلوسیتیک از جمله HL60 و NB4 با مکانیسم مشخص می شود، در حالی که مکانیسم پاسخ سلولی نسبت به ارسنیک کاملاً مشخص نیست (۴-۲). مطالعه ها بر روی سلول NB4 نشان داده که در غلظت بالای ارسنیک (۲-۰/۵ میکرومول)، آپوپتوز و در غلظت کم آن (۵-۰/۱ میکرومول) تمایز انتهایی ایجاد می شود (۵). هم چنین ژانگ نشان داده که غلظت ۰/۵-۲ میکرومول ارسنیک ایجاد آپوپتوز و غلظت ۰/۱-۰/۵ میکرومول آن تمایز جزئی ایجاد می کند (۱). در مطالعه حاضر، غلظت ۰/۵ میکرومول ارسنیک بر ایجاد تمایز سلولی بدون تاثیر بوده و باعث افزایش معنی دار مارکر CD11b که یک مارکر تمایز سلولی گرانولوسیتی و منوسیتی است نگردیده در حالی که غلظت یک میکرومول ارسنیک باعث افزایش جزئی و یک تمایز جزئی سلول NB4 به رده گرانولوسیتی شده و درصد CD11b از ۵/۲ درصد به ۱۳/۶ درصد افزایش پیدا کرده که اختلاف آن با $p < 0/001$ معنی دار می باشد (جدول ۱ و شکل ۱). این در حالی است که یک میکرومول داروی ATRA باعث افزایش ۱۰ برابری مارکر CD11b بر روی سلول NB4 گردیده است. هم چنین در مطالعه حاضر سلول NB4 در غلظت دو میکرومول دچار مرگ سلولی شده و فقط ۱۰٪ سلول ها در روز چهارم کشت زنده بودند و این همانند نتایج دیگران است که در غلظت دو میکرومول سلول ها دچار مرگ سلولی شده اند (۵).

گوشنگ یانگ در تاثیر ۵ روزه داروی ارسنیک بر روی سلول HL60 نشان داد که در غلظت ۰/۵ میکرومول دارو، افزایش CD11b به میزان کمتر از ۱۰٪ دیده می شود (۶). در مطالعه حاضر نیز همان گونه که در جدول ۲ دیده می شود، درصد CD11b از ۵/۲ درصد به ۱۳/۶ درصد رسیده و کمتر از ۱۰ درصد افزایش داشته است. در مطالعه حاضر همان گونه که در جدول ۱ نشان داده شد، سلول NB4 در طی ۱۰ روز اول افزایش پرولیفراسیون داشته و تمایز جزئی در غلظت نیم میکرومول از روز دهم به بعد که کاهش پرولیفراسیون اتفاق افتاده ایجاد شده است. در یک مطالعه

صورت گرفته است.

تشکر و قدردانی

مطالعه حاضر در مرکز تحقیقات خون، انکولوژی و پیوند سلول‌های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران به تصویب رسیده و با حمایت‌های مالی و تجهیزاتی آن مرکز انجام و به پایان رسیده است که بدین وسیله از کلیه مسئولین و پرسنل صمیمی آن مرکز تشکر و قدردانی می‌شود.

جزئی با کاهش بیان ژن نوکلئوستمین که یک عامل تکثیر سلولی می‌باشد همراه بوده است. در ضمن مشخص نیست که آیا تکثیر سلولی متوقف می‌شود و سپس تمایز اتفاق می‌افتد و یا این که پس از ایجاد تمایز، دیگر سلول قادر به تکثیر نیست که جا دارد از نظر سلولی و مولکولی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

در صورتی که بتوان توسط روش‌های مهار ژن نوکلئوستمین خاصیت تکثیر سلول‌های لوسمیک را کاهش داد، گام مهمی در جهت درمان این بیماران

References :

- 1- Zhang TD, Chen GQ, Wang ZG, Wang ZY, Chen SJ, Chen Z. Arsenic trioxide, a therapeutic agent for APL. *Oncogene* 2001; 20(49): 7146-53.
- 2- Breitman TR, Selonick SE, Collins SJ. Induction of differentiation of the human promyelocytic leukemia cell line (HL-60) by retinoic acid. *Proc Natl Acad Sci USA* 1980; 77(5): 2936-40.
- 3- Taimi M, Breitman TR. Growth, differentiation, and death of retinoic acid-treated human acute promyelocytic leukemia NB4 cells. *Exp Cell Res* 1997; 230(1): 69-75.
- 4- Kwong YL, Todd D. Delicious poison: arsenic trioxide for the treatment of leukemia. *Blood* 1997; 89(9): 3487-8.
- 5- Cai X, Yu Y, Huang Y, Zhang L, Jia PM, Zhao Q, *et al.* Arsenic trioxide-induced mitotic arrest and apoptosis in acute promyelocytic leukemia cells. *Leukemia* 2003; 17(7): 1333-7.
- 6- Jiang G, Albiñ A, Tang T, Tian Z, Henriksson M. Role of Myc in differentiation and apoptosis in HL60 cells after exposure to arsenic trioxide or all-trans retinoic acid. *Leuk Res* 2008; 32(2): 297-307.
- 7- Tsai RY, McKay RD. A nucleolar mechanism controlling cell proliferation in stem cells and cancer cells. *Genes Dev* 2002; 16 (23): 2991-3003.
- 8- Kafienah W, Mistry S, Williams C, Hollander AP. Nucleostemin is a marker of proliferating stromal stem cells in adult human bone marrow. *Stem Cells* 2006; 24 (4): 1113-20.
- 9- Yaghoobi MM, Mowla SJ, Tiraihi T. Nucleostemin, a coordinator of self-renewal, is expressed in rat marrow stromal cells and turns off after induction of neural differentiation. *Neurosci Lett* 2005; 390(2): 81-6.
- 10- Fan Y, Liu Z, Zhao S, Lou F, Nilsson S, Ekman P, *et al.* Nucleostemin mRNA is expressed in both normal and malignant renal tissues. *Br J Cancer* 2006; 94(11): 1658-62.
- 11- Sijin L, Ziwei C, Yajun L, Meiyu D, Hongwei Z, Guofa H, *et al.* The effect of knocking-down nucleostemin gene expression on the in vitro proliferation and in vivo tumorigenesis of HeLa cells. *J Exp Clin Cancer Res* 2004; 23(3): 529-38.
- 12- Liu SJ, Cai ZW, Liu YJ, Dong MY, Sun LQ, Hu GF, *et al.* Role of nucleostemin in growth regulation of gastric cancer, liver cancer and other malignancies. *World J Gastroenterol* 2004; 10(9): 1246-9.
- 13- Chen GQ, Shi XG, Tang W, Xiong SM, Zhu J, Cai X, *et al.* Use of arsenic trioxide (As₂O₃) in the treatment of acute promyelocytic leukemia (APL): I. As₂O₃ exerts dose-dependent dual effects on APL cells. *Blood* 1997; 89(9): 3345-53.

Nucleostemin gene expression in acute promyelocytic leukemia in relation to arsenic trioxide and cell differentiation

Nadali F.¹(PhD), Alimoghaddam K.²(MD), Rostami Sh.²(MS), Ghavamzadeh A.²(MD)

¹Pathology Department, Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Iran

²Hematology, Oncology and BMT Research Center of Shariati Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Iran

Abstract

Background and Objectives

Acute Promyelocytic Leukemia (APL) is one subtype of acute myeloblastic leukemia; it responds to differentiation using All-Trans Retinoic Acid (ATRA). Recently, arsenic trioxide (As₂O₃) has been added to this method. The cellular mechanism of differentiation therapy by arsenic is not yet clear. We decided to study the relationship between cell differentiation using arsenic trioxide and nucleostemin gene as a proliferation marker.

Materials and Methods

In this descriptive study, we treated NB4 cell (a cell line in APL) with 0.5, 1, and 2 µM of arsenic trioxide in 6 well plates for five days. Then, cellular differentiation was assessed by flowcytometry for CD11b. Nucleostemin gene expression was also assessed by Real Time PCR.

Results

According to the results, cell proliferation has occurred by 0.5 µM arsenic trioxide and no differentiation was observed during 10 days of culture. With 1 µM concentration of arsenic, CD11b has raised from 5.2% to 13.6% during five days of culture ($p < 0.001$). Moreover, 1 µM of arsenic caused decrease in nucleostemin gene copy number from 130 to 70.

Conclusions

According to the results, 1 µM of arsenic has increased CD11b in the cells and caused a partial differentiation during five days of culture. Increase in CD11b marker has also been associated with decrease in nucleostemin gene expression as a proliferation marker.

Key words: Leukemia, Promyelocytic, Acute, arsenic trioxide, RT- PCR
SJIBTO 2009; 6(1): 21-29

Received: 12 Aug 2008

Accepted: 25 May 2009

Correspondence: Nadali F., PhD of Hematology. Assistant professor of Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences. Hezar Jerib St. P.O.Box: 81744-176, Isfahan, Iran. Tel: (+98311) 7922475; Fax: (+98311) 6688597
E-mail: Nadalifa@yahoo.com