

Original Article

Investigating hypothyroidism in beta thalassemia patients receiving blood and determining its relationship with iron overload and iron removal treatment

Foroughi Ardakan R.¹, Hanachi P.¹, Azarkeivan A.², Arabkhazaeli A.²

¹Faculty of Biological Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran

²Blood Transfusion Research Center, High Institute of Research and Education in Transfusion Medicine, Tehran, Iran

Abstract

Background and Objectives

Blood transfusion in thalassemia patients has side effects such as endocrine iron overload. It is necessary to use iron chelators. The aim is to investigate the prevalence of hypothyroidism and its relationship with the level of iron overload and the results of the heart and liver MRI as a new method for diagnosing iron deposition, and iron removal treatment. Determining the factors affecting this complication can help prevent or improve it.

Materials and Methods

This cross-sectional study was conducted on 232 beta-thalassemia major and intermedia patients of Tehran adult thalassemia clinic in the year 1400 who were selected by convenient sampling method. The comparison of the level of thyroid hormones and ferritin was done with Chi-squared, independent t, Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests by SPSS 26.

Results

The prevalence of hypothyroidism in patients with an average age of 40.79 ± 9.02 year was 27.6%. There was no significant relationship between hypothyroidism with ferritin levels or heart and liver iron deposition. TSH level was significantly ($p= 0.01$) higher in men than women. Most of patients used combined iron chelators, but the type of drug was not significantly different.

Conclusions

It seems that iron overload may be effective in hypothyroidism, but it does not necessarily lead to it. Despite the treatment of iron deficiency, this complication is still one of the main problems. It is suggested to consider the amount of iron load and iron removal treatment before and after the onset of hypothyroidism in future studies.

Key words: Hypothyroidism, Thalassemia, Iron Overload, Iron Chelating Agents

Received: 14 Jun 2023

Accepted: 9 Aug 2023

Correspondence: Hanachi P., PhD of Biochemistry. Associate Professor of Faculty of Biochemistry Unit, Faculty of Biological Sciences, Alzahra University.

Postal Code: 1916799553, Tehran, Iran. Tel: (+9821) 88044040; Fax: (+9821) 88035187

E-mail: p.hanachi@alzahra.ac.ir

بررسی هیپوتیروئیدی در بیماران بتا تالاسمی دریافت کننده خون و تعیین ارتباط آن با میزان بار آهن و درمان آهن زدایی

راشین فروغی اردکان^۱، پریچهر حناچی^۲، آرزیتا آذرکیوان^۳، علی عرب خزانلی^۴

چکیده

سابقه و هدف

تزریق خون به عنوان درمان حیات بخش بیماری تالاسمی، عوارضی هم چون انباشته شدن آهن در غدد درون ریز را به دنبال دارد. در بدن هیچ راه دفع مؤثری برای آهن اضافی وجود ندارد، در نتیجه استفاده از شلاته کننده های آهن ضروری است. هدف این مطالعه، بررسی شیوع هیپوتیروئیدی و ارتباط آن با میزان بار آهن و نتایج MRI قلبی و کبدی به عنوان روش نوین تشخیص رسوب آهن و درمان آهن زدایی بود.

مواد و روش ها

این مطالعه مقطعی روی ۲۳۲ بیمار بتا تالاسمی ماژور و اینترمدیا درمانگاه تالاسمی بزرگسال تهران در سال ۱۴۰۰ که به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند، انجام شد. مقایسه سطح سرمی هورمون های تیروئیدی و فریتین با آزمون های کای دو، تی مستقل، من وینتی و کروسکال والیس، توسط نرم افزار SPSS ۲۶ انجام شد.

یافته ها

شیوع هیپوتیروئیدی در بیماران با میانگین سنی $9/02 \pm 40/79$ سال، $27/6\%$ به دست آمد و هیچ ارتباط معناداری میان ابتلا به هیپوتیروئیدی و فریتین و هم چنین رسوب آهن قلبی و کبدی یافت نشد. سطح هورمون TSH در مردان به طور معناداری بالاتر از زنان بود ($p=0/01$). اکثر بیماران از داروهای آهن زدای ترکیبی استفاده می کردند ولی نوع دارو در هیچ یک از دو گروه بیمار تفاوت معناداری نداشت.

نتیجه گیری

به نظر می رسد اضافه بار آهن در ابتلا به هیپوتیروئیدی مؤثر باشد اما لزوماً موجب آن نمی شود. علی رغم درمان آهن زدایی، این عارضه هنوز یکی از مشکلات اساسی است. پیشنهاد می شود در مطالعه های بعدی میزان بار آهن و درمان آهن زدایی، قبل و بعد از شروع کم کاری تیروئید در نظر گرفته شود.

کلمات کلیدی: هیپوتیروئیدی، تالاسمی، اضافه بار آهن، عناصر آهن زدا

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۵/۱۸

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی - دانشکده علوم زیستی دانشگاه الزهرا - تهران - ایران

۲- مؤلف مسئول: PhD بیوشیمی - دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشکده علوم زیستی دانشگاه الزهرا - تهران - ایران - کد پستی: ۱۹۱۶۷۹۹۵۵۳

۳- فوق تخصص خون و هماتولوژی کودکان - استاد مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون - تهران - ایران

۴- PhD آمار و اپیدمیولوژی - استادیار مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون - تهران - ایران

مقدمه

بتا تالاسمی از شایع‌ترین بیماری‌های ژنتیکی در ایران است که به صورت اتوزوم مغلوب به ارث می‌رسد و ۴/۸۳٪ از جمعیت جهان را درگیر کرده است (۱، ۲). این بیماری یکی از اختلالات ساخت هموگلوبین به شمار می‌آید که در آن به دلیل رخداد یک موتاسیون در ژن کروموزوم ۱۱، با کاهش سنتز زنجیره بتا و یا فقدان کامل آن روبه‌رو هستیم (۳). کمبود زنجیره بتا باعث افزایش نسبی ساخت زنجیره آلفا می‌شود که در داخل سلول‌های پیش‌ساز رده اریثروئیدی رسوب می‌کنند. این گلبول‌های قرمز به واسطه عدم توازن زنجیره‌ای، قبل از رسیدن به خون محیطی در داخل طحال از بین می‌روند (۴). این عارضه منجر به عمر کوتاه گلبول‌های قرمز و در نتیجه خونسازی غیر مؤثر می‌شود (۵).

اولین و بهترین خط درمانی در این بیماری، تزریق خون مکرر و منظم است. اگر چه تزریق خون برای این بیماران حیات‌بخش محسوب می‌شود اما عوارض متعددی هم به دنبال دارد (۶). در بدن یک فرد تالاسمی به دلیل افزایش تحریک خون‌سازی (هر چند غیر مؤثر)، جذب آهن از دستگاه گوارش افزایش می‌یابد (۷)، از طرفی یک بیمار تالاسمی به طور متوسط در طول یک سال ۱۸ واحد تزریق خون خواهد داشت که هر واحد کیسه خون با حجم متوسط ۴۵۰ میلی‌لیتر، حدود ۲۰۰ میلی‌گرم آهن دارد و این در حالی است که هر فرد روزانه تنها به ۲۵-۲۰ میلی‌گرم آهن برای سنتز هموگلوبین نیاز دارد (۱). در نتیجه با توجه به این که تزریق خون یک درمان مادام‌العمر برای بیمار محسوب می‌شود، بروز اضافه بار آهن یک عارضه قابل انتظار و مسئله‌ساز در بین این افراد خواهد بود (۸). در بدن فردی که دچار اضافه بار آهن شده است، ترانسفرین به صورت کامل اشباع می‌شود، در نتیجه بخش زیادی از آهن به صورت آزاد در پلاسما ظاهر خواهد شد که این پدیده موجب تسریع تشکیل رادیکال‌های آزاد هیدروکسیل و افزایش میزان ذخیره‌سازی و رسوب آهن در ارگان‌ها و اختلال در عملکرد آن‌ها می‌گردد. یکی از ارگان‌های تحت تأثیر این عارضه، غدد اندوکرین مخصوصاً غده تیروئید است (۹). از آن جایی که برخی از مواد معدنی و عناصر

مثل آهن، ید، سلنیوم و روی، برای متابولیسم طبیعی هورمون‌های تیروئیدی، حیاتی و ضروری هستند، تغییر در سطح این املاح می‌تواند منجر به تغییر در سطح هورمون‌های تیروئیدی و در نتیجه هیپوتیروئیدیسم شود (۱۰، ۷). به دلیل این که در بدن انسان هیچ راه دفع مؤثری برای آهن وجود ندارد، تنها راه کمک به این مسئله استفاده از شلاته‌کننده‌های آهن است که آهن اضافی را از طریق ادرار یا مدفوع دفع می‌کنند (۱۱).

به طور کلی مشخص شده است که فریتین سرم با ذخایر آهن بدن ارتباط دارد. با این حال، به عنوان یک پارامتر منفرد، همیشه قابل اعتماد نیست، زیرا به عنوان یک واکنش‌دهنده فاز حاد، تحت تأثیر عوامل دیگری مانند اختلالات التهابی، بیماری کبدی و انواع بدخیمی قرار دارد (۱۲). در سال‌های اخیر، روش‌های تصویربرداری رزونانس مغناطیسی هسته‌ای (MRI) برای ارزیابی بار آهن در کبد و قلب معرفی شده‌اند. پارامترهای R2 و T2* برای غلظت آهن کبد تایید شده است (۱۱). مطالعه‌ها نشان دادند تخمین غلظت آهن کبدی به واسطه این روش به طور قابل اعتمادی با کل ذخایر آهن بدن ارتباط دارد (۱۳).

هدف ما از این مطالعه بررسی شیوع کم‌کاری تیروئید، در بیماران بتا تالاسمی دریافت‌کننده خون و ارتباط آن با میزان بار آهن و درمان آهن‌زدایی بود به طوری که علاوه بر فریتین، از نتایج MRI قلبی و کبدی به عنوان یک روش نوین تشخیص رسوب آهن استفاده کرده‌ایم. چرا که امید داریم با تعیین عوامل مؤثر بر این عارضه و درمان آهن‌زدایی به موقع، بتوان به جلوگیری یا بهبود این عارضه کمک کرد.

مواد و روش‌ها

این مطالعه مقطعی بر روی بیماران بتا تالاسمی ماژور و اینترمدیا مراجعه‌کننده به درمانگاه تالاسمی بزرگسالان ظفر تهران که تحت تزریق مکرر خون بودند، انجام شد. تشخیص بیماری تالاسمی بر اساس جواب آزمایش ژنتیک، شرح حال و سابقه بالینی بیماران بوده است.

اطلاعات دموگرافیک بیماران از طریق یک پرسشنامه و با رضایت آگاهانه آنان ثبت گردید. معیارهای ورود به این

طوری که افراد با سطح TSH بالاتر از ۵/۲ mIU/L و سطح T3 و T4 پایین تر از محدوده طبیعی مشخص شده توسط کیت و یا بیمارانی که قرص لووتیروکسین مصرف می کردند، به عنوان افراد مبتلا به کم کاری تیروئید در نظر گرفته شدند.

در این مطالعه شلاته کننده های آهن، به سه دسته خوراکی، تزریقی و ترکیبی از این دو تقسیم بندی شد. به طوری که قرص Osveral، Nanojade، Jadenu، L1 و Exjade در دسته داروهای خوراکی و Desferal و Desfonak در دسته داروهای تزریقی قرار گرفتند.

کلیه محاسبات آماری توسط نرم افزار SPSS ۲۶ انجام شد. به منظور مقایسه میانگین متغیرهای کمی از آزمون تی مستقل و در صورت طبیعی نبودن توزیع داده ها از آزمون من ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد. هم چنین برای ارزیابی رابطه بین متغیرهای کیفی از آزمون کای دو (χ^2) و در صورت لزوم از آزمون دقیق فیشر استفاده شد. سطح معناداری آزمون ها $p < 0/05$ در نظر گرفته شد و به منظور بررسی طبیعی بودن توزیع اطلاعات از آزمون شاپیرو ویلکس استفاده شد. در رابطه با حجم نمونه، برای پیدا کردن اندازه اثر بزرگ بر مبنای نظر متخصصین و مرجع، خطای نوع اول ۰/۰۱ و قدرت ۰/۹۵ در نرم افزار G*Power محاسبه شد (۱۵).

یافته ها

در این مطالعه ۲۳۲ بیمار در محدوده سنی ۱۸ تا ۷۶ سال و با میانگین سنی $40/79 \pm 9/02$ سال بررسی شدند. در مجموع ۱۴۵ نفر (۶۲/۵٪) زن و ۸۷ نفر (۳۷/۵٪) مرد بودند. میانگین شاخص توده بدنی (BMI) بیماران $2/87 \pm 21/93$ بود. بیماران در چهار گروه سنی تقسیم بندی شدند که نشان می دهد گروه سنی ۳۱ تا ۴۰ سال بیشترین فراوانی معادل ۱۰۷ نفر (۴۶/۱٪) را شامل می شد و همواره در تمامی گروه ها، تعداد زنان از مردان بیشتر بود.

از بین ۲۳۲ بیمار بتا تالاسمی ماژور و ایترمدیا مورد مطالعه، ۶۴ نفر (۲۷/۶٪) مبتلا به کم کاری تیروئید بودند که ۳۶ نفر از آنان زن و ۲۸ نفر مرد بودند. هم چنین اطلاعات نشان داد که بین ابتلا به کم کاری تیروئید و جنسیت ارتباط


مطالعه شامل بیماران بتا تالاسمی بالای ۱۸ سال، بیمارانی که به طور منظم خون دریافت کرده اند و بیمارانی که در طول یک سال اخیر سابقه انجام MRI قلبی و کبدی داشتند و در پرونده پزشکی آنان ثبت شده، بود. معیارهای خروج از مطالعه شامل: بیماران بتا تالاسمی با سابقه ژنتیکی کم کاری تیروئید، بیماران با سابقه ابتلا به بیماری خود ایمنی تیروئید و یا زنان باردار، بود. سپس از ۲۳۲ بیماری که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، به اندازه ۸ میلی لیتر نمونه خون کامل جهت انجام آزمایش های TSH، Ferritin، T4 و T3 درون لوله لخته فاقد ضد انعقاد جمع آوری و حداکثر تا یک ساعت پس از نمونه گیری در شرایط دمایی ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد به آزمایشگاه منتقل شد. جهت تعیین میزان تمامی این پارامترها از کیت تشخیصی شرکت پیشتاز طب و دستگاه الیزا ریدر Vira VA2154 طبق دستورالعمل شرکت سازنده استفاده شد. اساس اندازه گیری کیت برای آزمایش Ferritin و TSH به روش ساندریج و برای آزمایش T3 و T4 به روش رقابتی با استفاده از آنتی بادی های مونوکلونال علیه این مولکول ها در ته چاهک ها طراحی شده است. لازم به ذکر است که مقادیر طبیعی فریتین با توجه به کیت الیزا شرکت پیشتاز طب، برای زنان ۲۰۰-۱۰۰۰ ng/mL و برای مردان ۳۰۰-۲۰۰۰ ng/mL و مقادیر طبیعی برای سطح هورمون های TSH، T4 و T3 به ترتیب ۰/۳۲-۵/۲ mIU/L، ۰/۳۲-۵/۲ $\mu\text{g/dL}$ و ۴/۷-۱۲/۵ ng/mL تعیین شد.

بر اساس راهنمای فدراسیون بین المللی تالاسمی، فریتین بالاتر از ۱۰۰۰ ng/mL به عنوان سرباری آهن در نظر گرفته شده است و بر همین مبنای درمان آهن زدایی آغاز می شود. هم چنین فریتین بالاتر از ۲۵۰۰ ng/mL به عنوان سرباری شدید آهن برای شروع درمان ترکیبی داروی L1 و دسفرال در نظر گرفته می شود (۱۴).

بیماران مورد مطالعه، در چهار گروه سنی ۱۸ تا ۳۰ سال، ۳۱ تا ۴۰ سال، ۴۱ تا ۵۰ سال و بالای ۵۰ سال گروه بندی شدند. بر اساس سطح هورمون های تیروئیدی شان نیز در دو گروه مبتلا به کم کاری تیروئید و غیر مبتلا به کم کاری تیروئید طبقه بندی شدند و کلیه آزمون ها و مقایسه ارتباطها بر همین مبنای انجام شد. به

جدول ۱: فراوانی بیماران بتا تالاسمی ماژور و اینترمدیا مبتلا و غیر مبتلا به کم کاری تیروئید به تفکیک گروه‌های سنی و تعیین ارتباط آن‌ها بر اساس آزمون کای دو (χ^2)

p value	مجموع (درصد)	کم کاری تیروئید		گروه‌بندی سنی
		ندارد (درصد)	دارد (درصد)	
۰/۶۸	۲۰ (۸/۶)	۱۵ (۸/۹)	۵ (۷/۸)	۱۸-۳۰ سال
	۱۰۷ (۴۶/۱)	۷۹ (۴۷/۰)	۲۸ (۴۳/۷)	۳۱-۴۰ سال
	۸۱ (۳۴/۹)	۵۹ (۳۵/۱)	۲۲ (۳۴/۳)	۴۱-۵۰ سال
	۲۴ (۳/۴)	۱۵ (۸/۹)	۹ (۱۴)	> ۵۰ سال
	۲۳۲ (۱۰۰)	۱۶۸ (۱۰۰)	۶۴ (۱۰۰)	مجموع



نمودار ۱: نمایش فراوانی مقدار عددی BMI در بیماران بتا تالاسمی ماژور و اینترمدیا مبتلا به کم کاری تیروئید. توزیع این شاخص در بین ۶۴ بیمار مبتلا به کم کاری تیروئید طبیعی بوده و میانگین ۲۱/۹۸ با انحراف معیار ۳/۴۸ را نشان می‌دهد.

وضعیت مطلوبی از نظر وزنی قرار داشتند (نمودار ۱). بین غلظت فریتین و گروه‌های سنی مختلف بیماران ارتباط معناداری وجود نداشت. هم‌چنین بین غلظت فریتین در زنان و مردان نیز تفاوت معناداری یافت نشد ولی از کل بیماران با سرباری شدید آهن، ۴۹ نفر (۶۵/۳٪) را زنان و ۲۶ نفر (۳۴/۷٪) را مردان تشکیل دادند. ۲۸ نفر (۴۳/۷٪) از بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید، فریتین زیر ۱۰۰۰ ng/mL و فقط ۱۶ نفر (۲۵٪) از آنان فریتین بالای ۲۵۰۰ ng/mL یا به عبارتی اضافه بار شدید آهن داشتند در حالی که این نرخ در گروه غیر مبتلا به کم کاری تیروئید بیشتر و معادل ۵۹ نفر (۳۵٪) بود. با این

معناداری وجود نداشت. ابتدا به این عارضه در تمامی گروه‌های سنی نیز با آزمون کای دو بررسی و تفاوت معناداری در هیچ یک از گروه‌ها مشاهده نشد. در هر دو گروه بیمار تالاسمی مبتلا و غیر مبتلا به کم کاری تیروئید، نزدیک به نیمی از آنان در گروه سنی ۳۱ تا ۴۰ سال قرار دارند، به طوری که ۲۸ نفر از بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید، معادل ۴۳/۷٪، در این گروه سنی جای گرفتند (جدول ۱). مقایسه میانگین BMI در هر دو گروه بیمار، هیچ ارتباط معناداری میان بیماران مبتلا و غیر مبتلا به کم کاری تیروئید و مقدار عددی BMI آن‌ها نشان نداد و این نتیجه حاکی از آن است که بیماران به طور میانگین در

درصد از بیماران مبتلا (۳۷/۷٪) و غیر مبتلا به کم کاری تیروئید (۳۶/۱٪) دارای اضافه بار ملایم آهن کبدی هستند. ۹٪ از بیماران غیر مبتلا به کم کاری تیروئید و فقط ۴/۹٪ از بیماران مبتلا دارای اضافه بار شدید آهن کبدی هستند. هیچ ارتباط معناداری میان دو گروه بیمار و رسوب آهن کبدی یافت نشد. همچنین بیشترین درصد از بیماران مبتلا (۷۰/۴٪) و غیر مبتلا به کم کاری تیروئید (۶۷/۴٪)، از لحاظ اضافه بار آهن قلبی در شرایط طبیعی هستند و در هیچ یک از گروه‌ها سرباری شدید آهن قلبی مشاهده نشد. هیچ ارتباط معناداری میان دو گروه بیمار و رسوب آهن قلبی یافت نشد (جدول ۳).


وجود تفاوت فریتین سرمی در هر دو گروه بیمار مورد بررسی قرار گرفت و هیچ ارتباط معناداری میان بیماران مبتلا و غیر مبتلا به کم کاری تیروئید و فریتین سرمی یافت نشد (جدول ۲).

در بررسی شلاته‌کننده های آهن، ۴۶ نفر (۱۹/۸٪) آهن‌زدا تزریقی، ۴۱ نفر (۱۷/۷٪) آهن‌زدا خوراکی و ۱۴۵ نفر (۶۲/۵٪) ترکیبی از هر دو را استفاده می‌کنند که بیشترین فراوانی متعلق به دسته آخر است. ولی هیچ تفاوت معناداری میان بیماران مبتلا و غیر مبتلا به کم کاری تیروئید در مصرف داروهای شلاته‌کننده آهن یافت نشد (نمودار ۲).

نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داد که بیشترین

جدول ۲: فراوانی بیماران بتا تالاسمی ماژور و اینترمدیا مبتلا و غیرمبتلا به کم کاری تیروئید و غلظت فریتین سرمی و تعیین ارتباط آن‌ها بر اساس آزمون کای دو (χ^2)

p value	مجموع	کم کاری تیروئید		غلظت فریتین (ng/mL)
		ندارد (درصد)	دارد (درصد)	
۰/۲۳	۹۹ (۴۲/۷)	۷۱ (۴۲/۳)	۲۸ (۴۳/۸)	< ۱۰۰۰
	۵۸ (۲۵)	۳۸ (۲۲/۶)	۲۰ (۳۱/۳)	۱۰۰۰-۲۵۰۰
	۷۵ (۳۲/۳)	۵۹ (۳۵/۱)	۱۶ (۲۵/۰)	≥ ۲۵۰۰
	۲۳۲ (۱۰۰)	۱۶۸ (۱۰۰)	۶۴ (۱۰۰)	مجموع




نمودار ۲: نمایش درصد فراوانی بیماران بتا تالاسمی ماژور و اینترمدیا به تفکیک نوع شلاته‌کننده آهن مصرفی و ابتلا به کم کاری تیروئید

سطح هورمون T3 در دو جنس تفاوت معناداری نداشت اما سطح هورمون TSH در مردان به طور معناداری بالاتر از زنان بود ($p=0/01$) (نمودار ۳). در حالی که سطح هورمون T4 در مردان به طور معناداری پایین‌تر از سطح این هورمون در زنان است ($p<0/01$) (نمودار ۴). لازم به ذکر است که با توجه به طبیعی نبودن توزیع داده‌ها، مقایسه هورمون‌های تیروئیدی به واسطه گزارش میان‌ه و چارک اول و سوم انجام شده است.


تجزیه و تحلیل آماری هیچ ارتباط معناداری بین سطح هورمون‌های تیروئیدی با گروه‌های مختلف سنی بیماران نشان نداد. اما نتایج جالبی در این مقایسه‌ها به دست آمد. به طوری که بالاترین سطح هورمون TSH و پایین‌ترین سطح هورمون T4 مربوط به گروه سنی بالای ۵۰ سال و پایین‌ترین سطح هورمون T3 مربوط به گروه سنی ۴۱ تا ۵۰ سال بود که می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که احتمال ابتلا به کم‌کاری تیروئید با افزایش سن بیشتر شده است.

جدول ۳: فراوانی بیماران بتا تالاسمی ماژور و اینترمدیا مبتلا و غیر مبتلا به کم‌کاری تیروئید بر اساس وضعیت رسوب آهن کبدی و قلبی و تعیین ارتباط آنها با آزمون کای‌دو (χ^2)

p-value	مجموع (درصد)	کم‌کاری تیروئید		سرباری آهن کبد
		ندارد (درصد)	دارد (درصد)	
0/88	۲۰ (۸/۸)	۱۴ (۸/۴)	۶ (۹/۸)	طبیعی
	۸۳ (۳۶/۶)	۶۰ (۳۶/۱)	۲۳ (۳۷/۷)	ملایم
	۶۸ (۳۰)	۵۰ (۳۰/۱)	۱۸ (۲۹/۵)	متوسط
	۳۸ (۱۶/۷)	۲۷ (۱۶/۳)	۱۱ (۱۸)	شدید
	۱۸ (۷/۹)	۱۵ (۹)	۳ (۴/۹)	خیلی شدید
	۲۲۷ (۱۰۰)	۱۶۶ (۱۰۰)	۶۱ (۱۰۰)	مجموع
				سرباری آهن قلب
0/51	۱۵۵ (۶۸/۳)	۱۱۲ (۶۷/۵)	۴۳ (۷۰/۵)	طبیعی
	۴۳ (۱۸/۹)	۳۰ (۱۸/۱)	۱۳ (۲۱/۳)	ملایم
	۱۸ (۷/۹)	۱۴ (۸/۴)	۴ (۶/۶)	متوسط
	۱۱ (۴/۸)	۱۰ (۶)	۱ (۱/۶)	شدید
	۰ (۰)	۰ (۰)	۰ (۰)	خیلی شدید
	۲۲۷ (۱۰۰)	۱۶۶ (۱۰۰)	۶۱ (۱۰۰)	مجموع



نمودار ۳: نمایش مقایسه میانه غلظت هورمون TSH و چارک‌ها در بیماران بتا تالاسمی ماژور و اینترمدیا به تفکیک جنسیت
(در زنان میانه: ۲/۵۱، چارک اول: ۱/۵، چارک سوم: ۳/۸)
در مردان میانه: ۲/۹، چارک اول: ۲/۰، چارک سوم: ۴/۹)



نمودار ۴: نمایش مقایسه میانه غلظت هورمون T4 و چارک‌ها در بیماران بتا تالاسمی ماژور و اینترمدیا به تفکیک جنسیت
(در زنان میانه: ۸/۸، چارک اول: ۷/۶، چارک سوم: ۱۰/۵)
در مردان میانه: ۷/۷، چارک اول: ۶/۳، چارک سوم: ۹/۳)

بحث

بین میزان کنونی فریتین سرم و اختلال عملکرد غده تیروئید یافت نشد. به طوری که از کل بیماران با سرباری شدید آهن، بیشترین فراوانی متعلق به گروه غیر مبتلا به کم‌کاری تیروئید بوده است. علاوه بر این، سطح فریتین سرم بین زنان و مردان متفاوت نبود. در مطالعه ما هیچ ارتباط معناداری میان بیماران مبتلا و غیر مبتلا به کم‌کاری

در مطالعه حاضر درصد فراوانی هیپوتیروئیدی در بیماران بتا تالاسمی ماژور و اینترمدیا، ۲۷/۶٪ به دست آمد و نسبت شیوع آن در خانم‌ها به آقایان ۱/۴۲ بود. در مقایسه میزان فریتین سرم در دو گروه مبتلا و غیر مبتلا به کم‌کاری تیروئید، نشان داده شد که هیچ ارتباط معناداری

رابطه مستقیمی را گزارش کردند. این موضوع شاید بدین علت باشد که فریتین سرم مقدار انباشتگی آهن در ۳ ماه گذشته را نشان می‌دهد، در حالی که ایجاد اختلالات غددی نیازمند تماس طولانی با آهن اضافی است. دلیل دیگر، احتمالاً اختلاف در روش اندازه‌گیری فریتین سرم، اختلاف نژادی، تفاوت در رژیم غذایی، اختلاف در مکان و زمان انجام مطالعه است (۲۲). با بهبود روش‌های درمانی در بیماران تالاسمی ماژور، یعنی تزریق مکرر و منظم خون از یک طرف و درمان شدید و منظم آهن‌زدایی از طرف دیگر، امید به زندگی در بیماران تالاسمیک افزایش یافته است که به همین علت تماس طولانی‌تر آهن انباشته بدن با غدد درون‌ریز، شانس اختلال عملکرد این ارگان‌ها را افزایش داده است (۲۳). به غیر از اضافه بار آهن، عوامل دیگری از جمله هایپوکسی مزمن ناشی از کم‌خونی می‌تواند مسئول آسیب به اندام‌ها باشد و ممکن است سمیت رسوب آهن در غدد درون‌ریز را تشدید کند (۷).

طاهر و سالیبا در ۲۰۱۷ اعلام کردند، روش T2*MIR و R2 یک روش غیر تهاجمی و مناسب برای تعیین میزان غلظت آهن به جای بیوپسی کبد است. از طرفی فریتین سرم توانایی محدودی برای تعیین اضافه بار آهن قلب دارد، اما می‌تواند به طور قابل اعتمادی سیدروز قلبی و بیماری غدد درون‌ریز را پیش‌بینی کند. از این رو توصیه می‌شود در صورت دسترسی امکانات، در کنار فریتین از روش‌های رزونانس هسته‌ای جهت تعیین اضافه بار آهن و برنامه‌ریزی برای دوز داروی شلاته‌کننده آهن مصرفی استفاده شود (۱۲). در مطالعه مقطعی که آتامکوسوما و همکارانش در ۲۰۲۱ بر روی ۶۲ بیمار بتا تالاسمی ماژور وابسته به تزریق خون انجام دادند، ارتباط ضعیفی بین فریتین سرم با سمیت آهن قلب و عملکرد سیستم قلب گزارش شد. این محققان اظهار داشتند که مسمومیت قلبی در بیماران تالاسمی تحت تأثیر عوامل دیگری به غیر از مسمومیت با آهن است و باید عوامل بیشتری در مطالعه‌ها در نظر گرفته شود (۲).

نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد اضافه بار آهن اعم از فریتین بالا و یا

تیروئید و رسوب آهن قلبی و کبدی یافت نشد و حتی می‌توان گفت که فراوانی افراد با رسوب شدید آهن کبدی، در گروه غیر مبتلا به کم‌کاری تیروئید بیشتر از گروه مبتلا به این عارضه بوده است. هم‌چنین بیشترین درصد از بیماران در هر دو گروه از لحاظ اضافه بار آهن قلبی در شرایط طبیعی بودند.

مالیک و همکاران هیپوتیروئیدی اولیه را در ۱۸ نفر (۲۵/۷٪) از ۷۰ بیمار گزارش کرده‌اند که تقریباً با نتیجه ما هم‌خوانی دارد (۱۶). هم‌چنین در مطالعه کاشانچی و پورهروی، فراوانی بیماری‌های غددی را در ۲۰۶ بیمار تالاسمی ماژور بررسی کردند، شیوع هیپوتیروئیدی ۲۰/۶۵٪ با نسبت ۱/۷۱ زن به مرد گزارش شد (۱۷). در حالی که در مطالعه مهرور و همکاران فراوانی هیپوتیروئیدی از بین ۴۳۷ بیمار تالاسمی ماژور و ایترمدیا، ۲/۲٪ گزارش شد و نسبت زن به مرد ۱/۴ بود (۱۸). که این نتیجه نسبت به مطالعه حاضر شیوع پایین‌تری را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش فدراسیون بین‌المللی تالاسمی، فراوانی کم‌کاری تیروئید در بیماران تالاسمی ماژور بین ۶ تا ۳۰ درصد است و این گستره متفاوت به دلیل تفاوت‌های ژنتیکی، قومیتی، سن و درمان‌های مختلف است (۱۹).

در مطالعه لکزیایی و همکاران در شهرستان زابل، از ۱۱۷ بیمار مورد بررسی، ۴۱/۸۸٪ فریتین کمتر از $1000 \mu\text{g/L}$ و ۵۸/۱۲٪ فریتین بین $1000-2000 \mu\text{g/L}$ داشتند که از این نظر تقریباً مشابه نتایج ما بود ولی بین میانگین طیف فریتین زنان و مردان تفاوت معناداری بود ($p=0/002$) (۲۰). اشراقی و همکارانش سال ۲۰۱۱ در بابل، در مطالعه‌ای که ارتباط عملکرد تیروئید کودکان با قد آنان و درمان آهن‌زدایی را بررسی می‌کرد، اعلام کردند بین کم‌کاری تیروئید و سطح فریتین سرم ارتباط معنادار پیدا نشد (۳). دکتر طباطبائی و همکاران نیز، تفاوتی بین سطح سرمی فریتین در بیماران تالاسمی که اختلال غدد درون‌ریز داشتند و عده‌ای که نداشتند مشاهده نکردند (۲۱). گزارش‌های ضد و نقیضی در مورد تاثیر آهن در بیماران تالاسمی ماژور بر روی عملکرد غده تیروئید وجود دارد و برخی از محققان بین سطح سرمی فریتین و عملکرد غده تیروئید

الزهره را به انجام رسیده است.

ملاحظات اخلاقی

در اجرای این پروژه کلیه موازین اخلاقی رعایت شده و اطلاعات دموگرافیک بیماران از طریق یک پرسشنامه و با رضایت آگاهانه آنها جمع‌آوری شده است. این پروژه دارای کد اخلاق IR.ALZAHRA.REC.1401.110 از دانشگاه الزهرا می‌باشد.

عدم تعارض منافع

نویسندگان این مقاله اعلام می‌دارند که در نگارش مقاله، هیچ‌گونه تعارضی در منافع نبوده است.

تشکر و قدردانی

این مطالعه حاصل پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی دانشگاه الزهرا است و بدین وسیله از مدیریت و پرسنل درمانگاه تالاسمی و بیماران تالاسمی عزیز که ما را در پیشبرد و تحقق این هدف یاری نمودند، کمال تشکر را داریم.

رسوب آهن در ارگان‌ها، می‌تواند تا حدودی در ابتلا به کم‌کاری تیروئید مؤثر باشد اما لزوماً بیمارانی که اضافه بار آهن دارند، کم‌کاری تیروئید ندارند. هم‌چنین علی‌رغم درمان آهن‌زدایی، اضافه بار آهن هنوز یکی از عوارض اصلی تالاسمی به شمار می‌آید. با توجه به افزایش فراوانی هیپوتیروئیدی با افزایش سن و اثر مستقیمی که جمله کنترل منظم عملکرد غده تیروئید با آزمایش‌های دوره‌ای اندازه‌گیری TSH و T4 سرم، قدم مهمی در تشخیص زودرس بیماری و کنترل و درمان آن می‌باشد.

پیشنهاد می‌شود به منظور دستیابی به نتایج دقیق‌تر، در مطالعه‌های بعدی نقطه صفر شروع کم‌کاری تیروئید در بیماران را در نظر گرفته و میزان بار آهن و درمان آهن‌زدایی در زمان قبل و بعد از بروز عارضه بررسی شود. هم‌چنین بهتر است مطالعه‌های بعدی روی گستره محدودتر سنی و تعداد برابر زنان و مردان انجام شود.

حمایت مالی

این مطالعه حاصل پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی است و با حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه

References:

- 1- Azarkeivan A. Comprehensive package of medical services in thalassemia patients. 2nd ed. Ahvaz: Motabar; 2015. p. 27-42. [Persian]
- 2- Atmakusuma TD, Kalwani R, Nasution SA, Rumende CM. Correlation of Serum Ferritin and Cardiac Iron Toxicity with Cardiac Function in Transfusion Dependent Beta-Thalassemia Major Patients. Acta Med Indones 2021; 53(3): 291-8.
- 3- Eshraghi P, Tamaddon A, Zarifi K, Mohammadhasani A, Aminzadeh M. Thyroid function in major thalassemia patients: Is it related to height and chelation therapy? Caspian J Intern Med 2011; 2(1): 189-93.
- 4- Cao A, Galanello R. Beta-thalassemia. Genetics in medicine: official journal of the American College of Medical Genetics 2010; 12(2): 61-76.
- 5- Oikonomidou PR, and Rivella S. What can we learn from ineffective erythropoiesis in thalassemia? Blood Rev 2018; 32(2): 130-43.
- 6- Motta I, Bou-Fakhredin R, Taher AT and Cappellini MD. Beta Thalassemia: New Therapeutic Options beyond Transfusion and Iron Chelation. Drugs 2020; 80(11): 1053-63.
- 7- Shah FT, Porter JB, Sadasivam N, Kaya B, Moon JC, Velangi M, Ako E & Pancham S. Guidelines for the monitoring and management of iron overload in patients with haemoglobinopathies and rare anaemias. Br J Haematol 2022; 196(2): 336-50.
- 8- Sehat R, Shahabi Satalar E, Hanachi P. Correlation between iron status, TIBC and ferritin and thyroid hormone levels in patients referred to the medical diagnosis laboratory of Shourideh Hospital in Mashhad. Journal of Paramedical Faculty of Tehran University of Medical Sciences (Piyavard Salamat) 2018; 13(2): 133-40. [Article in Farsi]
- 9- Al-Moshary M, Imtiaz N, Al-Mussaied E, Khan A, Ahmad S and Albqami S. Clinical and Biochemical Assessment of Liver Function Test and Its Correlation with Serum Ferritin Levels in Transfusion-dependent Thalassemia Patients. Cureus 2020; 12(4): e7574.
- 10- Yousaf HMS, Sarfraz L, Hussain ST. Prevalence of Hypothyroidism in Patients of Beta Thalassemia Receiving Blood Transfusion. JSZMC 2018; 9(3): 1453-55.
- 11- Ali S, Mumtaz S, Shakir HA, Khan M, Tahir HM, Mumtaz S, Mughal TA, Hassan A, Kazmi SAR, Sadia, Irfan M and Khan MA. Current status of beta-

- thalassemia and its treatment strategies. *Mol Genet Genomic Med* 2021; 9(12): e1788.
- 12- Karimi M, Zarei T, Haghpanah S, Azarkeivan A, Kattamis C, Ladis V, et al. Evaluation of endocrine complications in beta-thalassemia intermedia (β -TI): a cross-sectional multicenter study. *Endocrine* 2020; 69(1): 220-7.
 - 13- Taher AT & Saliba AN. Iron overload in thalassemia: different organs at different rates. *Hematology* 2017; (1): 265-71.
 - 14- Zarghami P. Examining the frequency of variants c.-153C > T and c.-582A > G in the gene encoding the hormone hepcidin and its relationship with iron accumulation in thalassemia patients receiving blood referred to Zafar thalassemia clinic. [Dissertation]. [Tehran]: Transfusion Medicine Institute; 2017. p. 88.
 - 15- Jabbar Kadhum S. The Prevalence of Hypothyroidism among Patients with Beta-Thalassemia Major, Western Iraq. *Iraqi Postgraduate Medical Journal* 2018; 17(2): 170-4.
 - 16- Malik S, Ahmed N. Complications in transfusiondependent patients of B-thalassemia major. *Pak J Med Sci* 2009; 25(4): 678-82.
 - 17- Kashanchi Langroudi M, Abdul Rahim Porheravi H. Prevalence of diabetes, hypothyroidism and hypoparathyroidism in thalassemia major patients Referred to Shahid Dr. Mohammad Javad Bahnar Hospital in Karaj. *Blood Research Quarterly* 2012; 9(4): 422-8. [Article in Farsi]
 - 18- Mehrvar A, Azarkivan A, Sabrinejad J, Mehrvar N, Franoush M, Vathouq P. Hypothyroid and hypoparathyroid problems in patients with beta thalassemia Referred to adult thalassemia center in 1383 to 1384. *Blood Research Quarterly* 2008; 5(1): 53-9. [Article in Farsi]
 - 19- Cappellini MD, Cohen A, Porter J, Taher, A & Viprakasit, V. [Guidelines for the management of transfusion dependent thalassemia (TDT)] 3rd ed. Cyprus: Thalassemia International Federation; 2014. p. 120.
 - 20- Lakzaei H, Shahdadi H, Abdolahi Mohamad A, Dehmordeh M. Investigation of serum ferritin level in patients with thalassemia major in the thalassemia department of Amiral Mominin Hospital in Zabol city in 2011. *Research Quarterly of Zabol University of Medical Sciences* 2013; 5(1): 27-31. [Article in Farsi]
 - 21- Tabatabaie SM, Abdollah Shamsheeraz A, Bakhirnia MR, Kamghar M, Bozari N, Pourzahedeh Gilani N, et al. Metabolic and endocrinologic complications in beta-thalassemia major. A Multicenter study in Tehran. *Iran South Med* 2002; 1: 63-72.
 - 22- Pignatti C, Rugolotto S, De Stefano P, Zhao H, Forni G, Piga A, et al. Survival and complication in patients with beta thalassemia major. *Haematologica* 2004; 89(11): 87-93.
 - 23- Pinto VM and Forni GL. Management of Iron Overload in Beta-Thalassemia Patients: Clinical Practice Update Based on Case Series. *Int J Mol Sci* 2020; 21(22): 8771.