



Outcomes of Spiritual/Religious Interventions in the Care of Patients with Beta Thalassemia Major: A Narrative Review

Zohreh Badipeymaiejahromi¹ , Rasool Rassoli Emadi¹

¹Department of Medical-surgical Nursing, School of Nursing, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran



Received: 2025/07/22
Accepted: 2025/09/06



<http://dx.doi.org/10.66224/bloodj.22.4.336>

Citation:

Badipeymaiejahromi Z., Rassoli Emadi R. Outcomes of Spiritual/Religious Interventions in the Care of Patients with Beta Thalassemia Major: A Narrative Review. J Iran Blood Transfus. 2025; 22 (4): 336-345

Correspondence:

Badipeymaiejahromi Z., Associate professor of School of Nursing, Jahrom University of Medical Sciences.
P.O.Box: 46199-74148, Jahrom, Iran.
Tel: (+9871) 54475601
E-mail:
z.badipeyma@jums.ac.ir

ABSTRACT

Background and Objectives

Management of beta thalassemia patients is essential yet complex, given that the disease has a poor prognosis. These patients have diverse physical, psychological, and emotional needs. Evidence indicates that they also have a high level of spiritual needs and are willing to receive spiritual care. The aim of this narrative review is to examine the outcomes of spiritual/religious interventions for patients with beta thalassemia major based on previous studies.

Materials and Methods

For this review study data were collected by searching Persian and English articles published between 2010-2024. Searches were conducted in the Google Scholar and the following databases: Web of Science, Scopus, Pubmed, SID, ISC and Magiran. The search keywords included spiritual, spirituality, religious, and thalassemia. Inclusion were limited to studies that evaluated the effect of spiritual or religious interventions on patients with major thalassemia in Iran. The initial search found 52 articles. After applying the inclusion and exclusion criteria, 6 quantitative articles (comprising 5 quasi-experimental studies and 1 clinical trial) were selected to review

Results

Based on the review of studies, it was determined that providing spiritual/religious interventions to patients with major thalassemia was found to reduce depression, stress, fatigue, and psychological distress, while improving life expectancy, resilience, spiritual health, self-efficacy, and pain self-efficacy.

Conclusions

Based on the reviewed studies, spiritual and religious interventions appear to positively affect on spiritual well-being, psychological states, and life expectancy in patients with beta-thalassemia major. However, the limited number of existing studies, precludes definitive recommendations regarding the integration of these interventions into standard clinical care. Therefore, future research should prioritize rigorously designed, evidence-based interventional studies to evaluate the effectiveness of such approaches for this patient population.

Key words: beta-Thalassemia, Religion and Medicine, Patient Care



Copyright © 2025 Journal of Iranian Blood Transfusion, Published by Blood Transfusion Research Center.
This work is licensed under a Creative Common Attribution-Non Commercial 4.0 International license.



پیامدهای مداخلات معنوی - مذهبی در مراقبت از بیماران بتا تالاسمی ماژور: یک مرور روایتی

زهره بادیه پیمای جهرمی^۱ ID، رسول رسولی عمادی^۲

۱- دکترای پرستاری داخلی جراحی - دانشیار دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم - جهرم - ایران
۲- کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی - دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم - جهرم - ایران

چکیده

سابقه و هدف

درمان و حمایت بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور امری ضروری و پیچیده است. بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور نیازهای جسمی، روحی - روانی و عاطفی متنوعی دارند. شواهد، نشان‌دهنده سطح بالایی از نیازهای معنوی بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور و تمایل این بیماران به دریافت مداخله معنوی - مذهبی می‌باشد. هدف این مرور روایتی، بررسی پیامدهای گزارش شده مداخلات معنوی - مذهبی در بیماران بتا تالاسمی ماژور در مطالعه‌های پیشین در ایران بود.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه مروری برای جمع‌آوری داده‌ها در موتور جستجوی گوگل اسکالر و پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی و انگلیسی (Web of science، Scopus، Pubmed، SID، ISC، magiran) با محدودیت زمانی ده ساله (۲۰۱۰-۲۰۲۴) مقاله‌های فارسی و انگلیسی جستجو شد. کلید واژه‌های جست و جو شامل معنوی، معنویت، مذهبی و تالاسمی بودند. معیار ورود شامل مطالعه‌هایی بودند که به بررسی تأثیر مداخلات معنوی - مذهبی بر بیماران تالاسمی ماژور پرداخته بودند. در جستجوی اولیه ۵۲ مقاله یافت شد که پس از اعمال معیارهای ورود و خروج، ۶ مقاله کمی (شامل ۵ مطالعه نیمه تجربی و یک مطالعه کارآزمایی بالینی) مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها

بر اساس مرور مطالعه‌ها، مشخص گردید که ارائه مداخلات معنوی - مذهبی به افراد مبتلا به بتا تالاسمی ماژور، باعث کاهش افسردگی، استرس، خستگی و پریشانی روانشناختی گردیده و امید به زندگی، تاب‌آوری، سلامت معنوی، خود کارآمدی و خود کارآمدی درد را نیز بهبود بخشیده است.

نتیجه‌گیری

با توجه به مطالعه‌های مرور شده، به نظر می‌رسد مداخلات معنوی - مذهبی می‌توانند تأثیرات مثبتی بر سلامت معنوی، حالت‌های روحی - روانی و امید به زندگی بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور داشته باشند. با این حال، با توجه به محدود بودن مطالعه‌های موجود، ارائه توصیه قطعی برای به کارگیری این مداخلات در مراقبت‌های بالینی امکان‌پذیر نیست. بنابراین، انجام مطالعه‌های مداخله‌ای با طراحی‌های دقیق و مبتنی بر شواهد، برای ارزیابی اثربخشی این مداخلات در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور ضروری به نظر می‌رسد.

کلمات کلیدی: بتا تالاسمی، مذهب و پزشکی، مراقبت از بیمار



تاریخ دریافت: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵

doi <http://dx.doi.org/10.66224/bloodj.22.4.336>

Citation:

Badiyepymaiejahromi Z, Rassoli Emadi R. Outcomes of Spiritual/ Religious Interventions in the Care of Patients with Beta Thalassemia Major: A Narrative Review. J Iran Blood Transfus. 2025; 22 (4): 336-345

دکتر زهره بادیه پیمای جهرمی. دانشیار دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم - ایران

صندوق پستی: ۴۶۱۹۹-۷۴۱۴۸

E-mail: z.badiyepyma@jums.ac.ir

مقدمه

بتا تالاسمی یک بیماری ارثی مرتبط با خون است که در پی آن فرد دچار درجات مختلفی از کم خونی می‌شود (۱). در نوع شدید آن (بتا تالاسمی ماژور) بیماران جهت بقا نیازمند تزریق مرتب خون و استفاده از داروهای دفع‌کننده آهن در طول عمر خود می‌باشند (۲). بیماری بتا تالاسمی ماژور از شیوع بالایی در کل دنیا و به خصوص در کشور ایران برخوردار است و از این نظر جزو شایع‌ترین و مهم‌ترین بیماری‌های مزمن به شمار می‌رود (۳، ۴). در کشورهای غربی، شیوع این بیماری بسیار کم است. به عنوان مثال، در ایالات متحده آمریکا تنها حدود هزار بیمار مبتلا به بتا تالاسمی ماژور وجود دارد، در حالی که در استان فارس، که فقط ۱۲۰۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد، تعداد این بیماران بیش از دو برابر آمریکا یعنی در حدود ۲۵۰۰ نفر است. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، ۴ درصد از جمعیت کشور ایران ناقل بتا تالاسمی (تالاسمی مینور) هستند (۶، ۵). اکثر این بیماران در گروه سنی کودک و نوجوان قرار دارند و ممکن است دچار تغییرات جسمانی، شناختی، روانی و اجتماعی شوند (۷). این بیماری علاوه بر آن که مشکلات سخت جسمی مانند کم خونی، بزرگی طحال، نارسایی قلب، بلوغ دیررس و غیره ایجاد می‌کند، می‌تواند باعث بروز مشکلات روحی - روانی متعددی از جمله: استرس، خستگی، افسردگی، اختلالات خواب، اختلال در کیفیت زندگی، کاهش میزان تاب‌آوری، کاهش سلامت روانی و کاهش میزان معنویت بیماران نیز شود (۸).

بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور تحت فشارهای متعددی از جمله احساس حقارت، اضطراب و افسردگی در ارتباط با تحصیل، کار، اشتغال، مسائل رفاهی و خانوادگی هستند که همه این عوامل باعث ایجاد اختلالات روحی و روانی آن‌ها می‌شود. با توجه به این موارد حمایت عاطفی و روحی - روانی، جنبه بسیار مهمی از زندگی بیماران می‌باشد (۹).

در حال حاضر علاوه بر درمان جسمی بیماران بتا تالاسمی ماژور، توجه به مشکلات روحی - روانی و ارائه مراقبت جهت برطرف کردن این مشکلات از اهمیت بالایی برخوردار است. پرستاران، مهم‌ترین افرادی هستند که با بیماران در ارتباط هستند و می‌توانند تأثیر به‌سزایی در برطرف کردن مشکلات داشته باشند. روش‌ها و مداخله‌های فراوانی جهت تأثیرگذاری بر بعد روحی، روانی و معنوی زندگی بیماران وجود دارد. از جمله آن‌ها می‌توان به ارائه


مراقبت معنوی و معنویت درمانی اشاره کرد. معنویت و باورهای مذهبی در بیماران مزمن به ویژه بیماران بتا تالاسمی ماژور از اهمیت بالایی برخوردار است. در سال‌های اخیر معنویت به عنوان عاملی مهم و تأثیرگذار جهت ارتقای سلامت بیماران، مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا سلامت، مفهومی کل‌نگر است که ابعاد جسمانی، اجتماعی و معنوی را در بر می‌گیرد (۱۰).

از آن جا که سلامتی کامل یک فرد به تعادل بین تمام ابعاد سلامتی یعنی: سلامت جسمی، روحی، روانی، اجتماعی و معنوی وی بستگی دارد، معنویت به عنوان مهم‌ترین عامل برای رسیدن به تعادل در حفظ سلامتی و مقابله با بیماری‌ها شناخته شده است. ارایه مداخلات معنوی باعث ایجاد یک ارتباط عمیق و صمیمی بین پرستار و بیمار می‌شود. پرستار معنی معنویت را از دید تمامی بیماران شناسایی و به او کمک می‌کند تا به یک قدرت برتر متصل گردد (۱۱). مداخلات معنوی، با تولید عواطف مثبت، سبب عملکرد مطلوب دستگاه‌های فیزیولوژیک بدن از قبیل دستگاه قلبی - عروقی، غدد درون‌ریز و سایر ارگان‌های داخلی از طریق دستگاه عصبی خود مختار می‌گردد. اگر فرد، بیمار باشد از این طریق می‌توان به بهبودی او کمک کرد و اگر سالم باشد این امر در ارتقاء سلامت او مؤثر خواهد بود (۱۲). در واقع معنویت یک کیفیت ذاتی است که در همه انسان‌ها وجود دارد و بیانگر ارتباط مناسب با خود، دیگران، طبیعت، خدا و یافتن معنی و هدف در زندگی می‌باشد (۱۲). مراقبت معنوی در پرستاری جنبه‌ای منحصر به فرد از مراقبت است که به سؤالات بنیادین انسان مانند معنای زندگی، درد، رنج و مفهوم مرگ پاسخ می‌دهد (۱۳). با وجود شواهدی که نشان‌دهنده تأثیر مثبت مداخلات معنوی بر بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن مانند سرطان و بیماری‌های قلبی است، مطالعه‌های محدودی به بررسی نقش دقیق این نوع مداخله در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور پرداخته‌اند (۱۸-۱۴، ۱). اکثر پژوهش‌های موجود بر مداخلات جسمی و روان‌شناختی به بهبود وضعیت این بیماران تمرکز داشته‌اند و کمتر به مداخلات معنوی و تأثیر آن بر بیماران تالاسمی ماژور توجه کرده‌اند و مطالعه جامع‌تری که درباره تعیین تأثیر این نوع مداخلات بر روی بیماران تالاسمی ماژور صورت گرفته باشد، یافت نشد. هدف این مرور روایتی، بررسی پیامدهای گزارش‌شده مداخلات معنوی - مذهبی در بیماران بتا تالاسمی ماژور در مطالعه‌های پیشین بود.

مواد و روش‌ها

مطالعه انجام شده یک مطالعه مروری بود که با بهره‌گیری از راهبردهای جستجوی منطقی (OR-AND-NOT) در موتور جستجوی Google Scholar و پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی و انگلیسی شامل Web of Science، Scopus، PubMed، SID، ISC و Magiran انجام شد. بازه زمانی جستجو به ده سال اخیر (۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴) محدود گردید. کلید واژه‌های مورد استفاده از اصطلاحات استاندارد پایگاه MeSH انتخاب شدند و شامل واژه‌های Spiritual، Religious، Spirituality، Thalassemia و معادل‌های فارسی آن‌ها یعنی معنوی، معنویت، مذهبی و تالاسمی بودند. برای افزایش دقت، فرآیند جستجو توسط دو پژوهشگر به صورت مستقل انجام شد. معیارهای ورود به این مطالعه شامل مطالعه‌هایی بود که به بررسی تأثیر مداخلات معنوی - مذهبی بر بیماران بتالاسمی ماژور پرداخته باشند (منظور از مداخلات معنوی/مذهبی در این مقاله، دعا و نیایش فردی یا گروهی، مراقبه و مدیتیشن با محتوای معنوی، مشاوره با روحانیون یا مشاوران مذهبی، خواندن متون مقدس مانند قرآن، شرکت در مراسم مذهبی و آموزش مفاهیم معنوی مرتبط با پذیرش بیماری بود)، به زبان فارسی یا انگلیسی نوشته شده باشند، به متن منابع دسترسی کامل وجود داشته باشد و اهداف مشخص و روش

اجرای دقیق داشته باشد. معیارهای خروج نیز شامل نامه به سردبیر، گزارش موردی، پوستره‌های کنفرانسی، پیشنهادهای پژوهشی و عدم تطابق با اهداف مطالعه بود. انتخاب منابع طی مراحل زیر انجام شد: ابتدا عنوان برای تشخیص ارتباط با موضوع بررسی شد، سپس چکیده جهت ارزیابی هدف، نوع مداخله و جمعیت مورد بررسی قرار گرفت. متن کامل نیز برای تطابق با معیارهای ورود و خروج بررسی شد. در مجموع، ۵۲ مقاله با استفاده از نرم‌افزار EndNote X7.5 گردآوری شد. پس از حذف موارد تکراری و بررسی دقیق، تنها ۶ مقاله با اهداف مطالعه هم‌راستا بودند که شامل ۵ مطالعه نیمه‌تجربی و ۱ مطالعه کارآزمایی بالینی بودند. تعداد محدود مقاله‌های وارد شده ناشی از کمبود مطالعه‌ها مرتبط با مداخلات معنوی - مذهبی در بیماران تالاسمی و عدم تطابق با معیارهای ورود از نظر روش اجرا یا هدف مطالعه بود. اطلاعات از منابع وارد شده با استفاده از فرم استخراج داده شامل عنوان، نویسندگان، سال انتشار، نوع مطالعه، حجم نمونه، نوع مداخله، ابزارهای اندازه‌گیری و یافته‌ها جمع‌آوری شد. تحلیل داده‌ها به صورت تحلیل محتوای کیفی انجام شد و یافته‌ها از نظر پیامدهای مداخلات معنوی بر بیماران تالاسمی ماژور بررسی گردید (نمودار ۱).



نمودار ۱: نمودار انتخاب مقاله‌ها

یافته‌ها

از بین ۵۲ مقاله یافت شده از پایگاه‌های فارسی و انگلیسی، پس از حذف مقاله‌های تکراری (۲۰ مقاله)، تعدادی از مقاله‌ها بر اساس عنوان و چکیده (۳ مقاله) خارج شدند و در نهایت ۶ مقاله در این مطالعه وارد گردید. مطالعه‌ها بر اساس تأثیر مداخلات معنوی در جدول توضیح داده شده است (جدول ۱).

تأثیر مراقبت معنوی بر سلامت معنوی و امید به زندگی: قاسمی و همکاران (۲۰۲۴) در مطالعه نیمه تجربی که بر روی ۳۴ نوجوان مبتلا به تالاسمی ماژور مراجعه‌کننده به بیمارستان علی‌اصغر دانشگاه علوم پزشکی اراک با هدف تعیین تأثیر مراقبت معنوی بر سلامت معنوی و امید به زندگی این بیماران، انجام دادند، نشان دادند که در گروه

جدول ۱: ویژگی‌های مقالات استخراج شده

نویسندگان (سال)	نام مطالعه	نوع مطالعه (حجم نمونه)	روش مداخله	یافته‌ها
زلیخا ابری و همکاران (۱۳۹۸) ایران - گلستان (۱۷)	بررسی تأثیر آموزش خود مراقبتی معنوی بر خودکارآمدی نوجوانان مبتلا به بتا تالاسمی ماژور	نیمه تجربی تک گروهی ۳۴ - نفر	آموزش خود مراقبتی معنوی طی ۶ جلسه به مدت ۴۵-۶۰ دقیقه دو بار در هفته برگزار شد.	بر اساس نتایج آزمون تی زوج، اختلاف معناداری در میزان کارآمدی قبل و بعد از مداخله وجود داشت.
زهره یوسفیان و همکاران (۱۳۹۸) ایران - شیراز (۱)	بررسی اثربخشی معنویت درمانی بر پریشانی روان‌شناختی و تاب‌آوری بیماران تالاسمی	نیمه تجربی دو گروهی - ۳۰ نفر	گروه مداخله، معنویت درمانی را طی دو ماه و نیم در ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای دریافت نمودند.	این پژوهش نشان داد که معنویت درمانی بر پریشانی روان‌شناختی و تاب‌آوری بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور تأثیر معنادار دارد.
زهره هادیان شیرازی و همکاران (۱۴۰۰) ایران - شیراز (۱۶)	بررسی تأثیر مراقبت معنوی بر اساس مدل «قلب سلیم» بر افسردگی، اضطراب و استرس نوجوانان بتا تالاسمی ماژور مراجعه‌کننده به مراکز دانشگاه علوم پزشکی شیراز	کارآزمایی بالینی ۶۴ - نفر	گروه مداخله در ۴ جلسه آموزشی ۳۰ تا ۵۰ دقیقه‌ای به صورت فردی هر دو هفته یک بار شرکت کردند.	نتایج این مطالعه نشان داد ارائه مراقبت معنوی بر اساس مدل «قلب سلیم» باعث کاهش افسردگی، اضطراب و استرس نوجوانان مبتلا به بیماری بتا تالاسمی ماژور می‌شود.
فاطمه سپهوند و همکاران (۱۴۰۱) ایران - لرستان (۱۵)	بررسی تأثیر معنویت درمانی مبتنی بر مثبت‌اندیشی بر افسردگی و خستگی زنان مبتلا به بتا تالاسمی ماژور شهر خرم‌آباد	نیمه تجربی دو گروهی - ۴۰ نفر	گروه مداخله ۱۲ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای مداخله معنویت درمانی مبتنی بر مثبت‌اندیشی (از طریق به چالش کشیدن افکار منفی، اثرات روان‌شناختی ارتباط و نیایش با خدا، صبر و تفکر معنوی) را دریافت کردند.	با توجه به نتایج این پژوهش، می‌توان گفت معنویت درمانی مبتنی بر مثبت‌اندیشی در کاهش افسردگی و خستگی بیماران بتا تالاسمی ماژور مؤثر است.
ساناز قاسمی و همکاران (۱۴۰۳) ایران - سیستان و بلوچستان (۱۴)	بررسی تأثیر آموزش مراقبت‌های مذهبی بر امید به زندگی و سلامت معنوی نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور مراجعه‌کننده به بیمارستان علی‌اصغر دانشگاه علوم پزشکی اراک	نیمه تجربی دو گروهی - ۳۴ نفر	گروه مداخله مراقبت معنوی را به صورت شش جلسه آموزشی یک ساعته دریافت کردند.	نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین نمره امید به زندگی و سلامت معنوی پس از آموزش مراقبت‌های معنوی به گروه مداخله به طور معناداری افزایش یافته است. نتایج آزمون ویلکاکسون نشان داد که میانگین نمره امید به زندگی گروه مداخله پس از مداخله به طور معناداری تغییر کرد در حالی که میانگین نمره امید به زندگی گروه کنترل پس از مداخله تغییر معناداری نداشت.
مسعود رئیسی و همکاران (۱۳۹۹) ایران - چابهار (۱۸)	اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای معنوی بر خودکارآمدی درد بیماران تالاسمی شدید	نیمه تجربی دو گروهی - ۳۰ نفر	گروه مداخله ۸ جلسه هفتگی تحت آموزش مهارت‌های مقابله‌ای معنوی قرار گرفتند.	آموزش مهارت‌های مقابله‌ای معنوی موجب بهبود معنادار میانگین نمرات خودکارآمدی درد در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است.

مداخله میانگین نمره امید به زندگی و سلامت معنوی در نوجوانان مبتلا به تالاسمی پس از اجرای مراقبت معنوی افزایش پیدا کرده است (۱۴).

تأثیر معنویت درمانی بر خستگی و افسردگی:

نتایج مطالعه نیمه تجربی سپهوند و همکاران (۲۰۲۲) که با هدف بررسی تأثیر معنویت درمانی مبتنی بر مثبت اندیشی بر میزان خستگی و افسردگی زنان مبتلا به تالاسمی ماژور بیمارستان شهید مدنی شهر خرم‌آباد انجام شد، نشان داد که معنویت درمانی بر افسردگی و خستگی این بیماران مؤثر است (۱۵).

تأثیر معنویت درمانی بر پریشانی روان‌شناختی و تاب‌آوری:

یوسفیان و همکاران (۱۳۹۸) در مطالعه نیمه تجربی که با هدف بررسی تأثیر معنویت درمانی بر پریشانی روان‌شناختی و تاب‌آوری بر روی ۳۰ بیمار بزرگسال مبتلا به تالاسمی ماژور مراجعه‌کننده به مرکز تالاسمی شهر شیراز انجام دادند، گزارش کردند که معنویت درمانی بر پریشانی روان‌شناختی و تاب‌آوری این بیماران تأثیر مثبت دارد (۱).

تأثیر مراقبت معنوی بر افسردگی، اضطراب و استرس:

هادیان شیرازی و همکاران (۲۰۲۳) در مطالعه‌ای که به صورت کارآزمایی بالینی با هدف بررسی تأثیر مراقبت معنوی مبتنی بر مدل قلب سلیم بر افسردگی، اضطراب و استرس نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور بر روی ۶۴ نوجوان مبتلا به تالاسمی ماژور در مرکز تالاسمی شیراز انجام دادند، گزارش کردند که مراقبت معنوی مبتنی بر مدل قلب سلیم بر افسردگی، اضطراب و استرس این بیماران تأثیر مثبت دارد (۱۶).

تأثیر آموزش خود مراقبتی معنوی بر خودکارآمدی:

حجتی و همکاران (۲۰۱۹) در مطالعه نیمه تجربی که با هدف بررسی تأثیر آموزش خود مراقبتی معنوی بر خودکارآمدی نوجوانان مبتلا به بتا تالاسمی ماژور در بیمارستان کودکان طالقانی گنبد کاووس انجام دادند، نشان دادند که آموزش خود مراقبتی معنوی بر میزان خودکارآمدی این بیماران تأثیر مثبت داشته و موجب افزایش خودکارآمدی آن‌ها گردیده است (۱۷).

تأثیر آموزش مهارت‌های مقابله‌ای معنوی بر خودکارآمدی درد:

رئییسی و همکاران در مطالعه نیمه تجربی که با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای معنوی بر خودکارآمدی درد بیماران تالاسمی شدید انجام دادند، نشان دادند که آموزش مهارت‌های مقابله‌ای معنوی موجب بهبود خودکارآمدی درد در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است (۱۸).

بحث

مرور مطالعه‌ها نشان داد که ارائه مداخلات معنوی - مذهبی به بیماران تالاسمی ماژور، نقش به سزایی در ارتقای سلامت معنوی، خودکارآمدی، بهبود حالات روان‌شناختی و امید به زندگی آن‌ها دارد. می‌توان به این صورت تبیین نمود که در زمانی که بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن مانند تالاسمی ماژور، مراحل ناتوانی را می‌گذرانند، نیازهای معنوی اساسی را احساس می‌کنند و این نکته بسیار حائز اهمیت است که اعضای تیم سلامت این نیازها را شناسایی کرده و بر اساس آن، برنامه مراقبتی جامعی برای هر بیمار تنظیم نمایند. توجه به نیازهای معنوی، می‌تواند در پذیرش و سازش شرایط موجود و حتی مرگ به بیمار کمک کند. بنابراین اعضای تیم سلامت باید با این مفاهیم آشنا بوده و با ارائه مراقبت مناسب، تحمل درد و رنج حاصل از ناخوشی و ناتوانی را تسهیل نمایند. نتیجه مطالعه بیژنی و همکاران (۲۰۲۳) نیز نشان داد که امید، میانجی رابطه بین بهزیستی معنوی و تاب‌آوری در بیماران تالاسمی ماژور می‌باشد (۱۹). جعفری و همکاران (۲۰۲۲) نیز بیان کردند که بین بهزیستی معنوی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور ارتباط مستقیمی وجود دارد، به گونه‌ای که بیمارانی که بهزیستی معنوی بالاتری دارند از کیفیت زندگی بالاتری نیز برخوردار هستند (۲۰). آرین و همکاران (۲۰۱۸) با مطالعه کارآزمایی بالینی که بر روی ۹۰ بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور شهر مشهد انجام دادند، گزارش کردند که هر گونه تغییر در شرایط روحی و روانی بیماران تالاسمی ماژور، باعث بهبود رفتارهای خود مراقبتی و در نتیجه انطباق با درمان آن‌ها می‌شود (۲۱).

نقش مؤثر مداخلات معنوی در دیگر بیماری‌های مزمن نیز اثبات شده است. نتایج مطالعه مروری سالاری و همکاران (۱۴۰۲) که با مرور ۲۶ مقاله مرتبط با هدف بررسی تأثیرات مراقبت معنوی بر بیماری‌های مزمن انجام

شد، نشان داد که مراقبت معنوی باعث کاهش اضطراب بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن می‌شود (۲۲). مطالعه لویس و همکاران (۲۰۱۶) نشان داد که معنویت نقش حیاتی در مقابله با بیماری‌های مزمن، ارائه حمایت عاطفی، افزایش تاب‌آوری و بهبود رفاه کلی ایفا می‌کند (۲۳). همچنین در مطالعه باگرا و همکاران (۲۰۲۳) که در بیماران مبتلا به بیماری‌های شدید و یا محدودکننده زندگی انجام شد، مشخص گردید بین بهزیستی معنوی با ذهن آگاهی و تاب‌آوری رابطه مستقیم وجود دارد (۲۴). در مطالعه ایلماز و همکاران (۲۰۲۱) در کشور ترکیه نیز سلامت معنوی بر سازگاری بیماران با بیماری‌های مزمن تأثیر داشت (۲۵). در مطالعه‌ای دیگر در کشور لهستان نیز معنویت باعث بهبود کیفیت زندگی بیماران مولتیپل میلوما شد (۲۶). همچنین نتایج مطالعه مروری دیگری که با هدف بررسی تأثیرات ارائه مراقبت معنوی در بیماران قلبی انجام شد نیز نشان داد که ارائه مراقبت معنوی به افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی سبب بهبود کیفیت زندگی، بهزیستی معنوی، کاهش اضطراب و افسردگی می‌گردد (۲۷)؛ نتایج یک مطالعه دیگر نیز مؤید ارتباط بین اعمال مذهبی و امید در بیماران سرطانی بوده است (۲۸). در یک مطالعه، بین خوب بودن معنوی و سرمایه روانشناختی ارتباط وجود داشت که نشان می‌دهد می‌توان از طریق مداخلات معنوی و مذهبی، سرمایه‌های روانشناختی مانند امید، تاب‌آوری، خوش‌بینی و خودکارآمدی را بهبود بخشید (۲۹). معنویت یک مکانیسم مقابله‌ای مؤثر می‌باشد که در شرایط ناخوشی و استرس‌زا امید را به وجود می‌آورد و باعث افزایش تاب‌آوری می‌شود (۳۰). نتایج مطالعه نیمه تجربی حیدری و همکاران (۱۴۰۲) نشان داد که عزت نفس و تاب‌آوری در بیماران سوختگی بعد از اجرای مداخله مراقبت معنوی بهبود یافته است (۳۱). همچنین در مطالعه راهدار و همکاران (۱۳۹۷) نتایج نشان داد که مراقبت معنوی گروهی بر افزایش کلیه ابعاد تاب‌آوری اعم از صلاحیت و شایستگی فردی، تحمل اثرات منفی و قوی بودن در مقابل استرس، پذیرش تغییر مثبت و خود کنترلی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکروزیس تأثیر مثبت دارد (۳۲). نتایج مطالعه دیگر نیز نشان داد که ارائه مراقبت معنوی باعث ارتقا کیفیت زندگی و تجارب معنوی بیماران همودیالیزی می‌شود (۳۳). در یک مطالعه تأثیر مراقبت معنوی بر درد، خستگی و امید به زندگی بیماران همودیالیزی بررسی شده است (۳۴). خلیلی و همکاران

(۲۰۲۴) در مطالعه‌ای توصیفی که بر روی ۲۲۲ بیمار مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان شهید بهشتی شهر همدان انجام دادند، بیان کردند که بیماران مبتلا به سرطان با سلامت معنوی پایین‌تر، سطح بالاتری از اضطراب را دارند، این امر به این معناست که بین سلامت معنوی و اضطراب یک رابطه منفی وجود دارد و همچنین بین اضطراب و کیفیت خواب بیماران مبتلا به سرطان رابطه منفی وجود دارد (۳۵). چنانچه زندگی هدفمند و معنادار باشد، طبیعی است که هر رخدادی مانند مشکلات، فقدان و بیماری معنا پیدا می‌کند و می‌تواند به سلامت روحی - روانی آسیب وارد کند. مداخلات معنوی - مذهبی در راستای تأمین نیازهای معنوی بیماران، می‌تواند این آسیب‌ها را کاهش داده و در راستای بهبودی و جبران آسیب‌ها به بیماران کمک‌کننده باشد. تعالی نفس، تمرینات معنوی، ارتباط با خود، معنایابی برای زندگی، مرگ و میل به جاودانگی از جمله نیازهایی است که بیماران مختلف بیان کرده‌اند. این نیازها زمانی پررنگ‌تر می‌شود که بیمار چرایی آن چه در حال وقوع است را با معادلات شخصی، اعتقادی و عملکردی خود مورد سنجش و بازبینی قرار می‌دهد (۳۶). در مطالعه رحماواتی و همکاران (۲۰۱۸) که با هدف تجربه پرستاری در ارائه حمایت معنوی از بیماران حاد سندرم کرونری در واحد اورژانس در کشور اندونزی انجام شد نیز بیان شده است که بیماران در مرحله ناخوشی شدید، تجارب زندگی را مرور کرده و بر این اساس معنای زندگی خود را تعبیر و تفسیر می‌کنند (۳۷). همچنین حرورانی و همکاران (۲۰۲۲) در مطالعه خود بیان کردند که مراقبت‌های معنوی در کنار سایر مراقبت‌های تسکینی می‌تواند به تیم درمان جهت کاهش رنج بیماران کمک به سزایی داشته باشد (۳۸).

بر اساس یافته‌های حاصل از مرور مقالات، مشخص می‌شود، تیم سلامت باید همواره به خاطر داشته باشند که ارائه مراقبت معنوی و معنویت درمانی مبتنی بر نیازهای معنوی بیماران، پایبندی بیماران را به توصیه‌های بهداشتی و درمانی بیشتر خواهد کرد. این موضوع در بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن می‌تواند اصلاح‌کننده سبک زندگی افراد، در جهت انطباق با فرآیند درمان باشد (۳۹). با این حال، چالش‌های متعددی در ارائه مداخلات معنوی - مذهبی وجود دارد. از جمله این چالش‌ها می‌توان به کمبود آموزش تخصصی پرستاران در حوزه مراقبت معنوی - مذهبی، محدودیت منابع انسانی و زیرساخت‌های لازم در مراکز درمانی و عدم آگاهی کافی بیماران و خانواده‌ها از مزایای

پیشنهاد می‌شود در مطالعه‌های مروری آتی کلید واژه‌ها توسعه یابند و بازه زمانی گسترده‌تر شود و پایگاه‌های اطلاعاتی بیشتری مورد استفاده قرار گیرند.

نتیجه‌گیری

یافته‌های مرور روایتی حاضر نشان می‌دهد که مداخلات معنوی - مذهبی در مطالعه‌ها با کاهش افسردگی، اضطراب، خستگی و استرس بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور همراه بوده‌اند. همچنین، این مداخلات در بهبود امید به زندگی، تاب‌آوری، سلامت معنوی و خودکارآمدی بیماران نقش داشته‌اند. با این حال، با توجه به محدود بودن مطالعه‌های موجود، ارائه توصیه قطعی در زمینه به‌کارگیری این مداخلات در مراقبت‌های بالینی امکان‌پذیر نیست. بنابراین، انجام مطالعه‌های مداخله‌ای بیشتر با طراحی‌های دقیق و مبتنی بر شواهد برای بررسی اثربخشی این مداخلات در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور ضروری به نظر می‌رسد.

حمایت مالی

نویسندگان هیچ‌گونه حمایت مالی برای نگارش این مقاله دریافت ننموده‌اند.

ملاحظات اخلاقی

در پژوهش حاضر جنبه‌های اخلاقی مطالعه کتابخانه‌ای شامل اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.

عدم تعارض منافع

نویسندگان هیچ گونه تعارض منافع بیان نکردند.

نقش نویسندگان

دکتر زهره بادیه پیمای جهرمی: ارائه ایده، جستجوی متون علمی و مقالات، تجزیه و تحلیل اطلاعات، بازبینی مقاله رسول رسولی: جستجوی متون علمی و مقالات، تجزیه و تحلیل اطلاعات، نگارش اولیه مقاله کلیه نویسندگان نسخه نهایی را مطالعه نموده و مسئولیت پاسخگویی در برابر آن را پذیرفته‌اند.

این نوع مراقبت‌ها اشاره کرد؛ که هر کدام از این چالش‌ها می‌توانند مانعی برای اجرای کامل و اثربخش مراقبت معنوی - مذهبی باشند. بنابراین توصیه می‌شود با برگزاری کارگاه‌های آموزشی جهت پرستاران و مراقبین این بیماران، آموزش‌های لازم جهت ارائه مراقبت‌های معنوی - مذهبی به صورت کارآمد و مؤثر به آن‌ها داده شود. همچنین با اضافه کردن مفاهیم معنویت، مراقبت معنوی و مذهبی به برنامه‌های آموزشی دانشجویان پرستاری، ایجاد محیطی مناسب و ایجاد انگیزه در پرستاران می‌توان گام مؤثری در ارائه مراقبت‌های همه جانبه بیماران برداشت. در این میان، به دلیل وجود تفاوت‌های متعدد در ادیان، مذاهب، فرهنگ و اعتقادات افراد در جوامع مختلف، پیشنهاد می‌گردد پژوهش‌های بیشتری در رابطه با به کارگیری مداخلات معنوی - مذهبی با توجه به این تفاوت‌ها صورت گیرد و همچنین، به دلیل جمعیت قابل توجه بیماران تالاسمی ماژور، توجه ویژه به گسترش مداخلات طولانی مدت به ویژه در بستر و فضای خانواده و جامعه توصیه می‌شود. در نهایت توصیه می‌شود با انجام مطالعه‌های کیفی، موانع موجود در مسیر اجرای این نوع مداخلات شناسایی و راه کارهایی برای رفع آن‌ها ارائه شود. از جمله محدودیت‌های این مطالعه، عدم شناسایی پایان‌نامه‌ها و مقالات مروری واجد شرایط در زمینه مداخلات معنوی در بیماران بتا تالاسمی ماژور، عدم انجام تحلیل آماری کمی، احتمال سوگیری در انتخاب منابع، محدود بودن تعداد مطالعه‌های وارد شده و عدم ارزیابی کیفیت روش‌شناسی مطالعه‌ها به صورت ساختار یافته بود. این موارد می‌تواند بر قابلیت تعمیم نتایج تأثیر بگذارد. با این حال، مرور روایتی حاضر توانسته است تصویری اولیه از وضعیت پژوهش‌های موجود در زمینه مداخلات معنوی - مذهبی در بیماران بتا تالاسمی ماژور ارائه دهد. نتایج این مطالعه می‌تواند به عنوان گام اولیه‌ای برای شناسایی خلأهای پژوهشی و هدایت مطالعه‌های آینده در حوزه مراقبت معنوی - مذهبی بیماران تالاسمی مورد استفاده قرار گیرد. برای افزایش جامعیت،

References:

- 1- Yousefian Z, Ahadi H, Mojmanari AK. The effectiveness of spirituality therapy on psychological distress and resilience of thalassemia patients. *J Psychol Sci* 2020; 18(84): 23-35.
- 2- Emadi Dehaghi B, Rasooli L, Mohammadi Farsani S. Quality of life among patients with beta-thalassemia major in Shahrekord city, Iran. *Epidemiology and Health System Journal* 2016; 3(4): 324-8.
- 3- Bakhshi R, Akaberian S, Bahreini M, Mirzaei K, Kiani J. The effect of group counseling on the quality of life in patients with major thalassemia referred to the thalassemia treatment center in Bushehr. *Pajouhan Scientific Journal* 2018; 16(3): 11-9. [Article in Farsi] [DOI:10.21859/psj.16.3.11]
- 4- Husna N, Sanka I, Al Arif A, Putri C, Leonard E, Handayani NN. Prevalence and distribution of thalassemia trait screening. *J Med Sci* 2017; 49(3): 106-13. [DOI:10.19106/JMedSci004903201702]
- 5- Musallam KM, Lombard L, Kistler KD, Arregui M, Gilroy KS, Chamberlain C, et al. Epidemiology of clinically significant forms of alpha-and beta-thalassemia: a global map of evidence and gaps. *Am J Hematol* 2023; 98(9): 1436-51. [DOI:10.1002/ajh.27006] [PMID]
- 6- Hadipour Dehshal M, Tabrizi Namini M, Hantoushzadeh R, Yousefi Darestani S. β -Thalassemia in Iran: things everyone needs to know about this disease. *Hemoglobin* 2019; 43(3): 166-73. [DOI:10.1080/03630269.2019.1628774] [PMID]
- 7- Taheri H, Dostkami M, Khayati R, Rigi A, Allahyari E. Evaluation of spiritual health in adolescents with Thalassemia major. *Journal of Zabol Medical School* 2021;4(1): 14-8. [Article in Farsi] [DOI:10.18502/jzms.v4i1.6757]
- 8- Firouzkouhi M, Abdollahimohammad A. Effects of smartphone games on levels of anxiety, depression, and fatigue in patients with Thalassemia. *Journal of Mazandaran University of Medical Sciences* 2020; 30(188): 62-71. [Article in Farsi]
- 9- Sharma S, Seth B, Jawade P, Ingale M, Setia MS. Quality of life in children with thalassemia and their caregivers in India. *Indian J Pediatr* 2017; 84(3): 188-94. [DOI:10.1007/s12098-016-2267-z] [PMID]
- 10- Mahmoodi M. The effect of spiritual therapy on the life style of hemodialysis patients. *Military Caring Sciences* 2021; 8(2): 193-201. [Article in Farsi] [DOI:10.52547/mcs.8.2.193]
- 11- Abbasi M, Eskandari N, Heidari A, Heidari M, Yoosefee S, Adeli SH, et al. A thematic analysis of dimensions of spiritual care. *Iran J Nurs Midwifery Res* 2022; 27(5): 452-60. [DOI:10.4103/ijnmr.ijnmr.335.21] [PMID]
- 12- Fardi D, Lotfi Kashani F. Spiritual therapy and breast cancer: a scoping review of the Persian biomedical literature. *Payesh* 2023; 22(4): 423-32. [Article in Farsi] [DOI:10.61186/payesh.22.4.423]
- 13- Azimian J, Soleimany Ma, Sharif SP, Banihashemi H. The effect of spiritual care program on death anxiety of cardiac patients: A randomized clinical trial. *Avicenna J Nurs Midwifery Care* 2019; 27(1): 1-10. [Article in Farsi] [DOI:10.30699/ajnmc.27.1.1]
- 14- Ghasemi S, Usefi S, Naeimi S, Rooin R, Borhanzahi S, Dehghanmehr S. Study of the impact of religious care education on the life expectancy and spiritual health of adolescents suffering from thalassemia major. *African Journal of Biological Sciences* 2024; 6(5): 40-52.
- 15- Sepahvand F, Rezaei F, Mirderikvand F. Evaluation of the Effect of Spiritual Therapy based on Positive Thinking on Depression and Fatigue in Women with Beta Thalassemia Major in Khorramabad, Iran. *Journal of Religion and Health* 2023; 10(2): 46-53. [Article in Farsi]
- 16- Hadian Shirazi Z NS, Sharifi N, Bordbar M, Edraki M. Impact of Spiritual Care Based on the "Sound Heart" Model on Depression, Anxiety, and Stress of Major Thalassemia Adolescents. *Scientific Journal of Medical Sciences* 2023; 2(3): 91-5. [Article in Farsi]
- 17- Iri Z, Hojjati H, Akhoondzadah G. The impact of spiritual self-care education on self-efficacy in adolescents with Thalassemia in Children's Hospital Taleghani Gonbadkavoos Golestan 2017-18. *IJNR* 2019; 14(1): 8-13. [Article in Farsi]
- 18- Raisi M, Kahrazehi F, Sanagouye Moharer G. The Effectiveness of Spiritual Confrontation Skills on Pain Self-efficacy in Patients with Severe Thalassemia. *Journal of Religion and Health* 2021; 8(2): 1-8. [Article in Farsi]
- 19- Bizhani M, Kouhpayeh SA, Parviniannasab AM, Bazrafshan MR, Dehghani A. The mediating role of hope in relations between spiritual well-being and resilience among adolescents with beta thalassemia major: a structural equation modeling approach. *Iranian Journal of Psychiatric Nursing* 2023; 11(3): 35-45. [Article in Farsi]
- 20- Jafari M, Saberi N. The relationship between spiritual well-being and quality of life in patients with thalassemia. *J Iran Blood*

- Transfus 2022; 19(4): 313-20. [Article in Farsi]
- 21- Arian M, Memarian R, Oghazian MB, Vakilian F, Badiie Z. The effect of a holistic care program on the reduction of iron overload in patients with beta-thalassemia major: a randomized clinical trial. Iran Red Crescent Med J 2018; 20(3): e59183. [DOI:10.5812/ircmj.60820]
 - 22- Salari N, Kazeminia M, Abdi A, Abdolmaleki A, Abdoli N, Mohammadi M, et al. Effects of counselling and spiritual care program on anxiety in patients with chronic diseases: A systematic review and meta-analysis. Current Psychology 2021; 42: 9943-52. [DOI:10.1007/s12144-021-02263-9]
 - 23- Lewis M. The role of spirituality in coping with chronic illness: what health care providers need to know for advance directive decision making. Journal of Doctoral Nursing Practice 2016; 9(2): 194-8. [DOI:10.1891/2380-9418.9.2.194] [PMID]
 - 24- Bagereka P, Ameli R, Sinaii N, Vocci MC, Berger A. Psychosocial-spiritual well-being is related to resilience and mindfulness in patients with severe and/or life-limiting medical illness. BMC Palliative Care 2023; 22(1): 133. [DOI:10.1186/s12904-023-01258-6] [PMID]
 - 25- Kütmeç Yilmaz C, Kara FŞ. The effect of spiritual well-being on adaptation to chronic illness among people with chronic illnesses. Perspect Psychiatr Care 2021; 57(1): 318-25. [DOI:10.1111/ppc.12566] [PMID]
 - 26- Lebowa W, Prusak J, Leśniak M, Wasiewicz J, Jurczyszyn A. The influence of religiosity and spirituality on the quality of life of patients with multiple myeloma. Clinical Lymphoma Myeloma and Leukemia 2023; 23(12): 889-96. [DOI:10.1016/j.clml.2023.08.013] [PMID]
 - 27- Eslami Akbar R, Rahimi Z, Badiyepeymaiejahromi Z. A review of spiritual care in people with heart disease: Impacts, challenges, and strategies. Cardiovascular Nursing Journal 2020; 9(1): 216-24. [Article in Farsi]
 - 28- Shooohani F, Asghari E, Sheikholeslami F, Alitaleshi M. The Relationship between Religious Beliefs and Hope in Cancer Patients. Depiction of Health 2015; 5(4): 1-5. [Article in Farsi]
 - 29- Parviniannasab AM, Bijani M, Badiyepeymaiejahromi Z, Dehghani A, Tehranineshat B, Moradi M, et al. The Relationship Between Spiritual Well-Being and Psychological Capital Among Nursing Students: A Cross-sectional Study. Jundishapur J Health Sci 2023; 15(3): e138900. [DOI:10.5812/jjhs-138900]
 - 30- Duran S, Avci D, Esim F. Association between spiritual well-being and resilience among Turkish hemodialysis patients. Journal of Religion and Health 2020; 59(6): 3097-109. [DOI:10.1007/s10943-020-01000-z] [PMID]
 - 31- Heidari M, Gheshlaghi AN, Masoudi R, Raeisi H, Sobouti B. Effects of a spiritual care program on body image and resilience in patients with Second-Degree Burns in Iran. Journal of religion and health 2024; 63(1): 329-43. [DOI:10.1007/s10943-022-01732-0] [PMID]
 - 32- Rahdar M, Rahnama M, Shahdadi H, Vahed AS, Afshari M. Group spiritual care impact on resilience of multiple Sclerosis patients in the multiple sclerosis society of Zahedan. Medical Science. 2018;22(89):58-64.
 - 33- Mazandarani H, Asadzandi M, Saffari M, Khaghanizadeh M. Effect of spiritual care based on sound-heart model (SHCM) on spiritual health of hemodialysis patients. Crit Care Nues J 2017; 104(1): e16147.
 - 34- Sadeghi, Z, badiyepeyma Z, Hojat M. Investigating the effect of spiritual care based on Sound-Heart model on pain, fatigue and life expectancy of hemodialysis patients (A Clinical trial study protocol). Education and Ethics In Nursing 2024; 13(special issue): 148-55.
 - 35- Khalili Z, Habibi E, Kamyari N, Tohidi S, Yousofvand V. Correlation between spiritual health, anxiety, and sleep quality among cancer patients. International Journal of Africa Nursing Sciences 2024; 20: 100668. [DOI:10.1016/j.ijans.2024.100668]
 - 36- Irajpour A, Moghimian M, Arzani H. Spiritual aspects of care for chronic Muslim patients: A qualitative study. J Educ Health Promot 2018; 7(1): 118. [DOI:10.4103/jehp.jehp_199_17] [PMID]
 - 37- Ida Rahmawati B, Septi Dewi Rachmawati BSN M, Kumboyono Kumboyono B. Nursing experience in providing spiritual support to patients with acute coronary syndrome at emergency unit: Phenomenology study. International Journal of Caring Sciences 2018; 11(2): 1147-51.
 - 38- Harorani M, Jadidi A, Zand S, Khoshkhoutabar T, Rafiei F, Beheshti SZ. Spiritual care in hospitalized patients in Iran: An action research study. Journal of Religion and Health 2022; 61(5): 3822-39. [DOI:10.1007/s10943-021-01302-w] [PMID]
 - 39- Tobin RS, Cosiano MF, O'Connor CM, Fiuzat M, Granger BB, Rogers JG, et al. Spirituality in patients with heart failure. Heart Failure 2022; 10(4): 217-26. [DOI:10.1016/j.jchf.2022.01.014] [PMID]