خون
فصلنامه پژوهشی
تابستان ۸۴ دوره ۲ شماره ۴

بررسی شیوع عفونت سایتومگالوویروس در نوزادان تعویض خون شده مراجعه‌کننده به بیمارستان طبی کودکان

دکتر طاهره زندیه[۱]، دکتر سعید کاویانی[۲]، دکتر محمد رخشان[۳]

چکیده

سابقه و هدف

با توجه به این‌که روش مؤثر واصلی درمان افزایش بیلی‌روبین خون در نوزادان دچار بیماری همولیتیک تعویض خون است، انتقال ویروس سایتومگال از طریق خون یک خطر عمده و مهم محسوب می‌شود. چون این ویروس به دلیل ضعف سیستم ایمنی نوزادان می‌تواند باعث عفونت شدید و حتی کشنده شود، بر آن شدیم تا برای اولین بار انتقال عفونت CMV را از طریق انتقال خون در ایران بر روی نوزادانی که تعویض خون شده‌اند بررسی نماییم.

مواد وروش‌ها

مطالعه انجام شده مقطعی بود. این مطالعه بر روی ۱۰۰ نوزاد مبتلا به افزایش بیلی‌روبین در خون که تحت عمل تعویض خون قرار گرفته بودند انجام شد. سرم این نوزادان قبل و حدود ۲ ماه بعد از تعویض خون که برای پی‌گیری مجدد به بیمارستان مراجعه نمودند، همچنین سرم مادران آن‌ها وپلاسمای خون اهداکنندگانی که از پلاسمای آن‌ها جهت درمان این نوزادان استفاده شده بود، ازنظروجود آنتی‌بادی‌هایIgM وIgG ضدCMV به‌روش الیزا وبا استفاده از کیت‌های تجارتی یوروژنتیک بررسی‌گردید. نتایج آن بامحاسبات آماری غیرپارامتری مک‌نمار و آزمون کای‌دو (Chi-square) بررسی شد.

یافته‌ها

میزان آنتی‌بادی IgM اختصاصی ضد CMV در سرم نوزادان قبل از تعویض خون ۱۴٪ و ۲ ماه بعد از تعویض خون ۴۸٪ مشاهده شد که با $p<۰/۰۰۰۱$ معنی‌دار می‌باشد. میزان آنتی‌بادی IgM اختصاصی ضد CMV در سرم مادران ۱٪ مشاهده شد. به احتمال زیاد آلودگی با CMV به دلیل انتقال خون می‌باشد.

نتیجه گیری

با توجه به بالا بودن عفونت CMV در نوزادان (۱۴٪) نسبت به مادران (۱٪) می‌توان نتیجه‌گیری نمود که مادران سالم، مبتلا به عفونت مخفی CMV هستند. از طرفی بالا بودن درصد عفونت نوزادان (۴۸٪) دو ماه بعد از دریافت خون، نشان‌دهنده سرایت عفونت CMV از طریق انتقال خون می‌باشد و با بررسی نتایج مربوط به متغیرهای وابسته مثل حجم خون تزریق شده، تعداد دفعات تعویض خون، سن، جنس و گروه خونی، از طریق آزمون‌های غیرپارامتری، مشخص گردید که حجم خون تزریق شده به نوزاد در میزان سرایت عفونت تأثیر داشته ولی سایر پارامترها مؤثر نبوده‌اند.

کلمات کلیدی: سایتومگالو ویروس، هیپربیلی‌روبینمی، تعویض خون

تاریخ دریافت: ۸۳/ ٤ / ۲
تاریخ پذیرش: ۸۳/۱۰/۱۲

۱- مؤلف مسؤول: PhD فرآورده‌های بیولوژیک- دانشیار مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران- صندوق پستی ۱۱۵۷-۱۴۶۶۵
۲- PhD هماتولوژی- دانشگاه تربیت مدرس
۳- متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی- استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

[Downloaded from bloodjournal.ir on 2026-11-01]

مقدمه

ویروس سایتومگال از خانواده هرپس ویریده[1] می‌باشد. اندازه آن ۱۵۰ تا ۲۰۰ نانومتر بوده و یکی از بزرگترین ویروس‌های این خانواده است (۱). تکثیر ویروس در مقایسه با سایر هرپس ویروس‌ها بسیار آهسته است و از طریق اتصال پوشش ویروس با غشای سلول میزبان و یا فاگوسیت شدن توسط لکوسیت‌های سلول میزبان وارد سلول و هسته شده همانندسازی می‌کند. اجزای ویروس ساخته شده در هسته با استفاده از لایه داخلی غشای هسته درهنگام خروج به روش جوانه زدن[2] یک پوشش می‌شوند. بعد از خروج از هسته به سیتوپلاسم رفته وداخل واکوئل‌ها جایگزین می‌گردند. اجزای ویروس ناقص با DNA نیمه تمام نیز ممکن است در هسته سلول تشکیل گردد (۲).

معمولاً بروز علایم بالینی نسبت به خصوصیات سیستم ایمنی افراد بیمار و بر حسب سن آن‌ها متغیر است. البته یک‌سری علایم در اکثر موارد به‌طور مشترک مشاهده می‌گردد و به‌طور کلی الگوهای اساسی زیر را می‌توان در نظر گرفت :

۱- عفونت بدون علامت، شایع‌ترین نوع عفونت است و از طریق مطالعات سرولوژیک مشخص می‌شود.
۲- بیماری انکلوزیون‌های کونژنیتال CMV[3]، ۰/۵٪ تا ۲٪ نوزادان با عفونت CMV به‌دنیا می‌آیند و از این تعداد ۰/۵٪ تا ۲٪ ممکن است CID[4] داشته باشند.
۳- عفونت CMV در افراد مبتلا به نقص ایمنی، که یکی از دلایل مرگ و میر در بیماران پیوند کلیه و بیماران مبتلا به ایدز می‌باشد.
۴- در برخی از بیمارانی که دریافت‌کننده خون بوده‌اند و بعداز بای‌پس قلبی- تنفسی دچارعلایم بالینی شده‌اند، مشاهده شده که علت آن بیشترفعال شدن ویروس‌های پنهان به خصوص CMV در سلول‌های خونی و عضو پیوند شده می‌باشد.
۵- عفونت خودبه خودی CMV، به‌صورت منونوکلئوز یا بدون علایم ممکن است ایجاد شود(۴ و ۳).

به‌طور کلی ویروس سایتومگال در افراد با نقص ایمنی و دریافت‌کنندگان خون و فرآورده‌های خونی و نیز در نوزادان، باعث عفونت شدید می‌گردد و عفونت پنهان و غیرفعال سایتومگال در بیماران با نقص ایمنی مجدداً فعال شده و تظاهرات بیماری شدید را ایجاد می‌کند (۵).

یک گروه از بیماران فوق‌الذکر نوزادان می‌باشند که ممکن است عفونت‌های CMV را از طرق مختلف قبل از تولد، هنگام تولد، از طریق شیر مادر و یا از طریق انتقال خون و تعویض خون گرفته باشند که در بعضی موارد می‌تواند منجر به سندرم بعد از تزریق خون گردد. مطالعات نشان داده که ۲۵٪ نوزادان تعویض خون شده، مبتلا به عفونتCMV شده‌اند و تعدادی از آن‌ها دارای عفونت آشکار و علامت‌دار هستند (۶).

از آن‌جایی که حدود ۱۵٪ تا ۲۰٪ از نوزادان به علل مختلف دچار افزایش بیلی‌روبین در خون گردیده و لازم است تعویض خون در آن‌ها هرچه سریع‌تر صورت پذیرد و باتوجه به‌این که یکی از عفونت‌های شایع از طریق انتقال خونCMV می‌باشد و این ویروس از جنبه‌های مختلف می‌تواند در نوزادی که سیستم ایمنی اوتکامل نیافته تأثیرات ناخواسته و بیماری‌زا بگذارد، همچنین چون تاکنون در ایران مطالعه‌ای بر روی عفونتCMV در نوزادانی که تعویض خون می‌شوند انجام نشده و نقش انتقال خون در سرایت عفونت بررسی نشده است، انجام این تحقیق لازم به‌نظر می‌رسد. بنابراین به منظور تعیین تأثیرات سرایت این ویروس از طریق تعویض خون، در جامعه کوچک غیر انتخابی نوزادانی که تحت عمل تعویض خون قرار گرفتند، بررسی انجام شد.

با بررسی اهداکنندگان خون در مقیاس بسیار محدود (خون‌هایی که برای تعویض خون در نوزادان به‌کار رفته) میزان ارتباط و مواجهه شدن اهداکنندگان با ویروس و وجود آنتی‌بادی ضد CMV در سرم آن‌ها تعیین گردید.

مواد و روش‌ها

مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی می‌باشد که در سال ۱۳۷۰بر روی جامعه کودکان مبتلا به افزایش بیلی‌روبین

1- Herpes Viridea
2- Budding
3- Cytomegalovirus
4- Cytopathic Inclusion Disease

[Downloaded from bloodjournal.ir on 2026-11-01]

خـون مراجعـه‌کننـده بـه بیمارسـتان طبـی کودکـان جهـت تعویض خون انجام شـده اسـت. ایـن مرکـز دارای بخـش مراقبت‌های ویژه نوزادان و تعـویض خـون مـی‌باشـد و از تمام نقاط تهران و حومه، نوزادان مبتلا به یرقان را پـذیرش می‌نماید. در مدت تحقیق ۴۸٪ این نوزادان به دلیل اخـتلال در گروه خونی ABO، ۱۰٪ آن‌ها به دلیل اخـتلال درگـروه خونی Rh، ۱۲٪ به دلیل نارس بودن نـوزاد و ۳۰٪ بقیـه بـه دلایل مختلف تعـویض خـون شـدند و نمونـه‌هـای خـون نوزادان و مادران آن‌ها هم‌زمان با تعویض خـون نـوزادان و کیسه‌های خون مصرف شده، برای آزمایش‌های مربوطه بـه مرکز انتقال خون منتقل گردید. با توجه به این کـه بایسـتی هر نوزاد را که تحت عمل تعویض خون قرار می‌گیـرد بـه مدت دوره کمون ویروس در بدن میزبان پـس از تعـویض، تحت پیگیری قرار می‌دادیم و ایـن امـر زمـانی طـولانی را می‌طلبید و از طرفی نمونه‌های کار شده در سـایر کشـورها حدود ۱۰۰ نفر بودند، مـا نیـز تعـداد ۱۰۰ نفـر را انتخـاب نمودیم(۷ ، ۵).

نمونه مورد نیاز، ۱۰ میلی لیتر خـون منعقـد بـود کـه از ۱۰۰ نوزاد مبتلا به افزایش بیلی‌روبین خون قبل از هر گونه اقدام درمانی و ۲ ماه بعد از تعـویض کـه بـرای پـی‌گیـری مجدد به بیمارستان مراجعه نمودند گرفتـه شـد و سـرم آن جهت بررسی جدا گردید.

از ماداران این نوزادان نیز برای بررسی از نظـر ایـن کـه قبلاً با ویروس برخورد داشته یا نه و این کـه احیانـاً دچـار عفونت فعال بوده‌اند، هم‌زمان با نوزاد نمونه گیـری شـد و همراه ۱۸۰ کیسه خون که جهـت تعـویض خـون نـوزادان مصرف گردید برای انـدازه‌گیـری IgM و IgG در سـرم بـا روش الیزا مورد آزمایش قرار گرفت.

حساسیت روش الیزا طبق مقالات مختلف ۹۳٪ تـا ۹۹٪ و اختصاصی بـودن آن ۹۴٪ تـا ۱۰۰٪ مـی‌باشـد. بـه‌عـلاوه مراحل انجام آزمایش و مدت انکوباسـیون در ایـن آزمـون کوتاه است که می‌تواند میـزان خطـا را بـه حـداقل ممکـن تقلیل دهد(۸).

کیت الیزا یوروژنتیک در این تحقیق مورد اسـتفاده قـرار گرفـت. ایـن کیـت حـاوی یـک روش انـدازه‌گیـری آنتی‌بادی‌های IgM و IgG ضد CMV اسـت و بـا اسـتفاده توأم از هر دو کیت IgM و IgG می‌تواند فاز حـاد عفونـت CMV و ایمنی فعال میزبان را تشخیص دهد. از آنجایی که وجود IgM ضد CMV نشان دهنده عفونت فعال پیشرونده می‌باشـد و شـاید بهتـرین پـارامتر بـرای تشـخیص سـریع عفونت حاد CMV باشد، روش الیزا بـه طریـق کیـت‌هـای تجارتی اندازه‌گیری می‌شود و از توضیح روش صـرف‌نظـر می‌گردد.

برای نتیجه‌گیری از محاسبات آماری غیر پارامتری به نام مک نمار[1] و آزمون کای‌دو (Chi-square) استفاده شد.

یافته‌ها

در این بررسی ۱۰۰ نوزاد مبتلا به افـزایش بیلـی‌روبـین خـون بـا میـانگین سـن ۳/۴۷ ± ۶/۵۸ روز (حـداقل ۱ و حداکثر ۲۱ روز) مورد بررسی قرار گرفتند کـه مشخصـات این نوزادان در جدول ۱ بیان شده است.

جدول ۱ : مشخصات ۱۰۰ نوزاد مبتلا به افزایش بیلی‌روبین خون قبل از تعویض خون

متغیرها	میانگین	حداقل	حداکثر
سن (روز)	۶/۵۸ ± ۳/۴۷	۱	۲۱
وزن (کیلوگرم)	۲/۷۸ ± ۰/۶۷	۲	۳/۷۵
تعداد دفعات تعویض خون	۱/۵۱ ± ۰/۷۸	۱	۴
حجم خون تزریق شده (میلی‌لیتر)	۶۷۰± ۳۳۶	۲۰۰	۱۷۹۰

با توجه به نتایج آماری به‌دست آمده، از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده مشاهده می‌گـردد، ۴۸٪ نـوزادان بعد از تعویض خـون در مقایسـه بـا ۱۴٪ نـوزادان قبـل از تعویض خون دارای آنتـی‌بـادی CMV-IgM بـوده‌انـد کـه اختلاف معنی‌دار می‌باشد (p<۰/۰۰۰۱).

با مقایسه نتایج آماری سایر متغیرها و بـا کمـک آزمـون آماری کای‌دو مشخص گردید که حجم خون تزریـق شـده به نوزاد تا اندازه‌ای در میزان سرایت عفونت تأثیر داشـته و

1- Mac nemar test

[Downloaded from bloodjournal.ir on 2026-11-01]

همگنی دارد (p=۰/۰۵). در حالی‌که سایر پارامترها مثل وزن، جنس، سن تأثیر نداشته است.

میزان CMV-IgG در اهداکنندگان خون مورد مطالعه (کیسه‌های خون مصرف شده) ۹۶٪ بود و با توجه به میزان CMV-IgG در اهداکنندگان خون و غلظت آنتی‌بادی کیسه‌های خون و مقایسه با میزان عفونت در نوزادان (CMV-IgM)، از طریق آزمون کای‌دو مشخص گردید که ارتباطی بین سرایت عفونت و IgG در اهداکنندگان وجود دارد (p<۰/۰۵). میزان آنتی‌بادی IgM اختصاصی ضد CMV در مادران ۱٪ و CMV-IgG ۹۵٪ می‌باشد.

جدول ۲ : مقایسه فراوانی نسبی آنتی‌CMV-IgM در نوزادان مبتلابه افزایش بیلی‌روبین در خون قبل از تعویض و بعد از تعویض خون

زمان نمونه‌گیری		CMV-IgM مثبت	CMV-IgM منفی
قبل از تعویض خون		٪۱۴	٪۸۶
بعد از تعویض خون	مجموع	٪۴۸	٪۵۲
	پسر	٪۲۷	٪۳۰
	دختر	٪۲۱	٪۲۲

بحث

اگرچه عفونت CMV بعد از انتقال خون معمولاً ایجاد بیماری بالینی مشخصی نمی‌کند ولی در افرادی که سیستم ایمنی آن‌ها ضعیف است، باعث بیماری منونوکلئوز بعد از انتقال خون می‌گردد که این سندرم در هفته‌های اول زندگی شایع‌تر می‌باشد (۱۰، ۹). به‌خصوص در سال‌های اخیر به دلیل مصرف بالای خون جهت درمان نوزادان نارس، عوارض ناشی از عفونت CMV افزایش یافته و خطر این نوزادان را تهدید می‌کند. بر اساس مطالعات محققین، CMV باعث کاهش ایمنی سلولی و اختلال در عملکرد این سلول‌ها می‌شود که احتمالاً در مرحله تکامل ایمنی سلولی باعث مرگ سلول‌های ایمنی می‌شود(۱۱).

در بیماری منونوکلئوز، توانایی سلول‌های سیتوتوکسیک کاهش یافته و در طی پیشرفت بیماری سلول‌های $CD8^+$ فعال شده و افزایش می‌یابند (۱۲).

از طرفی نوزادان آلوده شده پس از انتقال خون ممکن است به دلیل تماس نزدیک با مادر باعث انتقال عفونت CMV به مادران خود که CMV-Ab منفی هستند شوند، در نتیجه این احتمال وجود دارد که مادر ایمن شود یا برعکس چنان‌چه مادر دوباره حامله شود و ایمنی او در مقابل CMV فعال نباشد، (عدم وجود CMV-Ab) جنین وی دچار عفونت CMV گردد (۱۳).

در این مطالعه نمونه سرم ۱۰۰ نوزاد همراه با سرم مادران آن‌ها و ۱۸۰ کیسه خون از اهداکنندگان خون مورد آزمایش قرار گرفتند که این نوزادان بین ۱ تا ۴ بار تعویض خون شده بودند.

میزان شیوع CMV-IgM در مرحله قبل از تعویض خون ۱۴٪ بود و بعد از تعویض خون به ۴۸٪ رسید که دلیل بر عفونت اولیه در گیرنده‌های خون بوده و نشان می‌دهد که منبع ویروس، اهداکنندگان خون می‌باشند (جدول شماره۲). البته در اینجا ممکن است نقش مادر در آلوده نمودن نوزاد از طریق شیر، مجرای زایمان و سایر ترشحات نیز مطرح گردد. زیرا عفونت به صورت نهفته در بعضی مادران وجود دارد که در این رابطه می‌توان گفت چون میزان عفونت حاد (CMV-IgM) در مادران مورد مطالعه ۱٪ می‌باشد و بقیه مادران در زمان شیردادن و قبل از آن دچار عفونت حاد نبودند لذا احتمال انتقال از طریق مادر ضعیف بوده و یا رد می‌شود. ولی در انتقال خون چون مستقیماً گلبول‌های سفید حاوی CMV نهفته به نوزاد منتقل می‌شوند، احتمال آلودگی از این طریق بیشتر است. در گزارش‌هایی که کومار و همکارانش ارایه نموده بودند، میزان آلودگی در نوزادان در مقایسه با مطالعه ما پایین‌تر بوده است. آن‌ها کودکان را به سه گروه تقسیم کردند، به گروه اول خون‌های CMV مثبت و به گروه دوم خون‌های CMV منفی تزریق نمودند و گروه سوم خون دریافت نکردند. ۶ و ۱۲ هفته بعد، از هر سه گروه نمونه‌گیری شد و تحت آزمایش قرار گرفت. نتایج به‌دست آمده مشخص نمود که ۳۰٪ نوزادانی که خون CMV مثبت دریافت کرده بودند و ۶٪ نوزادانی که خون CMV منفی دریافت نموده بودند مثبت شدند در حالی‌که هیچ کدام از گروه سوم آلوده به عفونت نشدند(۱۴).

[Downloaded from bloodjournal.ir on 2026-11-01]

نتایج ما در ایران مشابه گزارش دیگری است که کوهورد و همکارانش ارایه نمودند. از حدود ۱۸۰ کیسه خونی که برای تعویض خون در بیماران مورد مطالعه رزرو شده بود، ۹۶٪ خون‌ها حاوی CMV-IgG بودند که نشان‌دهنده یک عفونت قدیمی است و احتمال دارد ویروس به‌صورت مخفی در لکوسیت‌های خون باقی‌مانده باشد. براساس مطالعات دانشمندان، همانند سازی CMV نسبت به سایر ویروس‌های خانواده هرپس ویروس بسیار کندتر می‌باشد و پس از آلودگی اولیه، ویروس به‌صورت نهفته در منوسیت‌ها باقی می‌ماند و مطالعات اخیر مشخص نموده‌است که انتقال خون از اهداکنندگانی که پاسخ سرولوژی آن‌ها نسبت به CMV مثبت می‌باشد می‌تواند باعث تکثیر ویروس در گیرندگان خون به‌خصوص آن‌هایی که سیستم ایمنی ضعیف‌تری دارند شده و بیماری جدی ایجاد نماید (۱۷، ۱۶، ۱۵). میزان آلودگی دراهداکنندگان ایرانی در مقایسه با مطالعات دیگران عدد مشابهی را نشان می‌دهد زیرا در مطالعات انجام شده در سایر کشورها عدد به‌دست آمده بین ۴۰٪ تا ۱۰۰٪ است (۱۸). از طرف دیگر مثبت بودن CMV-IgM در نوزادان قبل از دریافت خون احتمالاً به دلیل عفونت قدیمی در مادر می‌باشد که ویروس به‌صورت نهفته در لکوسیت‌ها وجود داشته و هنگام وضع حمل ازطریق خون بندناف به‌نوزاد منتقل شده‌است و به‌نظر می‌آید آنتی‌بادی ایمنی‌زا، خنثی‌کننده CMV-IgG که از طریق جفت به نوزادان رسیده است، نقش پیش‌گیری کننده نداشته است (۱۹).

مقدار خون استفاده شده برای تعویض در هر نوزاد بر اساس وزن هنگام تولد محاسبه می‌شود که به‌طور متوسط ۱۶۰ میلی‌لیتر می‌باشد و با توجه به وزن فرد بالغ که ۶۰ کیلوگرم است، نوزاد حجم خون زیادی رانسبت به وزن دریافت می‌کند ومی‌تواند شانس ابتلابه عفونت درنوزاد را بالاتر ببرد درحالی‌که درمطالعه اخیر بین میزان CMV-IgM و وزن نوزاد ارتباط معنی‌داری به‌دست نیامده است.

نکته مهم این است که نوزادان از نظر ابتلا به عفونت CMV جزو گروه پرخطر می‌باشند و لذا انتقال خون آلوده نقش اساسی را در انتشار این عفونت در نوزادان ایفا می‌نماید. باید سعی شود در صورت امکان خون‌هایی که از نظر CMV منفی می‌باشند یا فقط گلبول قرمز شسته شده را به نوزادانی که از مادران CMV-Ab منفی به‌دنیا آمده‌اند، تزریق نماییم زیرا شواهد زیادی دال بر حضور ویروس CMV نهفته در لکوسیت‌های خون وجود دارد و ثابت گردیده که جدا کردن گلبول‌های سفید از خون و یا خون‌های فاقداین سلول‌ها، به‌طور چشمگیری باعث کاهش انتقال عفونتCMV ناشی از انتقال خون می‌شود (۲۱، ۲۰).

مطالعات انجام شده نشان دهندهٔ وابستگی سن و جنس نوزاد با شیوع عفونت CMV بوده‌اند اما در مطالعه فوق، بین این دو متغیر نسبت به سرایت عفونت از طریق انتقال خون همبستگی دیده نشده است (۲۲).

نتیجه‌گیری

از مطالعهٔ انجام شده می‌توان نتیجه گرفت که نوزادان (به‌خصوص نوزادان نارس) مستعد عفونت‌های متعدد از جمله CMV می‌باشند و گروهی از محققین با اندازه‌گیری بار ویروس مشخص نمودند که شدت بیماری با دوز ویروس ارتباط دارد، بنابراین هرچه میزان خون دریافتی بیشتر باشد احتمال انتقال ویروس در دریافت کننده خون بالا می‌رود و شدت بیماری افزایش می‌یابد (۲۴-۲۱). لذا با کنترل خون‌های مورد نیاز جهت تعویض خون، می‌توان از ابتلا به این نوع عفونت جلوگیری نمود.

پیشنهادات

جهت جلوگیری از ابتلا به CMV پیشنهاد می‌شود:

۱- تلاش جهت استفاده از خون‌های CMV-Ab منفی برای نوزادان مادران CMV-Ab منفی

۲- درصورت عدم توان اجرای مورد فوق، استفاده از خون فاقد لکوسیت یا دارای مقادیر ناچیز لکوسیت جهت تزریق

۳- شناسایی اهداکنندگان مستمر CMV-Ab منفی و استفاده از خون آن‌ها جهت نوزادان

تشکر و قدردانی

هزینه‌های این تحقیق توسط مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران تأمین شده‌است. بدین‌وسیله نویسندگان مقاله مراتب تشکر و قدردانی خود را از مرکز تحقیقات سازمان اعلام می‌دارند.

[Downloaded from bloodjournal.ir on 2026-11-01]

منابع

1- Fields BN, Knipe DM, Chanoch R M, Melnick JL, Roizman B, Shofe RE. Fields virology.2nd ed,1990.
2- R David MK, Peter MH. Fundamental virology 4th ed, 2001.
3- Choen JL, Coreg GR. Cytomegalovirus infection in the normal host. Medicine 1985; 64 (2): 100-114.
4- Vaundrgand VL. Increased prevalence of CMV seropositive in pediatric concology patients. Transfussion 1990; 30 (6): 573-575.
5- Bendon JW. Cytomegalovirus and blood transfusion in neonates. Arch. Dis. Childhood 1979; 54: 538-541.
6- Yeager AS, Smith M, Espy R, *et al*. Prevention of transfusion acquired cytomegalovirus infectious in new born infants. J. Pediater 1981; 98 (2): 281-287.
7- Luban NLC, Moham P, Chandra RS, *et al*. Low incidence of acquired cytomegalovirus infection neonate transfused with washed red blood cells. AJDC 1987; 141: 416-419.
8- Feng CS, Towell HF, Beck WO, *et al*. A comparison of four commercial kits for detection of cytomegalo virus antibodies in blood donors. Transfusion 1986; 26 (20): 203-204.
9- Murrang D, Thompson K. Medical Microbiology. 2nd ed, 1990.
10- Griffiths PD, Emery VC. Cytomegalovirus. In: Richman DD, Whitley RJ. Clinical Virology. Secaucus,NJ.Churchill Livingstone Inc.1997:447-470.
11- Radhakrishnan KM, Chagravarthi S, Pushkala S. Component therapy. Indian J Pediatr. 2003; 70 (8): 661-666.
12- Even O, Lisa S, John G, *et al*. Cytomegalovirus reactivation following allogenic stem cell transplantation is associated with the presence of dysfunctional antigen-specific $CD8^+$ T cells. 2002; 100 (10): 3690-3697.
13- Bendon JWT, Kumar A, Prokay SC, *et al*. Cytomegalovirus and blood transfusion in neonates. A red Dis in childhood. 1979; 54: 538-541.
14- Kumar A, Crayo L, Smith TF, *et al*. Acquistion of cytomegalovirus infection in infants following exchange transfusion.A.P.S.T. 1980; 20(30): 327-331.
15- Vincent C, Alethea V, Cope E, *et al*. The dynamics of human cytomegalovirus replhcation *in vitro*. J Exp Med 1999; 190 (2): 19.
16- Stinksi M F. Molecular basis of cytomegalovirus. In: Roziman B (ed). Herpesviruses. New York. Plenup Publishing Corp. 1983: 67-113.
17- Sderberg-Naucler C, Fish KN, Nelson JA. Reactivation of latent human cytomegalovirus by allogenic stimulaion of blood cells from healthy donors cell. 1997; 91: 119-126.
18- Bers Ford C, Mud Zinski L, Saxniga L, *et al*. Cytomegalovirus infection and blood transfusion. N.Z. Med J 1988; 101: 22-26.
19- Kapadi K, Rice GPA. Cytomegalovirus infection of peripheral blood mononuclear cells. J. Virol 1988; 62: 103-603.
20- Luban NLC, Anderson KC, Sagers MH, *et al*. Low incidence if acquired cytomegalovirus infection in neonates transfused washed red blood cells. AJDC 1987; 141: 416-419.
21- Hentzen DG, Martha H, Glock MLS, *et al*. Prevention of primary cytomegalovirus infection in patients with heamatologic malignancies by intensive white cells depletion of blood products. Transfusion 1989; 29(9): 751-76.
22- Preiksaitis J, Prokay SC, Becroft D, *et al*. The risk of CMV infection on seronegative transfusion recipients not receiving exo-genus immuno suppression.J. infect. Dis 1988; 157 (3): 523-52.
23- Cope A V, Sweny P, Sabin C, *et al*. Quantity of cytomegalovirus viruria is a major risk factor for cyromegalovirus disease after renal transplantation. J Med Viro 1997; 52: 200-205
24- Gor D, Sabin C, Prentice HG, *et al*. Longitudinal fluctuation in cytomegalovirus load in marrow transplant patients. Relationship between peak virus load, donor/recipient serostatus, GVHD and CMV disease. Bone Marrow Transplant 1998; 21: 597-605.

[Downloaded from bloodjournal.ir on 2026-11-01]

The evaluation of cytomegalovirus in infants following exchange transfusion in Children Medical Hospital

Zandieh T.[1](PhD) , Kavyani S.[2](PhD) , Rakhshan M.[3](MD)

[1]Iranian Blood Transfusion Organization-Research Center
[2]Tarbiat Modarres University
[3]Shahid Beheshti Medical University

Abstract

Background and Objectives
During the infancy period, exchange transfusion is the main and effective method of cure for hyperdilirubineamia in hemolytic neonates. One of the risks involved in these patients is CMV infection. Since CMV can inflict and kill children with immunodeficiency, we decided to evaluate blood transmitted CMV infection in infants for the first time in Iran.

Materials and Methods
ln this prospective study, the levels of lgG and IgM antibody against CMV in infants blood sera before and after exchange transfusion, sera of their mothers, and the plasma of donors were evaluated by ELISA method and conventional kits. The data were then analyzed by nonparameteric and mac nemar test.

Results
The level of specific IgM antibody of CMV was 14% in the serum of infants before exchange transfusion and 48% two months after exchange which came out to be significant ($p<0.0001$). This indicates transmittability of CMV infection through blood transfusion since the amount of primary infection of CMV in mothers (IgM) was only 1%.

Conclusions
According to the high level of CMV infection in infants (14%) compared to mothers (1%), it can be concluded that some mothers have latent CMV infection. On the other hand, the high level of CMV infection in infants (48%) 2 months after transfusion is cause of post-transfusion CMV infection. Analysis of the data obtained from dependent varibles such as volume of transfused blood, number of exchange transfusion attempts, weight, age, sex and blood group analyzed by the nonparameteric method indicated that the volume of transfused blood to infants has a direct correlation with the rate of transmission of infection to them but other variables do not have any correlation.

Key words: Cytomegalovirus, Hyperbilirubineamia, Blood transfusion
SJIBTO 2005; 2(4): 83-89

Received: 22 Jun 2004
Accepted: 1 Jan 2005

Correspondence: Zandieh T., PhD of Biologic Components, IBTO-Research Center
P.O.Box: 14665-1157, Tehran, Iran. Tel: (+9821) 88601580; Fax : (+9821) 88601580
E-mail: *Zandyeh@ibto.ir*

[Downloaded from bloodjournal.ir on 2026-11-01]