

خون

فصلنامه علمی پژوهشی

دوره ۶ شماره ۳ پاییز ۸۸ (۲۱۹-۲۲۶)

مقاله پژوهشی

سرو اپیدمیولوژی آنتیژن‌های اصلی سیستم Rh (e, c, E, C, D) و فنوتیپ آن در اهداکنندگان خون شهرستان خرم‌آباد در سال ۱۳۸۶

جهانگیر عبدی^۱، علی اصغر کیانی^{۲*}

چکیده سابقه و هدف

سیستم گروه خونی Rh پس از ABO، مهم‌ترین سیستم گروه خونی از لحاظ بالینی است. ۵ آنتیژن D، C، E، e و c مهم‌ترین و شایع‌ترین آنتیژن‌های گروه خونی هستند و آنتیژن D ایمونوژن‌ترین می‌باشد. هدف از این مطالعه، تعیین درصد فراوانی آنتیژن‌های سیستم Rh (e، c، D، C، E) و فنوتیپ آن‌ها در جمعیت اهداکنندگان شهرستان خرم‌آباد و هم‌چنین شناسایی افراد دارای فنوتیپ‌های نادر و تشکیل بانک اطلاعاتی آن‌ها بود.

مواد و روش‌ها

مطالعه انجام شده از نوع توصیفی بود. نمونه‌گیری به صورت سرشماری بر روی ۱۲۳۶ اهداکننده مراجعه کننده به پایگاه انتقال خون خرم‌آباد انجام گرفت. سوسپانسیون گلبولی ۰.۳-۰.۵٪ در سرم فیزیولوژی تهیه شده با آنتی‌سرم‌های سیستم Rh مواجه گردید. فنوتیپ Rh از لحاظ آنتیژن‌های مهم بالینی فوق و نیز بر اساس شایع‌ترین ژنوتیپ تعیین شد.

یافته‌ها

از میان کلیه واکنش‌های مشاهده شده، بیشترین واکنش مربوط به آنتیژن e (۹۴/۳۴٪)، D (۹۷/۱۰٪)، C (۹۱/۵۷٪) و کمترین واکنش مشاهده شده مربوط به E (۴۳/۵٪) بود. در مورد آنتیژن D (۹۵/۶۲٪)، e (۹۲/۸۸٪)، C (۹۰/۱۴٪)، e (۹۰/۹۵٪) افراد واکنش مثبت و e (۷/۷٪) افراد واکنش منفی داشتند. نتایج واکنش با آنتیژن‌های c و e نیز به ترتیب ۷۳/۵٪ و ۷۱/۲٪ بود.

نتیجه‌گیری

شیوع ۹۲/۸۸ درصدی آنتیژن D در شهرستان خرم‌آباد توجه هر چه بیشتر به واحدهای Rh منفی در بانک‌های خون منطقه را مورد تأکید قرار می‌دهد. از طرفی شیوع نسبتاً قابل توجه اهداکنندگان e منفی لزوم ایجاد بانک گلبول‌های e منفی در مرکز را بیش از پیش مذکور می‌گردد.

کلمات کلیدی: فنوتیپ، سیستم گروه خونی Rh، اهداکنندگان خون، ایران

تاریخ دریافت: ۱۲/۷/۸۶

تاریخ پذیرش: ۱۵/۳/۸۸

۱- مؤلف مسؤول: کارشناس ارشد هماتولوژی و بانک خون - مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران و پایگاه منطقه‌ای خرم‌آباد - کد پستی: ۶۸۱۷۷-۶۸۵۸۵

۲- کارشناس ارشد هماتولوژی و بانک خون - مرتبی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

۴۵۶

اپیدمیولوژیک، شیوع یک شاخص خاص مورد بررسی ممکن است در طول زمان تحت تاثیر عوامل مختلف تغییر نماید، به عنوان مثال در یک مطالعه شیوع آنتی‌ژن D در اهواز در سال ۱۳۶۶، ۹۰ درصد گزارش شده است، حال آن که در بررسی جامع به عمل آمده از سوی دکتر پورفتح‌اله و همکاران روی توزیع گروههای خونی در اهداکنندگان سراسر کشور، میزان شیوع مذکور ۹۴/۵۴٪ در سال ۱۳۸۰ بوده است(۹، ۱۰).

بر همین اساس، ضروری است که مطالعه‌هایی از این قبیل در دوره‌های زمانی مشخص در هر منطقه انجام شود.

مواد و روش‌ها

مطالعه انجام شده از نوع توصیفی بود. نمونه‌گیری به روش سرشماری روی ۱۲۳۶ اهداکننده مراجعه کننده به پایگاه انتقال خون خرم‌آباد در سال ۱۳۸۶ انجام گرفت. سوسپانسیون ۵٪-۳٪ (در سرم فیزیولوژی) گلبول قرمز کلیه اهداکنندگان با آنتی‌سرم‌های مهم سیستم Rh (آنتی - D، آنتی - C، آنتی - E، آنتی - c و آنتی - e و آنتی - CDE : آنتی - D تولید شرکت پژوهش و پالایش پلاسمای سازمان انتقال خون ایران، سایر آنتی‌سرم‌ها همگی از نوع IgM مونوکلونال و تولید شرکت بیوتست آلمان، دارای مجوز مصرف و ارسالی از واحد سرولوژی اختصاصی سازمان) مواجه گردید و کلیه مراحل کاری دقیقاً بر اساس دستورالعمل‌های عملکردی استاندارد موجود و نیز دستورات شرکت‌های سازنده صورت پذیرفت. این کار به صورت روزانه انجام می‌شد و به مدت ۴۰ روز ادامه یافت.

سپس در پایان این دوره، الگوی واکنش‌ها بررسی شد و بر اساس نوع واکنش نمونه‌های گلبولی با آنتی‌سرم‌های مذکور، فنوتیپ Rh آنتی‌ژن‌های مهم بالینی فوق تعیین گردید. در بررسی واکنش‌ها به جدول مربوط به شیوع آنتی‌ژن‌های Rh در جوامع سیاهپوست و سفید پوست استناد گردید، به طوری که شایع‌ترین هاپلوتیپ جهت استنباط محتمل ترین ژنوتیپ و بالطبع فنوتیپ گلبولی مورد استفاده قرار گرفت(جدول ۱).

سیستم Rh یکی از مهم‌ترین سیستم‌های گروه خونی از لحاظ بالینی پس از سیستم ABO است. این سیستم دارای حداقل ۵۰ آنتی‌ژن گروه خونی است که مهم‌ترین و شایع‌ترین آن‌ها ۵ آنتی‌ژن D، E، C، e و e می‌باشند و آنتی‌ژن D ایمونوژن‌ترین این آنتی‌ژن‌ها است(۱، ۲). اهمیت بالینی این آنتی‌ژن‌ها از آن جهت است که اگر به افراد فاقد یک یا چند آنتی‌ژن، گلبول قرمز آنتی‌ژن مثبت تزریق گردد، با احتمال بالایی علیه آن‌ها آنتی‌بادی ایجاد خواهد شد که این آنتی‌بادی در نهایت منجر به تخریب گلبول‌های قرمز تزریق شده و عدم بهره‌گیری بیمار از فرآورده تزریقی می‌گردد(۳-۵). در این میان مهم‌ترین گروهی که همواره در معرض این مشکلات قرار می‌گیرند، بیماران نیازمند به تزریق مداوم خون(Multitransfused) نظیر تالاسمی‌های مازور می‌باشند(۴، ۱). لذا به منظور سهولت دستیابی به فرآورده‌های خونی سازگار برای این افراد و به ویژه افراد آنتی‌ژن‌منفی، اولین قدم آگاهی از درصد فراوانی آنتی‌ژن‌های مذکور در جمعیت اهداکنندگان و قدم دوم تاسیس بانک سلول‌های آنتی‌ژن منفی است.

این اقدام می‌تواند دست‌یابی آسان‌تری را به فرآورده‌های مورد نظر فراهم نماید. به عنوان مثال فراوانی آنتی‌ژن e در اکثر مطالعه‌ها در جمعیت سفید پوست حدود ۹۸٪ است. اگر یک بیمار تالاسمی مازور علیه این آنتی‌ژن حساس گردد، یافتن خون سازگار برای وی بسیار مشکل خواهد بود، اما با تشکیل بانک سلول‌های e منفی که از اهداف این مطالعه است، دسترسی به این فرآورده تسهیل می‌گردد. از طرفی در کلیه مراکز انتقال خون، انجام Rh typing روی کلیه اهداکنندگان صرفاً از نظر آنتی‌ژن D صورت می‌گیرد، اما این دلیلی بر نادیده گرفتن اهمیت چهار آنتی‌ژن مهم دیگر این سیستم نیست(۶-۸).

متاسفانه در حال حاضر در کشور ما اطلاع درست و جامعی از فراوانی آنتی‌ژن‌های سیستم Rh (به جز D) وجود ندارد و صرفاً محدود به یک سری مطالعه‌های منطقه‌ای است و یا چنانچه مطالعه‌ای صورت پذیرفته، معمولاً قدیمی می‌باشد و نمی‌توان به راحتی به یافته‌های حاصل از آن استناد نمود. به ویژه این که در مطالعه‌های

جدول ۱: فنوتیپ‌های Rh به همراه ژنوتیپ‌های احتمالی و فراوانی آن‌ها در یک جمعیت سفیدپوست، واکنش بعضی از آنتی‌بادی‌ها با آنتی‌ژن مرکب و نیز واکنش آنتی – G ارایه شده است (۲)

Antigens						Genotypes	Frequency (%)	Other antigens						
D	C	c	E	e	Phenotype			ce	Ce	CE	cE	G		
+	+	-	-	+	DCe/DCe	R ₁ R ₁	DCe/DCe DCe/dCe	R ¹ /R ¹ R ¹ r'	17.68 0.82	-	+	-	-	+
+	-	+	+	-	DcE/DcE	R ₂ R ₂	DcE/DcE DcE/dcE	R ² R ² R ² r''	1.99 0.34	-	-	-	+	+
+	-	+	-	+	Dce/dce	R ₀ r	Dce/dce Dce/Dce	R ⁰ r R ⁰ R ⁰	2.00 0.07	+	-	-	-	+
+	+	-	+	-	DCE/DCE	R _z R _z	DCE/DCE DCE/dCE	R ^z R ^z R ^z r'	<0.01 <0.01*	-	-	+	-	+
+	+	+	-	+	DCe/dce	R ₁ r	DCe/dce DCe/Dce Dce/dCe	R ¹ r R ¹ R ⁰ R ⁰ r'	32.68 2.16 0.05	+	+	-	-	+
+	-	+	+	+	DcE/dce	R ₂ r	DcE/dce DcE/Dce Dce/dcE	R ² r R ² R ⁰ R ⁰ r''	10.97 0.73 0.06	+	-	-	+	+
+	+	-	+	+	DCe/DCE	R ₁ R _z	DCe/DCE DCE/dCe Dce/dCE	R ¹ R ^z R ^z r' R ¹ r'	0.20 <0.01 <0.01*	-	+	+	-	+
+	+	+	+	-	DcE/DCE	R ₂ R _z	DcE/DCE DCE/dcE DcE/dCE	R ² R ^z R ^z r'' R ² r'	0.07 <0.01 <0.01*	-	-	+	+	+
+	+	+	+	+	DCe/DcE	R ₁ R ₂	DCe/DcE DCe/dcE DcE/dCe DCE/dce Dce/DCE Dce/dCE	R ¹ R ² R ¹ r'' R ² r' R ^z r R ⁰ R ^z R ⁰ r'	11.87 1.00 0.28 0.19 0.01 <0.01*	-	+	-	+	+
-	+	-	-	+	dCe/dCe	r'r'	dCe/dCe	r'r'	0.01	-	+	-	-	+
-	-	+	+	-	dcE/dcE	r''r''	dcE/dcE	r''r''	0.01	-	-	-	+	-
-	-	+	-	+	dce/dce	rr	dce/dce	rr	15.10	+	-	-	-	-
-	+	-	+	-	dCE/dCE	r _y r _y	dCE/dCE	r _y r _y	<0.01*	-	-	+	-	+
-	+	+	-	+	dCe/dce	r'r	dCe/dce	r'r	0.76	+	+	-	-	+
-	-	+	+	+	dcE/dce	r'r	dcE/dce	r'r	0.92	+	-	-	+	-
-	+	-	+	+	dCe/dCE	r'r _y	dCe/dCE	r'r _y	<0.01*	-	+	+	-	+
-	+	+	+	-	dcE/dCE	r''r _y	dcE/dCE	r''r _y	<0.01*	-	-	+	+	+
-	+	+	+	+	dcE/dCe	r''r'	dcE/dCe	r''r'	0.02	-	+	-	+	+
							dCE/dce	r'r	<0.01*	+	-	+	-	+

*بسیار نادر

جدول ۲: فراوانی فنوتیپ‌های Rh در کنار شایع‌ترین ژنوتیپ

فرابواني (درصد)	تعداد	شایع‌ترین ژنوتیپ		فنوتیپ	آنتی‌زن‌هایی که حضور دارند	واکنش با آنتی-				
		CDE	Rh-hr			D	C	E	c	e
۲۸/۲	۳۵۰	CDe/cde	R ¹ r	DCee	D, C, c, e	+	+	-	+	+
۲۶/۹	۳۳۰	CDe/ CDe	R ¹ R ¹	DCe	D, C, e	+	+	-	-	+
۱۶/۳	۲۰۲	CDe/cDE	R ¹ R ²	DCEce	D, C, E, c, e	+	+	+	+	+
۳/۷	۴۶	cDe/ce	R ^o r	Dce	D, c, e	+	-	-	+	+
۱۰/۶	۱۳۱	cDE/ce	R ² r'	DEce	D, E, c, e	+	-	+	+	+
۴/۳	۵۳	cDE/ cDE	R ² R ²	DEc	D, E, c	+	-	+	+	-
۰/۸	۱۰	CDe/CDE	R ¹ R ^z	DCEe	D, C, E, e	+	+	+	-	+
< ۰/۰۰۱	۱	cDE/CDE	R ² R ^z	DCEc	D, C, E, c	+	+	+	+	-
۰/۷	۷۱	cde/cde	rr	ce	c, e	-	-	-	+	+
۱/۲۱	۱۵	Cde/cde	r'r	Cce	C, c, e	-	+	-	+	+
۰/۴۰	۵	cdE/cde	r''r	Ece	E, c, e	-	-	+	+	+
< ۰/۰۰۱	۱	?		Cc	C, c	-	+	-	+	-
۰/۴۰	۵	?		De	D, e	+	-	-	-	+
۱/۱۳	۱۴	?		DEe	D, E, e	+	-	+	-	+
< ۰/۰۰۱	۱	cdE/Cde	r''/r'	CEce	C, E, c, e	-	+	+	+	+
< ۰/۰۰۱	۱	Cde/Cde	r'r'	Ce	C, e	-	+	-	-	+
۱۰۰	۱۲۴۰			مجموع						

جهان نشان داده شده است (جدول ۱-۳). شایع‌ترین ژنوتیپ در هر گروه از افراد با فنوتیپ‌های مشخص،

جدول ۳: فراوانی آنتی‌زن‌های مهم سیستم Rh بر اساس واکنش سرولوژیک

لازم به ذکر است که نتایج کلیه واکنش‌ها در کنار سایر اطلاعات اهداکنندگان در کامپیوتر و برنامه نگاره (نرم‌افزار مورد استفاده در سازمان انتقال خون ایران به منظور ثبت اطلاعات ضروری افراد که با هدف اهدای خون مراجعه می‌نمایند) ثبت گردیده است.

فاصله اطمینان	فرابواني (درصد)	تعداد	آنتی‌زن‌ها
۹۷/۱۰	۹۱/۵۷	۹۴/۳۴	۱۱۶۶
۶/۳۴	۴/۹۹	۵/۶۶	e-
۷۳/۸۴	۶۹/۰۴	۷۱/۴۴	c+
۳۰/۰۸	۲۷/۰۴	۲۸/۵۶	c-
۴۵/۵۷	۴۱/۸۱	۴۳/۶۹	E+
۵۸/۴۴	۵۴/۱۸	۵۶/۳۱	E-
۷۶/۱۵	۷۱/۲۶	۷۳/۷۱	C+
۲۷/۷۵	۲۴/۸۴	۲۶/۲۹	C-
۹۵/۶۲	۹۰/۱۴	۹۲/۸۸	D+
۷/۸۸	۶/۳۶	۷/۱۲	D-

یافته‌ها

از میان کلیه واکنش‌های مشاهده شده بین گلبول‌های قرمز اهداکنندگان و آنتی‌سرمهای تجاری، بیشترین واکنش مربوط به آنتی‌زن e (%۹۴/۴) با فاصله اطمینان -۹۷/۱۰ (۹۱/۵۷) و کمترین واکنش مشاهده شده مربوط به آنتی‌زن E (%۴۳/۵) بود. کلیه اطلاعات مربوط به واکنش‌های مشاهده شده با آنتی‌سرمهای تجاری آنتی-D، آنتی-C، آنتی-C-، آنتی-e و آنتی-c و نیز فنوتیپ‌ها و شایع‌ترین ژنوتیپ‌ها هم چنین ژنوتیپ‌های احتمالی بر اساس مطالعه‌های Rh انجام گرفته در جمعیت‌های سفیدپوست در

خواهد بود و لذا با مراجعه به این بانک اطلاعاتی، پیدا کردن خون سازگار فوق راحت خواهد بود.

۳- کاهش واکنش‌های تاخیری انتقال خون:
 گرچه انجام Rh typing (D) روی کلیه خون‌های اهدایی الزامی است، اما چون چهار آنتی‌ژن دیگر این سیستم بررسی نمی‌شوند، اگر گیرنده خون یک خانم در سینین بارداری باشد و فاقد یکی از آنتی‌ژن‌ها باشد، احتمال آلوایمونیزاسیون و بیماری همولیتیک نوزاد HDN (Hemolytic disease of the newborn) را باید در نظر گرفت و مواردی از این بیماری در اثر آنتی‌بادی سیستم Rh به جز D گزارش شده است^(۱-۳)، اما اگر گیرنده خون یک بیمار مولتی ترانسفیوز، مثل تالاسمی مادرور باشد، وضعیت وخیم‌تر خواهد بود و نکته مهم این که مواردی از آلوایمونیزاسیون در این گروه از بیماران توسط آنتی‌ژن‌های سیستم Rh نیز گزارش شده است^(۱۶-۱۹). با مطالعه‌های سرولوژیک و از طریق فتوتیپ و فراوانی ژن‌های (و یا آنتی‌ژن‌ها) سیستم Rh، صرفاً می‌توان ژنوتیپ Rh یک فرد را استنباط نمود، اما در حقیقت تعیین ژنوتیپ دقیق افراد بدون آنالیز DNA و مطالعه‌های خانوادگی، تقریباً غیر ممکن است. موارد معده‌دی از عدم تطابق نتایج سرولوژیک و مولکولی وجود دارد که ممکن است یک مخاطره انتقال خون تلقی شوند^(۲۰-۲۲). آنالیز مولکولی DNA ممکن است بسیاری از موارد غیر قابل تفسیر در واکنش‌های سرولوژیک را شناسایی نماید^(۲۳، ۵). در این مطالعه در سه گروه از افراد، استنباط ژنوتیپ از روی فنوتیپ مشاهده شده امکان‌پذیر نبود زیرا نظری این واکنش‌ها در جدول مربوط به اطلاعات ژنوتیپی (جدول ۱) جمعیت سفیدپوست‌ها وجود نداشت و احتمال داده شد که علت آن عدم توانایی آنتی‌سرم‌ها در واکنش با گلبول‌ها به دلیل تضعیف بیان آنتی‌ژن ناشی از توارث هاپلوتیپ‌های خاص بوده است و در چنین مواردی آنالیز مولکولی کمک کننده خواهد بود اما امکان انجام آن در این مطالعه به هیچ عنوان وجود نداشت^(۲۵).

در مقایسه با مطالعه‌های مشابه انجام شده در داخل کشور یا در جهان، تفاوت‌هایی در فراوانی آنتی‌ژن‌های Rh

با توجه به شایع‌ترین ژن‌های سیستم Rh در جمعیت‌های سفیدپوست، به ترتیب از بیشترین فراوانی به کمترین cDe(R⁰)، cDE(R¹)، CDe(r)، cDE(R²) و e می‌باشند. لازم به ذکر است که بر همین اساس، در سه گروه از واکنش‌ها استنباط ژنوتیپ امکان‌پذیر نبود و احتمال داده شد که علت آن عدم توانایی آنتی‌سرم در واکنش با گلبول‌های قرمز به دلیل تضعیف بیان آنتی‌ژن و یا عدم وجود تراکم کافی مکان‌های آنتی‌ژنیک بر سطح گلبول قرمز بوده است.

بحث

سیستم Rh از لحاظ اهمیت بالینی، احتمالاً مقام دوم را پس از سیستم ABO به خود اختصاص می‌دهد. بیش از ۵۰ آنتی‌ژن در این سیستم شناسایی شده است اما مهم‌ترین آن‌ها از لحاظ بالینی و فراوانی در جمعیت‌ها، E، C، D، e می‌باشند^(۳-۱). آگاهی از فراوانی آنتی‌ژن‌های این سیستم به منظور مطالعات جمعیتی و نیز در آزمون‌های ابوت (Paternity testing) ضروری می‌باشد^(۱۵-۱۱). اما اهمیت انجام این مطالعه روی اهداکنندگان خون چیست؟ به دلایل زیر انجام این مطالعه در اهداکنندگان هر منطقه ضروری است:

۱- تعیین فراوانی این آنتی‌ژن‌ها:

اطلاع از فراوانی آن‌ها، کمک به مدیریت مصرف و حفظ ذخایر خونی می‌کند. به عنوان مثال در منطقه‌ای که شیوع آلل و لذا آنتی‌ژن D بالاست، مرکز انتقال خون موظف به حفظ ذخایر خونی D است.

۲- سازماندهی واحدهای خونی آنتی‌ژن منفی:

با انجام Rh phenotyping، مرکز انتقال خون قادر خواهد بود سازماندهی دقیق و جالبی از واحدهای تولیدی خود ایجاد نماید و این کار تامین خون بیماران مولتی ترانسفیوز حساس شده را تسريع می‌بخشد، به عبارتی، تشکیل بانک سلول‌های آنتی‌ژن منفی، به ویژه e که در این مطالعه فراوانی ۹۴/۳۴٪ دارد، به طوری که ۵/۶٪ اهداکنندگان برای این آنتی‌ژن منفی هستند که اگر به کل جمعیت اهداکنندگان تعیین داده شود رقم قابل توجهی

در اکراین ۷۰ درصد اعلام شده است و در آفریقا، در کنیا سال ۱۹۹۲، ۹۶/۱ درصد، گینه سال ۹۴/۸، ۲۰۰۷ درصد و در سال ۲۰۰۳ در نیجریه ۹۵ درصد گزارش شده است(۱۳-۳۱). لازم به ذکر است که این اختلاف شیوع آنتی‌ژنی، در سایر آنتی‌ژن‌های سیستم Rh هم دیده می‌شود.

همان گونه که مشاهده می‌شود، آنتی‌ژن‌های سیستم Rh در مناطق مختلف دارای شیوع متفاوتی می‌باشند و ضروری است که هر منطقه با تعیین فنوتیپ آنتی‌ژن‌های مهم گروه‌های خونی، برنامه‌ریزی صحیحی جهت تهیه و حفظ موجودی فرآورده‌های خونی داشته باشد.

نتیجه‌گیری

این مطالعه نشان می‌دهد که پراکنده‌گی آنتی‌ژن‌های Rh در اهداکنندگان شهرستان خرم‌آباد با برخی مناطق بررسی شده در کشور و نیز برخی مطالعه‌های جهانی تفاوت نشان می‌دهد و نیز با توجه به شیوع نسبتاً بالای آنتی‌ژن D، حفظ ذخایر خونی آنتی‌ژن منفی از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

مشهود است. فراوانی آنتی‌ژن D در اهواز در سال ۱۹۸۸ ۹۰ درصد گزارش شده است(۹). در سال ۱۹۹۴ (۱۳۷۳) در مطالعه دکتر فرهود و همکاران، شیوع این آنتی‌ژن در استان لرستان ۹۱/۸۷ درصد و در بررسی جامع دکتر پورفتح‌الله از توزیع گروه‌های خونی سراسر کشور در طول سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۸۰، به ترتیب ۹۱/۸۷ و ۹۱/۹۳ درصد اعلام شده است(۱۰، ۲۶). آقای دکتر فرهود شایع‌ترین فنوتیپ Rh را $R_{1r}R_z$ (۲۸/۵ درصد) و نادرترین را $R_{1R}R_z$ (۰/۰۱ درصد) اعلام می‌کنند، که با یافته‌های مطالعه ما شباهت زیادی نشان می‌دهند(به ترتیب ۲۸/۲ و صفر درصد). هم چنین در اصفهان آقای دکتر معافی و همکاران در سال ۱۳۸۳، فراوانی آنتی‌ژن‌های E، C، e را به ترتیب ۸۱/۲۳، ۷۲/۶۶، ۷۲/۶۶ و ۹۵/۳۳ درصد اعلام نمودند که تفاوت قابل توجه آن با نتایج مطالعه ما در آنتی‌ژن‌های E (۴۳/۵ درصد) و C (۷۳/۵ درصد) است(۱۶).

در کشورهای آسیایی، در سال ۲۰۰۶ شیوع آنتی‌ژن D در هند ۹۴ درصد، در سال ۱۹۹۹ در ترکیه ۸۶ درصد و در سال ۲۰۰۵ در چین ۹۰ درصد بوده است(۱۲، ۲۷، ۲۸). در اروپا در سال ۱۹۹۵ در آلمان، ۹۵ درصد و در سال ۲۰۰۳

References :

- 1- Avent ND, Reid ME. The Rh blood group system: a review. *Blood* 2000; 95: 375-87.
- 2- Daniels G. Human Blood Groups. 2nd ed. Oxford: Blackwell Science LTD; 2002. p.195-250.
- 3- Mota MA, Sakashita A, Kutner JM, Castilho L. Applications of blood group genotyping. *Einstein* 2006; 4(1): 27-31.
- 4- Canatan D, Acar N, Kilic B. Rh Subgroups and Kell Antigens in Patients With Thalassemia and in Donors in Turkey. *Tr J of Medical Sciences* 1999; 29: 155-7.
- 5- Castilho L, Rios M, Bianco C, Pellegrino J Jr, Alberto FL, Saad ST, et al. DNA-based typing of blood groups for the management of multiply-transfused sickle cell disease patients. *Transfusion* 2002; 42: 232-8.
- 6- Joy SD, Rossi KQ, Krugh D, O'Shaughnessy RW. Management of pregnancies complicated by anti-E alloimmunization. *Obstet Gynecol* 2005; 105(1): 24-8[abstract].
- 7- Hackney DN, Knudtson EJ, Rossi KQ, Krugh D, O'Shaughnessy RW. Management of pregnancies complicated by anti-c alloimmunization. *Obstet Gynecol* 2004;103(1): 24-30[abstract].
- 8- Palfi M, Gunnarsson C. The frequency of anti-C + anti-G in the absence of anti-D in alloimmunized pregnancies. *Transfus Med* 2001;11(3): 207-10.
- 9- Marzban M, Kamali MS, Hosseini T. Blood groups of the people of Ahwaz, Iran. *Anthropol Anz* 1988; 46(1): 83-9.
- 10- Pourfathollah AA, Oody A, Honarkaran N. Geographic distribution of ABO and Rh blood groups among Iranian blood donors and comparison of their frequencies between the years 1982 and 2001.The Scientific J of Iranian Blood transfusion Organization 2004; 1(1): 11-17 [Article in Farsi].
- 11- Garratty G, Glynn SA, McEntire R. ABO and Rh(D) phenotype frequencies of different racial/ ethnic groups in the United States. *Transfusion* 2004; 44: 703-6.
- 12- Yan L, Zhu F, Fu Q, He J. ABO, Rh, MNS, Duffy, Kidd,Yt, Sciana, and Colton blood group systems in indigenous Chinese. *Immunohematol* 2005; 21(1): 10-14.
- 13- Wagner FF, Kasulke D, Kerowgan M, Flegel WA. Frequencies of the blood groups ABO, Rhesus, D category VI, Kell, and of clinically relevant high-frequency antigens in south-western Germany. *Infusions ther Transfusions med* 1995; 22(5): 285-90.
- 14- Lyko J, Gaertner H, Kaviti JN, Kariithi MW, Akoto B. [Blood-group systems ABO and RH in the Kenyan population].*Folia Med Cracov* 1992; 33(1-4): 85-92. [Article in Polish].
- 15- Souiden Y, Chaieb K, Romdhani M, Mahdouani K. Contribution of the genetic fingerprints compared to grouping ABO/Rhesus technique in the expertise of filiation. *Ann Biol Clin* 2007; 65(6): 663-70.
- 16- Maafi AR, Rahgozar S, Pourfathollah AA, Hariri MM. Evaluation of distribution of blood group antigens in patients with thalassemia intermedia and blood donors in Isfahan, the years 2003 and 2004. The Scientific J of Iranian Blood transfusion Organization 2005; 2(3): 23-29 [Article in Farsi].
- 17- Kiani AA, Abdi J, Shirkhani Y, Kashi M. Prevalence of alloimmunization against RBC antigens in thalassemia major patients of Lorestan province. *The Scientific J of Iranian Blood transfusion Organization* 2006; 3(3): 265-71 [Article in Farsi].
- 18- Karimi M, Nikrooz P, Kashef S, Jamalian N, Davatolagh Z. RBC alloimmunization in blood transfusion-dependent β-thalassemia patients in southern Iran. *Int Jnl Lab Hem* 2007;29: 321-6.
- 19- Randen I, Sørensen K, Hauge R, Dahlberg AB, Mirlashari MR, Thompson KM, et al. Accurate Rh phenotype determination by reticulocyte mRNA typing shortly after multiple transfusions. *Haematologica* 2008; 93(4): 627-30.
- 20- Noizat-Pirenne F, Lee K, Pennec PY, Simon P, Kazup P, Bachir D, et al. Rare RHCE phenotypes in Black individuals of Afro-Caribbean origin: identification and transfusion safety. *Blood* 2002; 1: 1-38.
- 21- Okuda H, Kawano M, Iwamoto S, Tanaka M, Seno T, Okubo Y, et al. The RHD Gene Is Highly Detectable in RhD-negative Japanese Donors. *J Clin Invest* 1997; 100(2): 373-9.
- 22- Castilho L, Rios M, Pellegrino J Jr, T O Saad S, F Costa F. Blood group genotyping facilitates transfusion of beta-thalassemia patients. *J Clin Lab Anal* 2002; 16(5): 216-20.
- 23- Chérif-Zahar B, Raynal V, D'Ambrosio AM, Cartron JP, Colin Y. Molecular analysis of the structure and expression of the RH locus in individuals with D--, Dc-, and DCw- gene complexes. *Blood* 1994; 84(12): 4354-60.
- 24- Irshaid NM, Ramadan S, Wester ES, Olausson P, Hellberg A, Merza JY, et al. Phenotype prediction by DNA-based typing of clinically significant blood group systems in Jordanian blood donors. *Vox Sanguinis* 2002; 83: 55-62.
- 25- Moulds MK. Monoclonal reagents and detection of unusual or rare phenotypes or antibodies. *Immunohematology* 2006; 22(2): 52-63.
- 26- Farhud DD, Eftekhari A. Blood Groups Distribution in Iran. *Iranian J Publ Health* 1994; 3(1-4): 1-10.
- 27- Tripathy V, Satapathy KC, Gupta R. ABO and Rh D polymorphism among Tibetans in India. *Hum Biol* 2006; 78(2): 229-33.
- 28- Canatan D, Nilgün Acar, Kilic B. Rh Subgroups and Kell Antigens in Patients With Thalassemia and in Donors in Turkey. *Tr J of Medical Sciences* 1999; 29: 155-7.
- 29- Mukhin VN, Chinakh DG, Avdeev AV, Kuleba VV, Afanasev MV. Gene frequencies and heterozygosity of the ABO and RH blood group alleles in the populations of two cities of the Donetsk region, Ukraine. *Genetika* 2003; 39(4): 530-3.
- 30- Loua A, Lamah MR, Haba NY, Camara M. Frequency of blood groups ABO and rhesus D in the Guinean population. *Transfus Clin Biol* 2007; 14(5): 435-9.
- 31- Jeremiah ZA, Buseri FI. Rh antigen and phenotype frequencies and probable genotypes for the four main ethnic groups in port Harcourt, Nigeria. *Immunohematology* 2003; 19(3): 86-8.

Original Article

Seroepidemiologic evaluation of Rh system major antigens(D,C,E,c,e) and their phenotypes among the blood donors in Khorramabad, Iran

Abdi J.^{1,2}(MS), Kiani AA.³(MS)

¹*Khorramabad Regional Blood Transfusion Center, Iran*

²*Iranian Blood Transfusion Organization Research Center, Tehran, Iran*

³*Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, Iran*

Abstract

Background and Objectives

Knowing the frequency of D,C,E,c,e antigens is necessary for population studies and plays a significant role in paternity tests. The purpose of this research is to determine the frequency of Rh antigens and their phenotypes in Khorramabad blood donors and to set up the data bank of individuals lacking the very common antigens.

Materials and Methods

The study was carried out as census on 1236 blood donors referring to Khorramabad Blood Center. Appropriate cell suspensions were incubated with several Rh antiserums; then, based on the type of reactions observed and most probable genotypes identified by reference to tables of Rh antigens frequency in black and white populations, phenotypes for main antigens were determined.

Results

Out of all observed reactions, the most common ones were associated with the e antigen (94.34% , CI 95% = 91.57-97.10) and the least with the E antigen (43.5%). As to D antigens, 92.88% (CI 95% = 90.14-95.65) of individuals were positive and 7.4% were negative. The results were 73.5% and 71.2% for C and c antigens, respectively.

Conclusions

A 92.88% frequency for D antigen in Khorramabad city blood donors indicates a high regional difference in frequency. As a result, Rh negative blood units in the region deserve much more attention. In the meantime, the relatively significant frequency of e negative donors in the region more than ever emphasizes the necessity of setting up an e negative blood bank.

Key words: phenotype, Rhesus Blood-Group System, Blood donors , Iran
Sci J Iran Blood Transfus Org 2009; 6(3): 219-226

Received: 3 Oct 2007

Accepted: 5 Jun 2009

Correspondence: Abdi J., MS of Hematology. Khorramabad Regional Blood Transfusion Center and Iranian Blood Transfusion Organization-Research Center.

Postal code: 68177-68585, Khorramabad, Iran. Tel: (+98661) 3224641; Fax: (+98661) 3200532

E-mail: *J.ABDI@UU.NL*