

سطح پروتئین‌های ضد انعقادی طبیعی و مقاومت به پروتئین C فعال در بیماران مبتلا به ترومبوآمبولی سیاهرگی مراجعه کننده به سازمان انتقال خون ایران، تهران

مینو احمدی‌نژاد^۱، علی رجبی^۲، داوود بشاش^۳، سیما ذوالفقاری انارکی^۴، کامران عطاردی^۵، سید محمدرضا طباطبایی^۶، سیده لادن سید مرتاض^۷، سمیه رن بلوچ^۸، صدیقه امینی کافی‌آباد^۹، حسن ابوالقاسمی^{۱۰}

چکیده

سابقه و هدف

کمبود آنتی‌ترومبین (AT)، پروتئین C (PC) و پروتئین S (PS) و نیز مقاومت به پروتئین C فعال (APC-R) از مهم‌ترین علل ارثی ترومبوآمبولی سیاهرگی (VTE) هستند. با توجه به کمبود مطالعه‌ها در خصوص شیوع نقایص پروتئین‌های ضد انعقادی طبیعی در بیماران مبتلا به ترومبوز در ایران، هدف از این پژوهش بررسی فراوانی اختلالات عوامل یاد شده در گروهی از بیماران ایرانی مبتلا به VTE بود.

مواد و روش‌ها

پژوهش از نوع توصیفی و گذشته‌نگر بود. نمونه‌گیری به روش آسان از ۷۴۳ بیمار با نشانه‌های VTE مراجعه کننده به آزمایشگاه مرجع انعقاد سازمان انتقال خون ایران طی سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ انجام شد. پس از حذف بیماران با تاریخچه ترومبوفیلی اکتسابی، فعالیت AT، PC، PS و APC-R در ۴۰۴ بیمار بررسی شد. مقایسه نتایج این پژوهش با پژوهش‌های دیگر جوامع با آزمون Z انجام شد.

یافته‌ها

۳۶۹ بیمار (۹۱/۳٪) مبتلا به DVT، ۶۳ بیمار (۱۵/۶٪) آمبولی ریوی و ۹ بیمار (۲/۲٪) به ترومبوز در دیگر نواحی بدن بودند. در ۳۹ بیمار (۹/۶٪) دو نوع ترومبوز به طور هم‌زمان وجود داشت. کمبود PS در ۹۲ بیمار (۲۲/۸٪)، APC-R در ۴۴ بیمار (۱۰/۹٪)، کمبود PC در ۲۷ بیمار (۶/۷٪)، کمبود AT در ۲۱ بیمار (۵/۲٪) و کمبودهای مرکب در ۳۶ بیمار (۸/۹٪) یافت گردید.

نتیجه‌گیری

کمبود PS و پس از آن APC-R شایع‌ترین نقایص ارثی در بیماران مورد مطالعه بودند. یافته‌های این پژوهش هم‌خوانی بیشتری با پژوهش‌های انجام شده در کشورهای آسیایی نسبت به مطالعه‌های اروپایی - آمریکایی داشت. مطالعه‌های جامع‌تری جهت اثبات فراوانی بالای کمبود پروتئین S در جامعه بیماران ایرانی لازم است.

کلمات کلیدی: ترومبوآمبولی سیاهرگی، ترومبوز سیاهرگ عمقی، آمبولی ریوی، آنتی‌ترومبین، پروتئین C، پروتئین S، مقاومت به پروتئین C فعال

تاریخ دریافت: ۱۹/۶/۳۱

تاریخ پذیرش: ۱۹/۱۰/۱

- ۱- مؤلف مسئول: متخصص آسیب‌شناسی بالینی و تشریحی - مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران - تهران - صندوق پستی: ۱۱۵۷-۱۴۶۶۵
- ۲- کارشناس ارشد هماتولوژی و بانک خون - دانشگاه تربیت مدرس
- ۳- PhD هماتولوژی و بانک خون - دانشگاه علوم پزشکی تهران
- ۴- متخصص آسیب‌شناسی بالینی و تشریحی - استادیار مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران
- ۵- دانشجوی PhD هماتولوژی و بانک خون - مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران و دانشگاه تربیت مدرس
- ۶- کارشناس ارشد هماتولوژی و بانک خون - مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران
- ۷- کارشناس بیولوژی - مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران
- ۸- کاردان علوم آزمایشگاهی - مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران
- ۹- متخصص آسیب‌شناسی بالینی و تشریحی - استادیار مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران
- ۱۰- فوق تخصص خون و انکولوژی کودکان - استاد مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران و دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌... اعظم

مقدمه

ترومبوآمبولی سیاهرگی (Venous Thromboembolism, VTE) سومین ناهنجاری شایع عروقی در دنیا پس از نارسایی ایسکمیک قلبی و سکته‌های مغزی (Stroke/CVA) محسوب می‌شود (۱، ۲). VTE به طور معمول با ترومبوز سیاهرگ عمقی (Deep Vein Thrombosis, DVT) و در درجه بعدی با آمبولی ریوی (Pulmonary Embolism, PE) خود را نشان می‌دهد. ترومبوز سیاهرگی در دیگر نواحی بدن مانند احشا (عروق شکمی، کبد، کلیه)، مغز و چشم (Thrombosis at Unusual Sites, TUS) بسیار کم‌یاب است (۳، ۴). عوامل خطر برای بروز VTE به دو دسته ارثی و اکتسابی تقسیم می‌شوند که کمبود آنتی‌ترومبین (Anti-thrombin, AT)، کمبود پروتئین‌های C (Protein C, PC)، S (thrombin, AT Activated) و مقاومت به پروتئین C فعال (Protein S, PS) (Protein C- Resistance, APC-R) جزو مهم‌ترین عوامل ارثی محسوب می‌شوند (۵).

AT یک بازدارنده سرین‌پروتئاز (سرپین) است که ترومبین و فاکتور ۱۰ فعال انعقادی و به میزان کمتری، دیگر فاکتورهای انعقادی مانند فاکتور ۹، ۱۱ و ۱۲ فعال را غیرفعال می‌کند و مانع از انعقاد خون می‌شود. بیماران مبتلا به کمبود AT استعداد بالایی برای ابتلا به ترومبوز به ویژه ترومبوز سیاهرگی دارند که بیشتر به صورت DVT در پاها و PE ظاهر می‌شود، اما گاهی ترومبوز در نواحی غیر معمول (TUS) مانند سیاهرگ‌های سینوس مغزی، مزاتر، پورتال کبدی، کلیوی و شبکه هم رخ می‌دهد (۶).

پروتئین‌های C و S از پروتئین‌های ضد انعقادی وابسته به ویتامین K هستند. PC در شکل فعال خود (Activated Protein C, APC) سبب غیر فعال کردن عوامل فعال انعقادی ۵ و ۸ با شکافت پروتئین کافت (پروتئولیتیک) آن‌ها می‌شود و PS نقش عامل همراه را برای APC در غیر فعال سازی عوامل فعال ۵ و ۸ انعقادی ایفا می‌کند (۷، ۸).

بیماران مبتلا به کمبودهای شدید PC و PS به طور معمول دچار پورپورای برق‌آسا در دوره نوزادی می‌شوند و افراد مبتلا به کمبود خفیف این دو پروتئین دارای افزایش استعداد به ترومبوزهای وریدی، به ویژه DVT و PE و به طور نادرتری TUS هستند (۷، ۸).

وجود یک جهش Arg506Gln در فاکتور ۵ انعقادی که محل اثر APC می‌باشد، سبب ایجاد مقاومت به پروتئین C فعال می‌شود (۹). APC-R معمول‌ترین نقص ارثی انعقادی در دنیا می‌باشد که تاکنون شناسایی شده است، با این حال، APC-R نسبت به کمبود پروتئین‌های C، S و AT با خطر پایین‌تر ترومبوز همراه است و نشانه‌های ترومبوزی مربوط به آن هم به طور معمول کم‌خطرتر است (۱۱، ۱۰، ۵).

هدف از این پژوهش، بررسی میزان شیوع نقایص ارثی پروتئین‌های ضد انعقادی طبیعی C، S، AT و هم‌چنین مقاومت به پروتئین C فعال در بیماران مبتلا به ترومبوآمبولی سیاهرگی مراجعه کننده به بخش انعقاد سازمان انتقال خون ایران و ارزیابی اهمیت سنجش این نقایص به عنوان آزمون‌های غربالگری ترومبوز در این بیماران بوده است.

مواد و روش‌ها

مطالعه از نوع توصیفی - گذشته‌نگر (descriptive-retrospective) بود. نمونه‌گیری به روش آسان (convenience sampling) بر روی ۲۲۰۰ بیمار که در مدت ۲ سال طی سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ به آزمایشگاه مرجع انعقاد سازمان انتقال خون ایران به منظور غربالگری آزمون‌های ترومبوفیلی مراجعه کرده بودند، انجام شد. هم‌زمان با جمع‌آوری نمونه، اطلاعات بالینی بیماران به صورت شرح حال‌گیری به دست آمد. بنابراین علت مراجعه و تشخیص بیماران و هم‌چنین انتخاب بیماران مبتلا به ترومبوزهای سیاهرگی، از روی فرم‌های شرح حال مد نظر قرار گرفت. لازم به ذکر است که بر این اساس، ممکن است اطلاعات بالینی، تشخیص و هم‌چنین وضعیت داروهای ضد انعقاد مصرفی بیمار به علت عدم اطلاع کافی بیمار و همراه وی (در مورد بیماران بستری در بیمارستان)، متفاوت از وضعیت بالینی واقعی بیماران بوده باشد، برای نمونه احتمال دارد که تعداد موارد ترومبوفیلی اکتسابی واقعی بیشتر از موارد به دست آمده در این پرسش‌نامه‌ها باشد.

در بیماران مراجعه‌کننده، میزان فعالیت پروتئین‌های C، S و AT و هم‌چنین APC-R بر اساس درخواست پزشک معالج اندازه‌گیری شد. از میان جامعه اولیه، ۷۴۳ بیمار مبتلا

پس از این بررسی‌ها، برای مقایسه فراوانی کمبود پروتئین‌های C، S و AT و نیز APC-R در جمعیت ایرانی این پژوهش با دیگر جمعیت‌ها، از آزمون آماری مقایسه نسبت‌ها (Z-test) استفاده شد. با سطح اطمینان ۹۵ درصد، عدد Z در خارج از دامنه $-1/96$ تا $+1/96$ به عنوان تفاوت معنی‌دار دو نسبت در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

از میان ۲۲۰۰ بیمار مراجعه‌کننده به منظور بررسی و غربال آزمون‌های ترومبوفیلی، در مجموع ۴۰۴ بیمار مبتلا به ترومبوزهای سیاهرگی (DVT، PE و TUS) که واجد شرایط مناسب بودند، انتخاب و بررسی‌ها بر روی این بیماران ادامه داده شد. بیماران TUS شامل بیماران مبتلا به ترومبوز سیاهرگ پورتال (PVT)، ترومبوز سیاهرگ کلیه (RVT) و ترومبوز سینوس مغزی (BST) بودند. دامنه سنی بیماران مبتلا به VTE بسیار گسترده و از یک ماه تا ۹۰ سال و متوسط سن بیماران مونث 14 ± 37 سال (دامنه یک ماه تا ۷۴ سال) و بیماران مذکر 14 ± 39 سال (دامنه ۹۰-۱ سال) بود. در کل از ۴۰۴ بیمار مبتلا، تعداد ۲۰۸ بیمار (۵۱/۵٪) مذکر و ۱۹۶ بیمار (۴۸/۵٪) مونث بودند.

هم‌چنین در مجموع، ۳۶۹ بیمار (۹۱/۳٪) DVT، ۶۳ بیمار (۱۵/۶٪) PE و ۹ بیمار (۲/۲٪) مبتلا به TUS بودند که در بین این بیماران، ۳۹ بیمار (۹/۶٪) دارای دو نوع ترومبوز (DVT به همراه PE یا TUS و یا PE به همراه TUS) بودند (جدول ۱). لازم به ذکر است که در ۲ بیمار نوع ترومبوز مشخص نبود (در جدول با نام ناشناخته مشخص شده است) و در پرسش‌نامه‌های این بیماران صرفاً نام ترومبوز بدون ذکر مکان آن درج شده بود.

از ۴۰۴ بیمار مبتلا به ترومبوزهای سیاهرگی، کمبودهای PC، PS، AT و نقص APC-R در ۱۸۴ بیمار (۴۵/۵٪) به صورت نقص منفرد و یا ترکیبی یافت گردید. فراوانی کمبود پروتئین‌های ضد انعقادی طبیعی و APC-R در بیماران مبتلا به ترومبوزهای مختلف سیاهرگی و درصد آن‌ها در کل بیماران VTE در جدول ۲ خلاصه شده است. لازم به ذکر است که سطح پایه PS در آقایان بیش‌تر از خانم‌ها تعریف شده است.

به ترومبوزهای سیاهرگی (DVT، PE و TUS) انتخاب گردیدند. سپس بیمارانی که در زمان مراجعه باردار بودند و یا حداکثر ۶ هفته از زایمان و یا ابتلای آن‌ها به ترومبوز حاد گذشته بود و نیز بیماران مبتلا به بدخیمی و یا تحت درمان با داروهای ضد انعقادی از مطالعه حذف شدند تا احتمال وجود موارد اکتسابی و کاذب در کاهش پروتئین‌های ضد انعقاد طبیعی به حداقل برسد. پس از حذف این موارد، بررسی‌ها بر روی ۴۰۴ بیمار ادامه داده شد.

نمونه‌های بیماران در لوله‌های Vacutainer از شرکت BD انگلستان (BD Vacutainer System) که محتوی ضد انعقاد تری سترات سدیم ۰/۱۰۹ مولار (۳/۲٪) به صورت محلول بودند، به نسبت ۹ حجم خون به یک حجم ضد انعقاد جمع‌آوری و حداکثر تا ۳ ساعت به بخش انعقاد منتقل و پلاسمای بیماران با دور ۲۵۰۰g به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفوژ شد. نمونه‌های بیماران در سانتریفوژهای بدون یخچال ۲ بار سانتریفوژ شدند تا پلاسمای بدون پلاکت به دست آید. سپس نمونه‌های پلاسما در دمای -70°C درجه سانتی‌گراد ذخیره و بین ۳ روز و حداکثر یک هفته مورد آزمون‌های پانل ترومبوفیلی قرار گرفتند.

آزمون‌های اندازه‌گیری فعالیت پروتئین‌های C، S و AT و هم‌چنین فعالیت APC-R با استفاده از کیت‌های شرکت استاگو فرانسه انجام شد. سنجش فعالیت پروتئین‌های C و S و نیز APC-R بر پایه بررسی لختگی پلاسما (Clot based chromogenic) بود که در روش اخیر، شدت رنگ ایجاد شده با میزان فعالیت AT پلاسما نسبت عکس داشت.

میزان طبیعی فعالیت PC بر پایه کیت استاگو، بین ۱۳۰-۷۰٪، فعالیت PS برای خانم‌ها بین ۱۲۳-۵۵٪ و برای آقایان بین ۱۴۳-۷۷٪، فعالیت AT بین ۱۲۰-۸۰٪ و APC-R بیشتر یا مساوی ۱۲۰ ثانیه در نظر گرفته می‌شد. بنابراین مقادیر کمتر از این اعداد غیر طبیعی و یا کمبود به حساب می‌آمد، به جز در مورد AT که سطح فعالیت زیر ۷۵٪ غیر طبیعی در نظر گرفته می‌شد و علت آن اختلاف بین منابع مختلف در مورد cut off آنتی‌ترومبین بود.

جدول ۱: درصد فراوانی بیماران مبتلا به ترومبوزهای مختلف سیاهرگی بر حسب جنس


ناشناخته	BST	PE + RVT	DVT + PVT	PVT	DVT + PE	PE	DVT	محل ترومبوز ^(۱)	
								جنس	
۱	۱	۰	۱	۳	۱۹	۱۱	۱۷۲	مذکر	
(۰/۲)	(۰/۲)		(۰/۲)	(۰/۷)	(۴/۷)	(۲/۷)	(۴۲/۶)		
۱	۰	۱	۰	۳	۱۸	۱۴	۱۵۹	مؤنث	
(۰/۲)		(۰/۲)		(۰/۷)	(۴/۴)	(۳/۵)	(۳۹/۴)		
۲	۱	۱	۱	۶	۳۷	۲۵	۳۳۱	مجموع	
(۰/۵)	(۰/۲)	(۰/۲)	(۰/۲)	(۱/۵)	(۹/۲)	(۶/۲)	(۸۱/۹)		

(۱) DVT: ترومبوز سیاهرگ عمقی، PE: آمبولی ریوی، PVT: ترومبوز سیاهرگ پورتال، RVT: ترومبوز سیاهرگ کلیوی و BST: ترومبوز سینوس مغزی

جدول ۲: درصد فراوانی شیوع نقایص ضدانعقادی و APC-R در ۴۰۴ بیمار مبتلا به ترومبوز سیاهرگی

APC-R	کمبود AT	کمبود PS در خانم‌ها	کمبود PS در آقایان	کمبود PC	ترومبوز ^(۱)
۳۵ (۸/۷)	۱۲ (۳)	۱۸ (۴/۴)	۶۰ (۱۴/۸)	۱۸ (۴/۴)	DVT
۳ (۰/۷)	۴ (۱)	۱ (۰/۲)	۳ (۰/۷)	۳ (۰/۷)	PE
۵ (۱/۲)	۳ (۰/۷)	۱ (۰/۲)	۵ (۱/۲)	۳ (۰/۷)	DVT + PE
۱ (۰/۲)	۲ (۰/۵)	۱ (۰/۲)	۲ (۰/۵)	۲ (۰/۵)	PVT
۰	۰	۰	۰	۰	DVT + PVT
۰	۰	۰	۰	۰	PE + RVT
۰	۰	۰	۱ (۰/۲)	۰	BST
۰	۰	۰	۰	۱ (۰/۲)	ناشناخته
۴۴ (۱۰/۹)	۲۱ (۵/۲)	۲۱ (۵/۲)	۷۱ (۱۷/۶)	۲۷ (۶/۷)	مجموع

(۱) DVT: ترومبوز سیاهرگ عمقی، PE: آمبولی ریوی، PVT: ترومبوز سیاهرگ پورتال، RVT: ترومبوز سیاهرگ کلیوی و BST: ترومبوز سینوس مغزی



نمودار ۱: توزیع فراوانی نقایص ارثی پروتئین‌های ضد انعقادی طبیعی، APC-R و نقایص ترکیبی آن‌ها در بیماران VTE

مطالعه حاضر، بیشترین کمبود پروتئین ضد انعقادی مربوط به کمبود پروتئین S با شیوع ۲۲/۸٪ و سپس در جایگاه دوم APC-R با شیوع ۱۰/۹٪ بوده است. کمبود PC با شیوع ۶/۷٪ و AT با شیوع ۵/۲٪ کمترین فراوانی را در بیماران داشتند.

کمبود PS در هر سه گروه از بیماران ترومبوز سیاهرگی (DVT، PE و TUS) نیز بالاترین شیوع را دارا بود اما در این میان، بیماران TUS به طور تعجب برانگیزی دارای الگوی شیوع متفاوتی از کمبودهای ضد انعقادی در مقایسه با بیماران DVT و PE بودند، به طوری که کمبود PS با شیوع ۴۴/۴٪ بالاترین شیوع را داشت و کمبودهای PC و AT هرکدام با ۲۲/۲٪ و APC-R با ۱۱/۱٪ در جایگاه‌های بعدی قرار می‌گرفتند. گزارش‌های اندک ولی متفاوتی که در دنیا بر روی شیوع نقایص ارثی پروتئین‌های ضد انعقادی در بیماران مبتلا به TUS در دسترس می‌باشد، گویای این است که شیوع کمبود این ضد انعقادها در بیماران TUS بستگی به نوع، محل ترومبوز و نیز سن فرد مبتلا دارد (۱۵، ۱۳). با این حال در یک مطالعه در سال ۲۰۰۰ توسط آگسل و همکاران او در ترکیه بر روی ۲۳ بیمار مبتلا به ترومبوز سیاهرگ پورتال (PVT)، یافته‌هایی مشابه یافته‌های این پژوهش گزارش شده است، به طوری که کمبود PS در ۴۳/۵٪، APC-R در ۳۰/۵٪، PC در ۲۶٪، و AT در ۲۲٪ بیماران دیده شده است (۱۶). با این حال به نظر می‌رسد که به دلیل تعداد بسیار کم بیماران TUS در پژوهش حاضر (۹ بیمار) این الگو چندان قابل اعتماد نمی‌باشد و احتمال افزایش کاذب در فراوانی کمبودهای ضد انعقادی و ترومبوفیلی ارثی در این بیماران وجود دارد. بنابراین برای تایید یا رد این الگو در بیماران دارای ترومبوزهای غیر معمول (TUS)، لازم است که مطالعات گسترده‌تری با حجم بیشتر نمونه‌ها به همراه شرح حال دقیق‌تر بیماران انجام شود.

در مطالعه‌های مختلف درباره شیوع کمبودهای ضد انعقادهای طبیعی در بیماران VTE در کشورهای آسیایی، در بیشتر موارد کمبود PS شایع‌ترین نقص ارثی بوده است: چین ۱۱/۵٪، تایوان ۳۲/۹٪، ژاپن ۲۸/۳٪، کویت ۱۶/۸٪، سعودی ۱۴/۵٪ و ترکیه ۱۳/۵٪ (۲۲-۱۷). این موضوع با

هم‌چنین از مجموع بیماران VTE، ۳۶ بیمار (۸/۹٪) دارای کمبودهای هم‌زمان دو عامل بودند: ۱۱ بیمار (۲/۷٪) کمبود هم‌زمان PS+APC-R، ۱۰ بیمار (۲/۵٪) کمبود PC+PS، ۶ بیمار (۱/۵٪) کمبود PS+AT، ۴ بیمار (۱٪) کمبود PC+AT، ۳ بیمار (۰/۷٪) کمبود PC+APC-R و ۲ بیمار (۰/۵٪) کمبود AT+APC-R داشتند (نمودار ۱).

بحث

تاکنون مطالعه جامعی در مورد شیوع نقایص پروتئین‌های ضد انعقادی ارثی در بیماران مبتلا به ترومبوز سیاهرگی در ایران انجام نشده است. هدف از این پژوهش بررسی میزان شیوع کمبود یا نقص پروتئین‌های ضد انعقادی طبیعی (PC، PS، AT) و مقاومت به PC فعال (APC-R) در بیماران VTE بود.

VTE به طور معمول با نشانه‌های بالینی DVT در اندام تحتانی و یا آمبولی ریوی تظاهر می‌کند. ترومبوز سیاهرگی در نواحی غیر معمول مانند سیاهرگ‌های مغزی، احشایی، شبکیه، پورتال و کبدی، مزاتر و کلیه بسیار کمیاب است (۱۳، ۱۲). یافته‌های این پژوهش نیز با مطالعه‌های پیشین هم‌خوانی دارد. در این تحقیق، بیماران مبتلا به DVT به تنهایی، ۳۳۱ مورد (۸۱/۹٪)، بیماران PE به تنهایی ۲۵ مورد (۶/۲٪)، بیماران مبتلا به DVT و PE با یکدیگر ۳۷ مورد (۹/۲٪) و بیماران مبتلا به TUS ۹ مورد (۲/۲٪) بودند که در این میان ترومبوز سیاهرگ پورتال با ۷ مورد (۱/۷٪) بیشترین فراوانی را در این گروه دارا بود و ترومبوز سیاهرگ کلیه و سینوس مغزی هر کدام یک مورد (۰/۲٪) را شامل می‌شدند.

آمبولی ریوی خطرناک‌ترین شکل VTE است که گستره آن از نوع بدون علامت تا نوع حاد و کشنده متفاوت می‌باشد (۱۴). این یافته با گزارش‌های پیشین دیگر که بیانگر موارد زیاد آمبولی ریوی در پی DVT اندام تحتانی می‌باشد، هم‌خوانی دارد. با این حال، در این مطالعه‌ها شواهد وجود DVT در پیشینه بیماران PE، به طور متوسط حدود ۷۹٪ ذکر شده بود (۵).

در این پژوهش، چهار عامل مهم دخیل در ترومبوز ارثی مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی در بیماران VTE در

۱۸٪ گزارش کرده‌اند: آمریکا ۱۸/۸٪، هلند ۱۸٪ و ایتالیا ۴۸/۹٪، که شیوع بسیار بالای APC-R در بیماران ایتالیایی یافته‌ای جالب توجه است (۲۶-۲۴).

در مطالعه حاضر، شیوع APC-R در بیماران VTE به طور متوسط ۱۰/۹٪ به دست آمد که در مقایسه با مطالعه‌های اروپایی - آمریکایی، اختلاف معناداری را نشان می‌دهد (۵/۳-۹/۲) Z. هم چنین مطالعه‌های اروپایی - آمریکایی، شیوع کمبود هر سه پروتئین ضد انعقادی طبیعی (PS، PC و AT) را در بیماران VTE بسیار پایین (۱-۰/۵٪) گزارش کرده‌اند.

مطالعه‌های یاد شده نشان می‌دهند که الگوی شیوع ترومبوفیلی‌های ارثی در بیماران ترومبوز سیاهرگی آسیایی تبار با بیماران نژاد اروپایی یا آمریکایی متفاوت است، به طوری که در بیماران آسیایی از جمله ایران، چین، ژاپن، عربستان و کویت، به استثنای یک مطالعه ایرانی (کاظمی و همکاران)، کمبود PS شایع‌ترین کمبود ضد انعقادی محسوب می‌شود ولی در جمعیت اروپایی - آمریکایی، APC-R شایع‌تر است و کمبود پروتئین‌های ضد انعقادی طبیعی C، S و AT شیوع ناچیزی دارند.

با توجه به مطالعه‌های گوناگون انجام شده در جمعیت‌های مختلف بر روی فراوانی پروتئین‌های ضد انعقادی طبیعی و APC-R و نتایج بسیار مختلف به دست آمده، احتمال دارد که افزون بر دلایل جغرافیایی و نژادی، معیارهای متفاوت در انتخاب بیماران، محدودیت‌های مطالعه‌ها، سن، جنس و نیز تعداد متفاوت بیماران، و هم چنین تفاوت‌های ژنتیکی علت ایجاد این اختلاف بسیار زیاد باشند.

در این پژوهش، تشخیص بیماران VTE بر پایه پرسش‌نامه‌هایی بوده که هم‌زمان با نمونه‌گیری از بیماران اخذ می‌شد. بنابراین احتمال این که این پرسش‌نامه‌ها به طور دقیق تکمیل نشده و یا به دلیل عدم اطلاع کافی بیمار، مواردی مانند نوع ترومبوز و بیماری همراه و یا داروهای مصرفی وی و به طور کلی وضعیت بالینی بیمار در پرسش‌نامه‌ها به درستی ذکر نشده باشد، وجود دارد. هم چنین با توجه به گذشته‌نگر بودن مطالعه، نتایج جمع‌آوری شده بر اساس اطلاعات موجود در بخش انعقاد بوده است و لذا سایر

پژوهش حاضر هم‌خوانی دارد اما با وجودی که در همه این جوامع کمبود PS شایع‌ترین کمبود ارثی ضد انعقادی گزارش شده است، بررسی نسبت فراوانی در این جوامع با پژوهش حاضر نشان می‌دهد که تفاوت کمبود PS در این مطالعه با مطالعه‌های چین (Z=۲/۳۵)، تایوان (Z=۱/۹۶۵) و عربستان سعودی (Z=۲/۳) اختلاف معنی‌داری دارد. با این حال اختلاف میان این پژوهش با پژوهش‌های انجام شده در ژاپن (Z=۱/۱۶)، کویت (Z=۱/۶۸) و ترکیه (Z=۱/۳) در مورد شیوع کمبود PS معنی‌دار نمی‌باشد (۲۲-۱۷).

در مطالعه کاظمی و همکاران در سال ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) بر روی ۳۰۰ بیمار تهرانی مبتلا به ترومبوزهای رگی گوناگون، کمبود PC در ۲۵/۷٪ بیماران گزارش گردید که شایع‌ترین کمبود ضد انعقادی بود. این گزارش با پژوهش حاضر که شیوع کلی PC را ۶/۷٪ به دست آورده است، اختلاف بسیار زیادی دارد (Z=۷). با این که میزان شیوع ۲۲/۲ درصدی کمبود PC در بیماران TUS در مطالعه حاضر، با گزارش کاظمی و همکاران هم‌خوانی زیادی دارد (Z=۰/۲)، اما به دلیل تعداد بسیار کم بیماران TUS در مطالعه حاضر و نیز مشخص نبودن مکان و نوع ترومبوز (سیاهرگی یا سرخ‌رگی) در مطالعه کاظمی و همکاران، این مقایسه قابل اعتماد نمی‌باشد. هم چنین در مطالعه یاد شده، کمبود PS در ۱۳٪ موارد گزارش شده بود که با نتایج پژوهش حاضر (۲۲/۸٪) اختلاف قابل توجهی دارد (Z=۳/۳). کمبود AT نیز در ۲/۳٪ موارد دیده شد که با شیوع ۵/۲ درصدی در پژوهش حاضر اختلاف معنی‌داری ندارد (Z=۱/۹) (۲۳).

به نظر می‌رسد که الگوی شایع‌ترین نقص ضد انعقادی طبیعی (PS) در بیماران آسیایی مبتلا به ترومبوز سیاهرگی تا حدودی مشابه باشد. با این حال گزارش کاظمی و همکاران بر روی بیماران تهرانی این الگو را نشان نمی‌دهد. هم چنین به نظر می‌رسد که APC-R (دومین نقص ارثی شایع در این پژوهش) در بیماران VTE ایرانی شایع‌تر از دیگر جمعیت‌های آسیایی باشد (۱۰/۹٪ در برابر ۵/۴-۲/۲) (۲۳).

پژوهش‌های اروپایی و آمریکایی، APC-R و یا عامل ۵ لیدن را شایع‌ترین ترومبوفیلی ارثی با شیوع حدود ۲۱٪-

مورد - شاهدی (case - control) و اخذ شرح حال دقیق‌تر بیماران مبتلا به ترومبوزهای گوناگون همراه گردد تا واقعی بودن الگوی به دست آمده در این پژوهش تایید و یا رد شود و همچنین ارزیابی دقیق‌تر این ناهنجاری‌ها در جهت کنترل و بهبود روند تشخیص و درمان این بیماران فراهم گردد.

تشکر و قدردانی

نویسندگان مقاله بدین وسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را از دکتر مهتاب مقصدولو به خاطر مشاوره آماری این نوشتار اعلام می‌دارند.

علل ارثی ترومبوفیلی چون سطح فاکتور هشت انعقادی و یا پروترومبین G20210A به دلیل این که در درخواست پزشک نبوده و یا در این مرکز انجام نمی‌شده لحاظ نگردیده است.

نتیجه‌گیری

کمبود PS و سپس APC-R، شایع‌ترین نقایص ضد انعقادی در بیماران مبتلا به VTE در پژوهش حاضر بودند. یافته‌های این پژوهش اهمیت ارزیابی آزمون‌های ترمبوفیلی ارثی را به منظور غربال بیماران مشکوک و یا مبتلا به ترومبوزهای سیاهرگی نشان می‌دهند. توصیه می‌شود که مطالعه‌های آتی، با حجم نمونه بیشتر و از نوع آینده‌نگر و

References :

- Anderson FA Jr, Wheeler HB, Goldberg RJ, Hosmer DW, Patwardhan NA, Jovanovic B, *et al.* A population-based perspective of the hospital incidence and case-fatality rates of deep vein thrombosis and pulmonary embolism. Arch Intern Med 1991; 151(5): 933-8.
- Kniffin WD Jr, Baron JA, Barrett J, Birkmeyer JD, Anderson FA Jr. The epidemiology of diagnosed pulmonary embolism and deep venous thrombosis in the elderly. Arch Intern Med 1994; 154(8): 861-6.
- Storti S, Crucitti P, Cina G. Risk factors and prevention of venous thromboembolism. Rays 1996; 21(3): 439-60.
- Rosendaal FR. Venous thrombosis: a multicausal disease. Lancet 1999; 353(9159): 1167-73.
- Tapson VF. Acute pulmonary embolism. N Engl J Med 2008; 358(10): 1037-52.
- Patniak MM, Moll S. Inherited antithrombin deficiency: a review. Haemophilia 2008; 14(6): 1229-39.
- Goldenberg NA, Manco-Johnson MJ. Protein C deficiency. Haemophilia 2008; 14(6): 1214-21.
- Ten Kate MK, van der Meer J. Protein S deficiency: a clinical perspective. Haemophilia 2008; 14(6): 1222-8.
- Bertina RM, Koeleman BP, Koster T, Rosendaal FR, Dirven RJ, de Ronde H, *et al.* Mutation in blood coagulation factor V associated with resistance to activated protein C. Nature 1994; 369(6475): 64-7.
- Martinelli I, Mannucci PM, De Stefano V, Taioli E, Rossi V, Crosti F, *et al.* Different risks of thrombosis in four coagulation defects associated with inherited thrombophilia: a study of 150 families. Blood 1998; 92 (7): 2353-8.
- Branson HE, Katz J, Marble R, Griffin JH. Inherited protein C deficiency and coumarin-responsive chronic relapsing purpura fulminans in a newborn infant. Lancet 1983; 2(8360): 1165-8.
- Lussana F, Dentali F, Ageno W, Kamphuisen PW. Venous thrombosis at unusual sites and the role of thrombophilia. Semin Thromb Hemost 2007; 33(6): 582-7.
- Martinelli I. Unusual forms of venous thrombosis and Thrombophilia. Pathophysiol Haemost Thromb 2002; 32(5-6): 343-5
- Rubinstein I, Murray D, Hoffsein V. Fatal pulmonary emboli in hospitalized patients. An autopsy study. Arch Intern Med 1998; 148(6): 1425-6.
- Pinto RB, Silveira TR, Bandinelli E, Rohsig L. Portal vein thrombosis in children and adolescents: the low prevalence of hereditary thrombophilic disorders. J Pediatr Surg 2004; 39(9): 1356-61.
- Egesel T, Büyüksak Y, DüNDAR SV, Gürgey A, Kirazli S, Bayraktar Y. The role of natural anticoagulant deficiencies and factor V Leiden in the development of idiopathic portal vein thrombosis. J Clin Gastroenterol 2000; 30 (1): 66-71.
- Bai C, Pan J, Fan L. A study on the deficiency of anticoagulant proteins in Chinese patients with deep venous thrombosis. Zhonghua Nei Ke Za Zhi 2000; 39(11): 746-8. [Article in Chinese]
- Shen MC, Lin JS, Tsay W. High prevalence of antithrombin III, protein C and protein S deficiency, but no factor V Leiden mutation in venous thrombophilic Chinese patients in Taiwan. Thromb Res

- 1997; 15; 87(4): 377-85.
- 19- Suehisa E, Nomura T, Kawasaki T, Kanakura Y. Frequency of natural coagulation inhibitor (antithrombin III, protein C and protein S) deficiencies in Japanese patients with spontaneous deep vein thrombosis. *Blood Coagul Fibrinolysis* 2001; 12 (2): 95-9.
- 20- Marouf R, Mojiminiyi O, Qurtom M, Abdella N, Al Wazzan H, Al Humood S, Al Mazeedy M. Plasma homocysteine and hematological factors in patients with venous thromboembolic diseases in Kuwait. *Acta Haematol* 2007; 117(2): 98-105.
- 21- Al-Jaouni SK. Primary thrombophilia in Saudi Arabia. *Saudi Med J* 2003; 24(6): 614-6.
- 22- Demir M, Vural Ö, Sunar H, Altun A, Yorulmaz F, Özbay G. The prevalence of hereditary thrombophilia in the Trakya region of Turkey. *Yonsei Med J* 2000; 41(4): 436-40.
- 23- Kazemi A, Hajmoosa H, Razavi SM, Shashaani T, Jazebi SM. A study of naturally occurring anticoagulant and antiphospholipid antibodies in patients with history of thrombosis in Tehran. *IUMS Journal* 2002; 9(29):266-74. [Article in Farsi]
- 24- Perry SL, Ortel TL. Clinical and laboratory evaluation of thrombophilia. *Clin Chest Med* 2003; 24(1): 153-70.
- 25- Rosendaal FR, Koster T, Vandenbroucke JP, Reitsma PH. High risk of thrombosis in patients homozygous for factor V Leiden (activated protein C resistance). *Blood* 1995; 85(6): 1504-8.
- 26- Gessoni G, Valverde S, Canistro R, Trabuio E, Antico F, Manoni F. Laboratory assessment of hypercoagulable state. A study in a group of patients with venous thromboembolism born in Chioggia. *Minerva Med* 2007; 98(2): 89-93.

Original Article

Analysis of levels of natural anticoagulant proteins and activated protein C resistance in venous thromboembolism patients referred to Iranian Blood Transfusion Organization, Tehran

Ahmadinejad M.¹, Rajabi A.², Bashash D.³, Zolfaghari Anaraki S.¹, Atarodi K.^{1,2}, Tabatabaee MR.¹, Seyed Mortaz SL.¹, Ran Balouch S.¹, Amini Kafi-abad S.¹, Abolghasemi H.^{1,4}

¹ Research Center of Iranian Blood Transfusion Organization, Tehran, Iran

² Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

³ Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

⁴ Baghiatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Abstract

Background and Objectives

Antithrombin (AT), protein C (PC) and protein S (PS) deficiencies plus activated protein C-resistance (APC-R) are among the most common hereditary causes of VTE. No comprehensive study on the prevalence of natural anticoagulant protein deficiencies in thrombophilic patients had been done before in Iran so we aimed to analyze these deficiencies in Iranian VTE patients.

Materials and Methods

This descriptive-retrospective analysis was done on 734 patients presented with the symptoms of VTE who were referred to Iranian Blood Transfusion Organization for thrombophilia screening tests in 2004-2005. After exclusion of patients with a history of an acquired thrombophilic condition, sampling of AT, PC, PS and APC-R activities were performed consecutively on 404 patients. Z-test was used to compare the present results with those of other population studies.

Results

Out of the total number of 404 patients, 369 (91.3%) were presented with DVT, 63 (15.6%) with PE, and 9 (2.2%) with TUS; there were also 39 patients (9.6%) with coexistence of two kinds of thrombosis. The deficiency of PS in 92 patients (22.8%), APC-R in 44 (10.9%), PC deficiency in 27 (6.7%), AT deficiency in 21 (5.2%) and compound deficiencies in 36 (8.9%) were observed.

Conclusions

PS deficiency and APC-R were the most and the next most prevalent hereditary defects in our patients, respectively. The findings of this report are more compatible with the results of Asian countries than those of European-American.

Key words: Venous thromboembolism, Deep venous Thrombosis, Pulmonary embolism, Antithrombin, Protein C, Protein S, Activated Protein C Resistance

Sci J Iran Blood Transfus Org 2011; 8(1): 1-9

Received: 22 Sep 2010

Accepted: 22 Dec 2010

Correspondence: Ahmadinejad M., MD. Pathologist, Research Center of Iranian Blood Transfusion Organization
P.O.Box: 1449613111, Tehran, Iran. Tel: (+9821) 88601501-30 ; Fax : (+9821)88601555
E-mail: minooam26@yahoo.com