

القای مرگ سلولی و کاهش تکثیر در سلول لوسمی پرومیلوسیتیک حاد NB4 توسط کافئین

مجید صفا^۱، داود بشاش^۲، محسن حمیدپور^۳

چکیده

سابقه و هدف

پیشگیری، درمان و کنترل سرطان با استفاده از مواد طبیعی در حال حاضر به عنوان یک استراتژی امیدوارکننده در نظر گرفته شده است. در این خصوص، کافئین که یک آلکالوئید پورینی موجود در گیاهان مختلف از جمله قهوه، کاکائو، کولا و چای می باشد، به دلیل مهار چند منظوره سرطان از جمله لوسمی ها به تازگی توجه زیادی به خود جلب کرده است.

مواد و روش ها

در یک مطالعه تجربی به منظور بررسی اثر کافئین در لوسمی پرومیلوسیتیک حاد، سلول های NB4 در غلظت های ۱، ۲ و ۴ میلی مولار کافئین کشت داده شد و متعاقباً از آزمون های MTT، Caspase 3، BrdU cell proliferation assay و Quantitative Real-Time PCR جهت بررسی اثر کافئین در القای مرگ سلولی و مطالعه مکانیسم احتمالی آن استفاده شد. آزمون paired student t test و نرم افزار SPSS ۱۶ جهت تحلیل داده ها به کار رفت.

یافته ها

بررسی میزان ساخت DNA و بقای سلولی با استفاده از روش های BrdU و MTT، نشان داد که کافئین میزان تکثیر و بقای سلول های NB4 را به صورت وابسته به دوز و زمان کاهش می دهد. هم چنین نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که افزایش دوز کافئین موجب القای فعال شدن آنزیم کاسپاز ۳ و افزایش بیان mRNA ژن Bax و p21 می گردد.

نتیجه گیری

در مجموع، با توجه به این که مشخص شد کافئین می تواند موجب مهار تکثیر و القای آپوپتوز در سلول های لوسمی پرومیلوسیتیک حاد NB4 شود، لذا می توان چنین نتیجه گیری کرد که مصرف کافئین به عنوان ماده ای در جای ممکن است یک عامل مفید جهت القای مرگ سلولی این سلول های بدخیم در مبتلایان به لوسمی پرومیلوسیتیک حاد عمل کند.

کلمات کلیدی: لوسمی پرومیلوسیتیک حاد، آپوپتوز، کافئین، کاسپاز

تاریخ دریافت: ۹۳/۵/۵

تاریخ پذیرش: ۹۴/۳/۱۹

- ۱- مؤلف مسئول: PhD خون شناسی و بانک خون - استادیار مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی - دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران - گروه هماتولوژی - تهران - ایران - کد پستی: ۱۴۴۹۶۱۴۵۳۵
- ۲- مؤلف مسئول: PhD خون شناسی و بانک خون - استادیار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - گروه هماتولوژی - میدان قدس - خیابان دربند - تهران - ایران - کد پستی: ۱۹۷۱۶۵۳۳۱۲
- ۳- PhD هماتولوژی - استادیار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران - ایران

مقدمه

پیشگیری، درمان و کنترل سرطان با استفاده از مواد طبیعی در حال حاضر به عنوان یک استراتژی امیدوارکننده در نظر گرفته شده و در مدل‌های تجربی مشخص شده است که بسیاری از مواد طبیعی و یا رژیم غذایی موجب مهار سرطان می‌شوند (۱، ۲). در این خصوص، کافئین به دلیل مهار چند منظوره سرطان در سلول‌های کشت داده شده و یا مدل‌های حیوانی به تازگی توجه زیادی به خود جلب کرده است (۳). کافئین یک ماده شیمیایی و خوردنی است که در گیاهان مختلفی از جمله قهوه، کاکائو، کولا و جای یافت می‌شود. این ماده، یک آلکالوئید از خانواده متیل گزانتین‌ها است و در فرم خالص، به صورت پودر سفید رنگ با مزه تلخ می‌باشد. کافئین که از ترکیب کربن، هیدروژن، نیتروژن و اکسیژن تشکیل شده است، نوعی محرک بوده و می‌تواند از خوابیدن جلوگیری کند. مطالعه‌های انجام شده طی دهه گذشته نشان داده است که کافئین دارای اثرات ضد سرطان بوده و احتمالاً این اثر را از طریق کاهش تکثیر سلولی و یا القای آپوپتوز در سرطان‌ها از جمله لوسمی‌ها اعمال می‌کند (۴).

لوسمی‌ها، گروه ناهمگونی از بدخیمی‌ها هستند که از بدخیم شدن سلول‌های خونساز اولیه در مغز استخوان به وجود می‌آیند. لوسمی، در سال ۱۸۷۰ به عنوان یک بیماری درگیرکننده مغز استخوان عنوان شد و در سال ۱۹۳۰، انواع مورفولوژیک لوسمی‌های حاد و مزمن به خوبی مشخص شدند (۵). لوسمی‌های حاد بر اساس رده سلولی به دو گروه بزرگ لوسمی حاد میلو بلاستیک (AML) و لوسمی حاد لنفوبلاستیک (ALL) تقسیم می‌شوند. لوسمی پرومیلوسیتیک حاد (APL) یکی از زیر گروه‌های AML (AML-M3) می‌باشد. APL حدود ۱۵٪-۱۰٪ انواع AML را به خود اختصاص داده و معمولاً در سنین ۵۰-۴۰ سالگی رخ می‌دهد (۶). این بیماری در اثر نقص در بلوغ گلبول‌های سفید در رده میلوئیدی به وجود می‌آید که طی آن، روند بلوغ در سلول‌های رده گرانولوسیتی در مرحله پرومیلوسیت متوقف می‌شود. به دلیل انعقاد داخل عروقی منتشر (DIC) که ظاهراً ناشی از آزاد شدن مواد پیش انعقادی از گرانول‌های سلول‌های لوسمیک است، مشکلات

خونریزی در این بیماری شایع بوده و از جمله علل اصلی مرگ و میر این بیماران محسوب می‌شود (۷). در سال ۱۹۸۵ معرفی ATRA که مشتقی از ویتامین A است، افقی جدیدی در تاریخچه درمان APL گشود و از میزان مرگ و میر بیماری به طور قابل توجهی کاست. با این حال و علی‌رغم اثر بخشی این کافئین در درمان APL، درصدی از بیماران دچار عود شده و در نهایت به مرگ بیمار منجر می‌شود (۸).

با توجه به اثرات ضد سرطانی کافئین و از طرفی با در نظر گرفتن عدم موفقیت کامل راه کارهای درمانی معمول در APL، بر آن شدیم تا در این تحقیق اثربخشی این آلکالوئید متیل گزانتینی را علیه سلول‌های NB4 (رده سلولی لوسمی پرومیلوسیتیک حاد) بررسی کنیم. با انجام این تحقیق مشخص شد که کافئین از طریق افزایش بیان ژن‌های Bax و p21 و هم چنین فعال کردن آنزیم کاسپاز ۳ موجب القای آپوپتوز در سلول‌های لوسمی پرومیلوسیتیک حاد NB4 می‌شود.

مواد و روش‌ها

کشت سلولی:

در یک مطالعه تجربی، سلول‌های NB4 (رده سلولی انسانی لوسمی پرومیلوسیتیک حاد) اولین بار در سال ۱۹۸۹ از مغز استخوان یک خانم جوان ۲۳ ساله مبتلا به لوسمی پرومیلوسیتیک حاد جداسازی شد. سلول‌های NB4، رده سلولی بسیار مناسبی برای مطالعه‌های *in vitro* در مورد لوسمی پرومیلوسیتیک حاد محسوب می‌شود. در این مطالعه، سلول‌های این رده سلولی که از انستیتو پاستور تهیه شده بود، در محیط کشت ۱۶۴۰ RPMI حاوی ۲ mM از L-گلوتامین، ۱۰٪ FBS، پنی سیلین به میزان ۱۰۰ U/mL و استرپتومایسین به میزان ۱۰۰ µg/mL در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد و فشار ۵٪ از CO₂ کشت داده شدند.

تیمار با کافئین:

برای تیمار سلول‌ها، از کافئین (آمریکا، سیگما) استفاده شد. محلول ذخیره کافئین به واسطه حل کردن این ماده در آب مقطر استریل تهیه شد. محلول ذخیره را در

آزمون BrdU:

اثر مهارى كافئين بر تكثير سلول‌هاى NB4 از طريق تعيين ميزان مشاركت برمواكسى يوريدين در DNA سلول‌هاى NB4 با استفاده از BrdU-based cell proliferation ELISA kit طبق دستورالعمل كيت اندازه‌گيرى شد. به طور خلاصه، سلول‌ها به تعداد ۵۰۰۰ در هر چاهك درون پليت ۹۶ تايى در حضور يا عدم حضور كافئين كشت داده شدند. ۱۲ ساعت مانده به انتهاي زمان انكوباسيون، ۱۰ ميكروليتر محلول BrdU كه در كيت موجود مى‌باشد، به سلول‌ها افزوده شد. در ادامه و با استفاده از محلول FixDenat، سلول‌ها فيكس شده و DNA آن‌ها دناتوره گرديد. سلول‌ها با آنتى‌بادى عليه BrdU كه با آنزيم پراكسيداز كنژوگه مى‌باشد، به مدت ۱ ساعت در دماى اتاق انكوبه شده و در انتهاي اين زمان، ۱۰۰ ميكروليتر سويستراى TMB افزوده شد. پس از گذشت ۳۰ دقيقه در دماى اتاق و آن هم به منظور پايان دادن به عملكرد آنزيم پراكسيداز، از محلول اسيد سولفوريك ۱ مولار استفاده شد. در انتها، ميزان رنگ ايجاد شده در هر چاهك با استفاده از دستگاه اليزا ريدير در طول موج ۴۵۰ nm خوانده شد. براى محاسبه اثر مهارى كافئين بر تكثير سلول‌هاى NB4 و بررسى ميزان كاهش ساخت DNA سلول‌هاى تيمار شده، از فرمول زير استفاده شد:

$$(\%) = 1 - \frac{OD_{exp}}{OD_{cont}} \times 100$$

میزان مهار تکثیر

در اين فرمول، OD exp و OD cont به ترتيب بيانگر جذب نوري سلول‌هاى تيمار شده و سلول‌هاى تيمار نشده (كنترل) مى‌باشد.

اندازه‌گيرى فعاليت آنزيم كاسپاز ۳:

براى ارزيابى اثر كافئين در القاي آپوپتوز در سلول‌هاى NB4، روش رنگ‌سنجى فعاليت آنزيم كاسپاز ۳ بر اساس دستورالعمل كارخانه سازنده (سيگما) انجام گرفت. اساس آزمايش، اندازه‌گيرى اسپكتروفوتومتريك رنگى بود كه در اثر آزاد شدن مولكول pNA (متصل به سوبسترا) تحت تاثير فعاليت آنزيم كاسپاز ۳ ايجاد مى‌شود. پس از تيمار ۴۸

ميكروتيوب‌ها تقسيم كرده و آن‌ها را در دماى اتاق تا زمان مصرف نگهدارى كرديم. به منظور تعيين اثرات بهينه كافئين، ۲ متغير دوز و زمان در اين تحقيق در نظر گرفته شد. سلول‌هاى سرطانى با غلظت‌هاى ۱، ۲ و ۴ ميلي‌مولار از كافئين تيمار شدند و به ترتيب پس از زمان‌هاى ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت مورد مطالعه قرار گرفتند. در ضمن به منظور افزايش بهره‌ورى كار و بررسى مقايسه‌اى، آزمايش‌ها به صورت دوبار تكرار انجام شد.

Microculture Tetrazolium Test:

ميزان حيات سلولى توسط آزمايش MTT بررسى شد. جهت انجام آزمايش بعد از دو بار پاساژ دادن، سلول‌ها به پليت ۹۶ خانه (۵۰۰۰ سلول در هر خانه) منتقل شدند. هنگامى كه MTT زرد رنگ وارد سلول‌هاى زنده مى‌شود، به وسيله آنزيم دهيدروژناز اين سلول‌ها احيا مى‌شود و رسوب بنفش رنگ ايجاد مى‌كند. به طور خلاصه، بعد از اتمام زمان تيمار سلول‌ها با گلوکز، محلول MTT (mg/mL) ۵ در PBS) به چاهك‌هاى پليت ۹۶ اضافه شده و به مدت ۳ ساعت در انكوباتور ۳۷ درجه سانتى‌گراد قرار گرفتند.

پس از طى زمان انكوباسيون، پليت حاوى سلول‌ها با دور ۱۰۰۰ g به مدت ۱۰ دقيقه سانترفوژ شد. سپس محلول رويى در چاهك‌ها خالى گرديد و ۱۰۰ ميكروليتر محلول DMSO (Dimethyl sulfoxide) به هر كدام اضافه شد و به مدت ۱۰ دقيقه جهت حل كردن رسوب‌هاى بنفش MTT، تكان داده شد. سپس توسط اليزا ريدير جذب نوري نمونه‌ها در طول موج ۵۷۰ نانومتر اندازه‌گيرى شد. براى محاسبه اثر توكسيسيتى كافئين بر روى بقاى سلول‌هاى NB4 و بررسى ميزان مرگ سلول‌هاى تيمار شده، از فرمول زير استفاده شد:

$$(\%) = 1 - \frac{OD_{exp}}{OD_{cont}} \times 100$$

میزان مرگ سلول‌ها

در اين فرمول، OD exp و OD cont به ترتيب بيانگر جذب نوري سلول‌هاى تيمار شده و سلول‌هاى تيمار نشده (كنترل) مى‌باشد.

جدول ۱: توالی آغازگرها

ژن	آغازگر جلوبرنده (5'→3')	آغازگر معکوس (5'→3')	اندازه (bp)
HPRT	TGGACAGGACTGAACGTCTTG	CCAGCAGGTCAGCAAAGAATTTA	۱۱۱
p21	CCTGTCACTGTCTTGTACCCT	GCGTTTGGAGTGGTAGAAATCT	۱۳۰
Bax	CGAGAGGTCTTTTCCGAGTG	GTGGGCGTCCCAAAGTAGG	۲۴۲

سانتی گراد پایان پذیرفت. cDNA ساخته شده در دمای ۲۰- درجه سانتی گراد نگهداری شد.

اندازه‌گیری کمی بیان ژن‌های Bax و p21 با RQ-PCR:

آزمون Real-time PCR در دستگاه Roter Gene 6000 Real Time PCR System (کیاژن) و در حجم ۲۰ میکرو لیتر انجام شد. به ازای هر واکنش، ۱۰ μL از Maxima SYBR green master mix (فرمتاز)، ۲ μL از محصول cDNA، ۰/۵ μL از هر یک از آغازگرها (۲۰ nmol) و ۷ μL آب عاری از نوکلئاز استفاده شد. شرایط دمایی مورد استفاده شامل یک مرحله فعال‌سازی اولیه در دمای ۹۵ درجه سانتی گراد به مدت ۳۰ ثانیه و در ادامه، ۴۵ سیکل برای دناتوراسیون (۵ ثانیه در ۹۵ درجه سانتی گراد) و مرحله آنیلینگ/اکستنشن توام (۲۰ ثانیه در ۶۰ درجه سانتی گراد) بود. برای بررسی اختصاصیت محصول تکثیر شده، منحنی ذوب مورد بررسی قرار گرفت. در انتها برای محاسبه نسبی تعداد نسخه mRNA تکثیر شده از فرمول $2^{-\Delta\Delta Ct}$ استفاده شد (جدول ۱).

آنالیز آماری:

برای انجام مطالعه‌های آماری از SPSS ۱۶ استفاده شد. اختلاف آماری بین گروه‌های کنترل و تیمار شده با استفاده از Paired Student's t-test بررسی شد. مقادیر به دست آمده با $p < ۰/۰۵$ از نظر آماری معنادار در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

بررسی میزان سیتوتوکسیسیته کافئین بر سلول‌های رده NB4:

پس از کشت رده سلولی NB4 در حضور غلظت‌های


ساعته، سلول‌های NB4 را با دور ۶۰۰ g به مدت ۵ دقیقه در دمای ۴ درجه سانتی گراد سانتریفوژ کرده، رسوب سلولی را لیز نموده و لیزات سلولی را با دور ۲۰۰۰۰ g به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفوژ کردیم. در حجم نهایی ۱۰۰ μL، مقدار ۵ میکروگرم از مایع رویی را با ۸۵ μL بافر آزمایش و ۱۰ μL از سوبسترای کاسپاز ۳ (Ac-DEVD-pNA) به مدت ۲ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد انکوبه نمودیم. پس از طی زمان مورد نظر، جذب نوری نمونه‌ها را در طول موج ۴۰۵ نانومتر با دستگاه الیزا ریدر قرائت نمودیم.

استخراج RNA و ساخت cDNA:


برای استخراج RNA از سلول‌های مورد مطالعه، از محلول TriPure Isolation Reagent (رُوش) طبق دستورالعمل استفاده شد. پس از تیمار سلول‌های NB4 با کافئین و متعاقب گذشت زمان ۴۸ ساعت، RNA سلول‌ها استخراج شده و کمیت آن‌ها با روش اسپکتروفتومتری با استفاده از دستگاه نانودراپ ND-1000 اندازه‌گیری شد. برای انجام واکنش رونویسی معکوس از (فرمتاز) RevertAid™ First Strand cDNA Synthesis Kit استفاده شد. حجم مورد نظر برای انجام این واکنش ۲۰ میکرولیتر و محتویات آن شامل ۴ μL بافر ۵ X PCR، ۲ μL از dNTP، ۱ μL راندم هگزامر، ۱ μL آب تیمار شده با DEPC، ۱ μL مهار کننده RNase (۲۰ U/μL)، ۱ μL ترانس کریپتاز معکوس M-MULV (۲۰۰ U/μL) و ۱ μg از RNA مورد آزمایش به ازای هر واکنش بود. محتوی مذکور به مدت ۵ دقیقه در دمای ۶۵ درجه سانتی گراد، ۵ دقیقه در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد و ۱ ساعت در دمای ۴۲ درجه سانتی گراد انکوبه شدند و در نهایت، واکنش ساخت cDNA به واسطه انکوباسیون ۵ دقیقه‌ای در دمای ۷۰ درجه

طور که در نمودار ۱ نشان داده شده است، دوز ۱ میلی مولار کافئین تاثیر چندانی بر بقای سلولها ندارد؛ در حالی که کافئین به طور مؤثری موجب عدم رشد و القای مرگ سلولهای NB4 با ۴ میلی مولار IC50 (در ۷۲ ساعت) می شود (نمودار ۱).

مختلف کافئین، میزان بقای سلولی جهت بررسی تاثیر کافئین به صورت روزانه طی ۳ روز با استفاده از روش MTT مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از روش MTT نشان داد که کافئین رشد سلولهای NB4 را به صورت وابسته به دوز و زمان کاهش می دهد. همان



نمودار ۱: القای مهار رشد و مرگ سلولی توسط کافئین در سلولهای NB4. سلولهای NB4 با دوزهای مختلف کافئین برای ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت در محیط کشت حاوی FBS ۱۰٪ تیمار شدند و میزان مرگ سلولی با روش MTT بررسی شد ($\text{mean} \pm \text{SD}$, $n = 3$). همان گونه که در شکل مشاهده می شود، کافئین هم به طور وابسته به دوز و هم وابسته به زمان سبب القای مهار رشد و مرگ سلولی سلولهای NB4 می شود.



نمودار ۲: کاهش میزان ساخت DNA توسط کافئین در سلولهای NB4. سلولهای NB4 با دوزهای مختلف کافئین برای ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت در محیط کشت حاوی FBS ۱۰٪ تیمار شدند و میزان ساخت DNA با روش BrdU بررسی شد ($\text{mean} \pm \text{SD}$, $n = 3$). همان گونه که در شکل مشاهده می شود، کافئین هم به طور وابسته به دوز و هم وابسته به زمان قادر به کاهش میزان ساخت DNA در سلولهای NB4 می باشد.


کاهش میزان ساخت DNA توسط کافئین در سلول‌های NB4:

به منظور تعیین اثربخشی کافئین بر روی تکثیر و ساخت DNA در رده سلولی NB4، آزمون BrdU انجام شد. طی بررسی‌های وابسته به دوز در زمان‌های ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت مشخص گردید که کافئین هم به طور وابسته به دوز و هم وابسته به زمان قادر به مهار تکثیر سلول‌های NB4 می‌باشد. همان گونه که در نمودار ۲ مشاهده می‌شود، غلظت ۱ mM کافئین هیچ گونه اثری در مهار میزان سنتز DNA سلول‌ها ندارد، در حالی که در غلظت ۲ mM، فعالیت تکثیر سلول‌ها در زمان‌های ذکر شده به ترتیب به ۸۹٪، ۷۸٪ و ۷۰٪ کاهش یافت. با افزایش غلظت کافئین مشخص شد که کاهش تکثیر و مهار ساخت DNA در غلظت‌های ۴ میلی مولار بیشتر از غلظت ۲ میلی مولار بوده است؛ به گونه‌ای که میزان تکثیر سلول‌های NB4 تیمار شده به مدت ۷۲ ساعت با دوزهای ۴ میلی مولار به ۵۱٪ کاهش پیدا کرد (نمودار ۲). با توجه به این نتایج می‌توان به این نکته پی برد که هر چه سلول‌ها زمان طولانی‌تری تحت تیمار با کافئین قرار گرفته باشند، میزان رشدشان کمتر می‌شود. هم چنین در دوزهای بالاتر ممانعت از رشد سلولی سریعتر و به میزان بیشتری صورت می‌گیرد.

افزایش بیان ژن‌های Bax و p21 در اثر تیمار سلول‌های NB4 با کافئین:

پروتئین Bax به عنوان یک پروتئین کلیدی در آپوپتوز القا شده توسط عوامل مختلف در مسیر داخلی آپوپتوز عمل می‌کند. این پروتئین از طریق بر همکنش با پروتئین‌های غشای میتوکندری موجب افزایش نفوذپذیری غشای میتوکندری و آزاد شدن سیتوکروم C از میتوکندری و فعال شدن کاسپازها و در نهایت آپوپتوز می‌شود (۹). پروتئین p21 به عنوان یک تنظیم‌کننده چرخه سلولی و دخیل در آپوپتوز مطرح می‌باشد (۱۰). برای بررسی میزان تاثیر کافئین بر بیان ژن‌های Bax و p21، میزان بیان mRNA این دو ژن توسط روش Real-Time PCR مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور، سلول‌ها با دوز ۴ میلی مولار

کافئین در محیط کشت برای ۴۸ ساعت انکوبه شدند و سپس سلول‌ها برداشت شده و RNA سلولی استخراج گردید. همان طور که در نمودار ۳ نشان داده شده است، کافئین به مقدار قابل توجهی میزان بیان mRNA ژن Bax و p21 را افزایش داد.




نمودار ۳: تاثیر کافئین بر میزان بیان ژن‌های Bax و p21. پس از تیمار سلول‌های NB4 با دوز ۴ میلی مولار کافئین برای ۴۸ ساعت، RNA از سلول‌ها استخراج گردید و میزان بیان نسبی mRNA هر کدام از ژن‌ها پس از نرمال‌سازی با ژن GAPDH محاسبه شد (n=۳، mean ± SD). همان طور که در نمودار نشان داده شده است، کافئین به مقدار قابل توجهی میزان بیان mRNA ژن Bax و p21 را افزایش داد.

افزایش فعالیت کاسپاز ۳ توسط کافئین در سلول‌های NB4:

هسته مرکزی تشکیلات تخصصی آپوپتوز، یک سیستم پروتئولیتیک شامل خانواده‌ای از پروتئازها به نام کاسپازها می‌باشد (۱۱). در این میان کاسپاز-۳، کاسپاز مهمی است که نقشی محوری در فاز اجرایی آپوپتوز سلولی دارد (۱۳)، جهت بررسی اثر کافئین بر القای آپوپتوز در رده سلولی NB4 از طریق فعالیت آنزیم کاسپاز-۳، فعالیت آنزیماتیک این آنزیم اندازه‌گیری شد. بدین منظور، سلول‌ها با غلظت‌های مورد نظر از کافئین به مدت ۷۲ ساعت تیمار شده و میزان تغییر در فعالیت آنزیم کاسپاز-۳ با اندازه‌گیری غلظت p-NA آزاد شده اندازه‌گیری شد. طی ۷۲ ساعت از تیمار کافئینی سلول‌ها، کافئین به صورت وابسته به دوز و به ترتیب در دوزهای ۲ و ۴ میلی مولار موجب القای فعال شدن آنزیم کاسپاز به میزان ۱/۶۲٪ و ۳/۴۲٪ می‌گردد؛ این در حالی است که دوز ۱ میلی مولار هیچ گونه تاثیری در

القای فعالیت آنزیم کاسپاز-۳ در سلول‌های NB4 ندارد (نمودار ۴).

فعالیت آنزیماتیک کاسپاز - ۳



نمودار ۴: افزایش فعالیت کاسپاز ۳ توسط کافئین در سلول‌های NB4. سلول‌ها به مدت ۷۲ ساعت با کافئین تیمار شده و میزان تغییر در فعالیت آنزیم کاسپاز-۳ اندازه‌گیری شد. طی ۷۲ ساعت از تیمار، دوزهای ۲ و ۴ میلی مولار کافئین به ترتیب موجب القای فعال شدن آنزیم کاسپاز ۳ به میزان ۱/۶۲٪ و ۳/۴۲٪ می‌گردد.

بحث

کافئین از آلکالوئیدهای پورین بوده و یک جزء کلیدی از نوشیدنی‌های بسیاری از مردم به ویژه چای و قهوه است. این ماده دارای خواص فیزیولوژیکی خاص بوده و به علت اثرات تحریکی آن بر سیستم عصبی و هومورال، به عنوان یک عامل ضد خواب کاملاً شناخته شده است. اخیراً مطالعه‌های انجام شده نشان داده است که کافئین دارای اثرات ضد سرطان می‌باشد؛ با این حال مکانیسم اثرات ضد سرطان این آلکالوئید پورینی به خوبی معرفی نشده است (۴). طی مطالعه‌ای مشخص شده است که کافئین به میزان قابل ملاحظه‌ای باعث افزایش آپوپتوز و آسیب میتوکندریال در سلول‌های سرطانی رده‌های HL-60 و U937 تیمار شده با PD184352 (مهارکننده پروتئین کیناز فعال شونده توسط میتوزن) می‌شود (۱۴). هم چنین نشان داده شده است که کافئین موجب مهار ATM3 و فعالیت کینازهای ATR شده و از بروز سرطان پیشگیری می‌کند (۱۶، ۱۵، ۴). از جمله سایر مطالعه‌های مرتبط با

اثرات ضد سرطان کافئین می‌توان به افزایش حساسیت سلول‌های جنین موش و سلول‌های رده Hella نسبت به اشعه، مهار سرطان پوست ناشی از پرتوی UVB در موش‌ها و افزایش حساسیت سلول‌ها به برخی از عوامل شیمی درمانی اشاره کرد (۱۹-۱۷، ۴). در این مطالعه و با بررسی میزان بقای سلولی با استفاده از روش MTT مشخص شد که کافئین رشد سلول‌های NB4 را به صورت وابسته به دوز و زمان کاهش می‌دهد. هم چنین، طی بررسی‌های وابسته به دوز در زمان‌های ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت مشخص گردید که کافئین هم به طور وابسته به دوز و هم وابسته به زمان قادر به مهار تکثیر سلول‌های NB4 می‌باشد. با این که مکانیسم اثرات ضد سرطان کافئین به خوبی مشخص نیست، اما می‌توان به اثرات این ماده بر تکثیر سلولی، آپوپتوز، آنژیوژنز و یا سیستم ایمنی اشاره داشت (۴). در این خصوص، گزارش‌ها نشان می‌دهد که غلظت بالای کافئین به طور مستقیم موجب القای آپوپتوز سلولی می‌گردد (۲۲-۲۰). ژن Bax یکی از اعضای خانواده ژن BCL-2 است که باعث افزایش آپوپتوز می‌گردد. پروتئین شناخته شده Bcl-2 یک کمپلکس هتروداایمر با پروتئین Bax در داخل سلول تشکیل می‌دهد و نسبت BCL-2 به Bax در این که آیا آپوپتوز القا و یا مهار شود، بسیار تعیین کننده می‌باشد (۲۴، ۲۳).

پروتئین Bax که یکی از ژن‌های هدف p53 است، کنترل مرگ سلولی را از طریق اختلال در میتوکندری، رها شدن سیتوکروم c از میتوکندری و در نهایت فعال شدن کاسپاز ۳ انجام می‌دهد (۲۵). برای بررسی مکانیسم اثر ضد سرطانی کافئین علیه سلول‌های NB4، فعالیت آنزیم کاسپاز ۳ و هم چنین تغییر بیان ژن‌های Bax و p21 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که کافئین به صورت وابسته به دوز موجب القای فعال شدن آنزیم کاسپاز ۳ و افزایش بیان mRNA ژن Bax و p21 می‌گردد. در همین راستا، دوبرز و همکاران گزارش کرده‌اند که کافئین موجب افزایش حساسیت سلول‌های رده H358 (سلول غیر کوچک سرطان ریه انسان) به آپوپتوز وابسته به p53 از طریق انتقال پروتئین Bax به داخل میتوکندری می‌شود.

نتیجه گیری

در مجموع، نتایج این مطالعه نشان می دهد که کافئین موجب مهار تکثیر و القای آپوپتوز در سلول های لوسمی پرومیلوسیتیک حاد NB4 می شود؛ از جمله مکانیسم های دخیل در ایجاد آپوپتوز توسط کافئین می توان به افزایش

بیان ژن های *Bax* و *p21* و هم چنین فعال شدن آنزیم کاسپاز ۳ اشاره کرد. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق می توان چنین نتیجه گیری کرد که مصرف کافئین به عنوان ماده ای در چای می تواند یک عامل مفید در القای مرگ سلولی در سلول های لوسمی پرومیلوسیتیک حاد عمل کند.

References :

- Benner SE, Hong WK. Clinical chemoprevention: developing a cancer prevention strategy. *J Natl Cancer Inst* 1993; 85(18): 1446-7.
- Kelloff GJ. Perspectives on cancer chemoprevention research and drug development. *Adv Cancer Res* 2000; 78: 199-334.
- Qi W, Qiao D, Martinez JD. Caffeine induces TP53-independent G(1)-phase arrest and apoptosis in human lung tumor cells in a dose-dependent manner. *Radiat Res* 2002; 157(2): 166-74.
- Lou YR, Lu YP, Xie JG, Huang MT, Conney AH. Effects of oral administration of tea, decaffeinated tea, and caffeine on the formation and growth of tumors in high-risk SKH-1 mice previously treated with ultraviolet B light. *Nutr Cancer* 1999; 33(2): 146-53.
- Lowenberg B, Downing JR, Burnett A. Acute myeloid leukemia. *N Engl J Med* 1999; 341(14): 1051-62.
- Mantadakis E, Samonis G, Kalmanti M. A comprehensive review of acute promyelocytic leukemia in children. *Acta Haematol* 2008; 119(2): 73-82.
- de The H, Chen Z. Acute promyelocytic leukaemia: novel insights into the mechanisms of cure. *Nat Rev Cancer* 2010; 10(11): 775-83.
- Zhang XW, Yan XJ, Zhou ZR, Yang FF, Wu ZY, Sun HB, *et al.* Arsenic trioxide controls the fate of the PML-RARalpha oncoprotein by directly binding PML. *Science* 2010; 328(5975): 240-3.
- Vogel MW. Cell death, Bcl-2, Bax, and the cerebellum. *Cerebellum* 2002; 1(4): 277-87.
- Wang X, Gao P, Long M, Lin F, Wei JX, Ren JH, *et al.* Essential role of cell cycle regulatory genes p21 and p27 expression in inhibition of breast cancer cells by arsenic trioxide. *Med Oncol* 2011; 28(4): 1225-54.
- Blagonravov ML. Induction of caspase cascade as a nonspecific response to myocardial damage. *Bull Exp Biol Med* 2011; 151(2): 167-70.
- Hui KK, Kanungo AK, Elia AJ, Henderson JT. Caspase-3 deficiency reveals a physiologic role for Smac/DIABLO in regulating programmed cell death. *Cell Death Differ* 2011; 18(11): 1780-90.
- Huang Q, Li F, Liu X, Li W, Shi W, Liu FF, *et al.* Caspase 3-mediated stimulation of tumor cell repopulation during cancer radiotherapy. *Nat Med* 2011; 17(7): 860-6.
- Dai Y, Yu C, Singh V, Tang L, Wang Z, McInistry R, *et al.* Pharmacological inhibitors of the mitogen-activated protein kinase (MAPK) kinase/MAPK cascade interact synergistically with UCN-01 to induce mitochondrial dysfunction and apoptosis in human leukemia cells. *Cancer Res* 2001; 61(13): 5106-15.
- Sarkaria JN, Busby EC, Tibbetts RS, Roos P, Taya Y, Karnitz LM, *et al.* Inhibition of ATM and ATR kinase activities by the radiosensitizing agent, caffeine. *Cancer Res* 1999; 59(17): 4375-82.
- Nghiem P, Park PK, Kim Y, Vaziri C, Schreiber SL. ATR inhibition selectively sensitizes G1 checkpoint-deficient cells to lethal premature chromatin condensation. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2001; 98(16): 9092-7.
- Jacquet P, de Saint-Georges L, Barrio S, Bagnat-Mahieu L. Morphological effects of caffeine, okadaic acid and genistein in one-cell mouse embryos blocked in G2 by X-irradiation. *Int J Radiat Biol* 1995; 67(3): 347-58.
- Narayanan PK, Rudnick JM, Walther EA, Crissman HA. Modulation in cell cycle and cyclin B1 expression in irradiated HeLa cells and normal human skin fibroblasts treated with staurosporine and caffeine. *Exp Cell Res* 1997; 233(1): 118-27.
- Tsuchiya H, Tomita K, Yamamoto N, Mori Y, Asada N. Caffeine-potentiated chemotherapy and conservative surgery for high-grade soft-tissue sarcoma. *Anticancer Res* 1998; 18(5B): 3651-6.
- Shinomiya N, Takemura T, Iwamoto K, Rokutanda M. Caffeine induces S-phase apoptosis in cis-diamminedichloroplatinum-treated cells, whereas cis-diamminedichloroplatinum induces a block in G2/M. *Cytometry* 1997; 27(4): 365-73.
- Hagan MP, Hopcia KL, Sylvester FC, Held KD. Caffeine-induced apoptosis reveals a persistent lesion after treatment with bromodeoxyuridine and ultraviolet-B light. *Radiat Res* 1997; 147(6): 674-9.
- Dubrez L, Coll JL, Hurbin A, Solary E, Favrot MC. Caffeine sensitizes human H358 cell line to p53-mediated apoptosis by inducing mitochondrial translocation and conformational change of BAX protein. *J Biol Chem* 2001; 276(42): 38980-7.
- Oltvai ZN, Millman CL, Korsmeyer SJ. Bcl-2 heterodimerizes *in vivo* with a conserved homolog, Bax, that accelerates programmed cell death. *Cell* 1993; 74(4): 609-19.
- Marzo I, Brenner C, Zamzami N, Jurgensmeier JM, Susin SA, Vieira HL, *et al.* Bax and adenine nucleotide translocator cooperate in the mitochondrial control of apoptosis. *Science* 1998; 281(5385): 2027-31.
- Cory S, Adams JM. The Bcl2 family: regulators of the cellular life-or-death switch. *Nat Rev Cancer* 2002; 2(9): 647-56.

Original Article

Induction of cell death and decreased cell proliferation in acute promyelocytic leukemia cells (NB4) by caffeine

Safa M.¹, Bashash D.², Hamidpour M.³

¹Hematology Department, Cellular and Molecular Research Center, Faculty of Allied Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

²Hematology Department, Faculty of Allied Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

³Faculty of Allied Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Abstract

Background and Objectives

Prevention, control and treatment of cancer using natural materials currently have been considered as the promising strategy. In this regard, caffeine as a purine alkaloid found in various plants, including coffee, cocoa, cola and tea has recently attracted great interest because of its remarkable multifunctional inhibitory effects on cancers such as leukemia. Regarding the anti-cancer effects of caffeine, we sought to investigate the effectiveness of this methylxanthine alkaloid against NB4 acute promyelocytic leukemia cells.

Materials and Methods

In order to examine the effects of caffeine in APL, NB4 cells were cultured in the presence of different concentrations of caffeine; subsequently, MTT, Caspase 3 activity assay, BrdU cell proliferation assay and quantitative real-time PCR were performed to assess the effect of caffeine on cell viability and the possible mechanisms of inducing cell death.

Results

Evaluation of DNA synthesis and cell survival using BrdU and MTT methods indicated that caffeine reduces proliferation and survival of NB4 cells in a dose and time dependent manner. The results of this study showed that elevation in the dose of caffeine induces caspase-3 activation and increases Bax and p21 gene mRNA expression levels.

Conclusions

Overall, our data illustrate that caffeine inhibits cell proliferation and induces apoptosis in acute promyelocytic leukemia NB4 cells. Thus, it can be concluded that caffeine as a substance in tea may be a useful agent for induction of cell death in malignant cells of patients with acute promyelocytic leukemia.

Key words: Acute Promyelocytic Leukemia, Apoptosis, Caffeine, Caspases

Received: 27 Jul 2014

Accepted: 9 Jun 2015

Correspondence: Safa M., PhD of Hematology & Blood Banking, Assistant Professor of Hematology Department, Cellular and Molecular Research Center, Faculty of Allied Medicine, Iran University of Medical Sciences. Postal Code: 1449614535, Tehran, Iran. Tel: (+9821) 86704711; Fax: (+9821) 88622576
E-mail: safa.m@iums.ac.ir

Correspondence: Bashash D., PhD of Hematology & Blood Banking, Assistant Professor of Hematology Department, Faculty of Allied Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Postal Code: 1971653312, Tehran, Iran. Tel: (+9821) 22721150; Fax: (+9821) 22721150
E-mail: david_5980@yahoo.com